


[illegible]



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1786/A/1

capitulum



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1786/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1786/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1786/A/1

1786²
A/1
L









55450

PEDANI
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE

MEDICA MATERIA

LIBRI SEX.


Ioannē RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRÆTER
*Pharmacorum simplicium catalogum,
copiosus omnium ferme medela-
rum siue curationum
Index.*



LVGDVNI,
Apud Ioannem Frellonium,

1547



NAENIA IN OBITU
RUELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,
Constitit atq; alii clarus in arce patris:
Cum perisſe hominẽ rata Mors, ait, Ecce triũphe
Clamet io, cuicui victima grata cadit.
Vicimus, en nostras toties qui eluſerat artes,
Qui toties mortem vicerat, interijt.
Aſt vbi in ore virũm verſari auditq; videtq;
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.
Cui Pæã, quibus ortus erat mihi redditur aſtris,
Quemq; putas victum, bina trophæa refert.
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:
Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:
Nempe Dioſcoride Romana per oppida ducto,
Cui toga, cui potior lingua Latina, ſua eſt.
Cætera quid memorem victuri ſcripta laboris,
Naturam & ſtirpes, pharmacaq; omne genus?
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,
Nullaq; vitæ hominis commoda præterijt,
Quæ non tractarit, ſapientibus edita Graijs,
Quæ non reddiderit, ve! meliora ſuis.
Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis
A mille haud quiſquam tanti opus ingenij.

EPITAPHIVM
Ioannis Ruellij, Diony-
sio Corronio au-
thore.

Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:
In quo naturæ notitia, atque poli.
In quo prima fuit dos, Graiū vertere scripta
In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.
Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,
Præmiâque illa sui grata laboris habet.

PEDANII
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia, libri
primi præfatio,
Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



Vanquam, amicissime Aree, com-
plures non veterum modò, sed
recentiorum quoque, de medi-
camentorum compositione, viri-
bus, atque probatione commenta-
ti sunt: nobis tamen nec vanum, nec à ratione ab-
horrètem impetum animi ad hoc opus incessisse,
tibi ostendere tentabimus: quòd eorum nonnulli
absolutum nihil ediderunt, alij quàm plurima,
quæ auditu percunètando didicerant, scriptis tra-
diderunt. Siquidem Bithynus Iolas & Heracli-
des Tarentinus, omissa prorsus herbarum tra-
datione, rem sanè quàm paucus perstrinxerunt.
Neque verò omnes illi de metallicis quicquã re-
bus aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Cra-
teus autem herbarius, & Andreas medicus,
qui cæteris diligentius hac in parte versati viden-
tur, radices multas apprimè vtileis, herbásque
haud quaquam adnotatas, reliquerunt. Verunta-

men priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiades omnes, medicinalem materiam vernaculam cognitamque vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & ut medicamentorum vires probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani verò reddendum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemque controversiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamæleæ succum esse contendit: androsamonq; eadem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloen in Indea fossilem nasci, & pleraque his similia exponit, reclamante euentia, quæ prorsus veritati refrugantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nullaq; cognatione coniunctas vireis collidentes: par-

Dioscoridis tim per elementa literarũ scripta in ordinem dig-
cognoscentes, quò facilius memoria mandarentur, ge-
dorum sim nera & eorum effectus à sua cognatione disim-
plicium stis gentes. Nos verò ab iuventute, ut ita dicam, inuen-
dum. ta, iungi desiderio cognoscendæ materiæ allecli,
perinul

per multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequeris, affectum. Etenim natura cum in omnis eruditione excultus, tum verò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquantò peculiaris. Enimvero non parum praebeat tuae probitatis argumentum, optimi viri Licinii Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes novimus, cum mutuam inter vos benevolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosque, qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visu ipsi exactissime cognovimus: quaedam etiam ex ea, de qua inter omnes convenit, historia, percunctationeque rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum virisque describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, univrsisq; eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque mixturas, & facta in morbis pericula extendi, & incre-

mentum capessere potest, quàm plurimum conferente singulorum medicaminũ cognitione. Quin etiam vernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verum in primis curã impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certè pro horum ratione aut valent viribus, aut evanido nulloque munere funguntur. Serena igitur coeli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si vel squalores vel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & ventis exposita sint & perflata, frigidaque & aquis carentia: in his enim locis vires eorum longè validiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, ceterisque locis à vento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus viribus valent: multoq; magis, si non suo tempore nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria vi, hyeme florent, & folia pariunt: quedam bis ante Plantæ, ut no florifera. Quare cui in animo est horum per exactè cognitionem assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus omni tempore adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adspici stiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem nos

noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui olim has rerum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusilaginem emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui saepius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis educere annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae vero fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine praegnantia demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidant, fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipiantur, inciso per summum adulescentiae vigorem caule. Radices, & lingua menta, corticesve ut recondantur, eximere conuenit cum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatae inibi, locus asperginem non redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae incundum

odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obdu-
ctis, reponantur. Nonnunquam charta aut folys se-
mina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis
medicaminibus densior materia, argentea, vitrea
aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara
non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è bu-
xo: sed ænea vasa ocularijs medicamentis liqui-
disq; & omnibus ijs, quæ aceto, piceliquida, aut
cedria componuntur. Adipem autem & medullas
stagnæ vasis recondi conuenit.

Iris.

CAP. I.



IRIS à cœlestis arcus simili-
tudine nomen accepit. Folia fert
gladioli, sed maiora, latiora,
& pinguiora. Flores in caule
æqualibus inter se spatijs di-
stant, incurui, varij: siquidem candidi, pallen-
tes, * μίλινα, tes, * lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciun-
tur: quæ diuersi coloris specie, quædam cœlestis
væ. arcus imago representari videtur. Radices subia-
* ὑπεραι, id est geniculatæ, * duræ, odoratæ: quæ frustatim
est, solida. dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino re-
conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: &
* Τῆ γόβοσ, inter has laudatissima, quæ pumila ferè & den-
πυρωτέρα, sa constat radice, frangenti contumax, subrufo
id est, gu= colore, * gustu amaro, odore perquam sincero, ita
stu feruen= ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum tun-
tiore. ditur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha-
bet

bet Africana, candicans. gustuq; amara. Teredines in vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excelsa, extenuas, contra tussim efficax: humorum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epota purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem pota ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum, foeminarum fotibus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis venarum spiracula: ischiadicis infunditur, fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditae, parius extrahunt: quinetiam cocta & illitae, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccae quoq; vlcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotae cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat: pestis, malagmatis, & acopis inseruntur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

ANNOTATIO.

Censetur Galanga officinarum. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam vulgus herbariorum hoc nomine solet indicare.

Aco

Acorum. CAP. II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamē: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo caespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienem absomit, urinae stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur, oculis

* Plinius lorum caligines succo discutit, antidoti radix ma-
aniso ha= gno vsu commiscetur.

bet: ac sic e=

Meum.

CAP. III.

Meon, quod Athamanticum vocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, teste, Graci * anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. bi-
quidam ve nūm ferme cubitorum altitudine attollitur, spar-
tustissimi sis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenui-
codices, quæ bus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ fer-
diuersitas uestictæ ex aqua, vel trita citra coctionem, præ-
facit, vt quæ clusorum renū vesicæq; farta vitia potu leniunt,
lis herba sit urinae difficultati medentur, stomachi inflationes
Meon, non discutunt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulo-
facile quis rum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita
coniecerit. cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem
per

per menstrua pellunt, de sectionibus feruefactæ: infantibus autem illitæ imo ventri, vrinas mouent: quod si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus. CAP. IIII.

CYpirus, quem aliqui erysiceptrum, vt asphaltum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauißima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat, vrinam ciet, ad calculos aquamq; subter custem vtilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, per frictionibus vuluæ & præclusionibus fotus prodest, pellit menses. Contra vlcera oris etiam si depascent vorentq; farina eius efficax est. Malagmati calfacientibus, & vnguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilotri vim exhibet.

Card

Cardamomum. CAP. V.

Cardamomum optimum est, quod ex Coma-
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in In-
dia quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet ple-
num, frangenti contumax, occlusum, fæctumque
(quod enim huiusmodi non est, exoletum iudica-
tur) & gustu acre, subamarum, & odore caput
tentans. Excalfactoriam vim habet, potumque ex
aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruo-
rum resolutionem. Item adrupta, valsa, tormina:
latas ventris tineas excutit. Ex vino autem po-
tum, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis,
neque non omnibus venenum vibrantibus, auxi-
lio est. Cum cortice radice lauri epota drachma
calculos cõminuit, partus suffitu enecat, scabiem
ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spiss-
samenta additur.

Nardum. CAP. VI.

Dvo nardi genera: vnum Indicum, alterum
Syriacum appellatur; non quod in Syria
proueniat, sed quod montis, in quo oritur, pars
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex
hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue,
largam gerens comam, flauum colore, perquam
odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, ama-
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-
ris gratia permanear. Ex Indici autem nar-
dum quoddam Gangitis vocatur, à fluuio Gange,
apud quem enascitur, montem præterfluente: quod
gen

genus ob multam loci, in quo prodit, viginem, viribus infirmius est, atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab vnica radice comosus, vnâque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum virus super modum redolente: quod improbat. Madefactum vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, * nulloq; * ἡγεῖ μὴ puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua, aut ἔχει τὸν palmeo vino, inspissationis ponderisq; causa inspi- χροῦν, idrato. Intueri autem oportet silutium radicibus inest, & quod spondeat, & incerniculo puluerem excutere, eluen- natinae candidis manibus vtilem. Vim habent excelsaforiam, reat lanugi & exiccantem. Vrinam mouent, aluum potius si- ne. stunt, vuluæ profluvia, sanieque appposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur, & Stomachi rofionibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incoctæ fotu ad insessum, vuluæ inflammationibus medetur: ad glabras oculorum genas valent: si quidem eas ad densiorem pilum reducunt. persusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in scitili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nard

Nardum Celticum. CAP. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluunca patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso, alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteturur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate. sed facilis cognitio: namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, vti verum nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Mon

Montanum nardum. CAP. VIII.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thymolacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minime tamen spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulae regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Ad eadem, ad quæ Celticum, efficax.

ANNOTATIO.

*Minoribus.] Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, mollioribus habet quod sanè vtrunque herbae, quàm aptissimè quadrat.

*Cytino hyoscyami.] Id est, flori hyoscyami, qui veri cytini, quem domesticae punicae florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, vt in eius descriptione author est Dioscorides.

Asarum. CAP. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs *minoribus multò, & mundioribusq;, floribus *cytino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. [Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles] radices numerosas, geniculatas, te- Græco.

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longè
tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, &
quæ linguam vehementer mordent. Excalfacto-
riam vim habet: urinam cit, hydropicus & vetu-
sto coxendicum dolori prodest. Radices senis dra-
chmis ex aqua mulsâ potæ, menses trahit, & vera-
tri albi modo purgant. In vnguenta additur. Vm-
brosis montibus provenit, sed plurimum in Ponto,
Phrygia, Illyrico, & Italia Iustinienst agro.

ANNOTATIO.

* Maioribus] Rectius fortè minoribus le-
gas, ut Ruellius quoque monuit. Flores liqui-
dem Valerianæ nunc dictæ, quam Phu esse
omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie
expressissimè quidem referunt, eo tamen lon-
gè sunt minores: ni fortè soli diuersitati id im-
putandum censeas.

Phu. CAP. X.

* Hippose-
lini. **P**HU, quod & aliqui sylvestre nardum appella-
nt, nascitur in Ponto, folio * olusatris, aut elat-
rophosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo,
molli, in purpuram vergente, geniculis interce-
pto, floribus narcissi proximis, * maioribus, tene-
rioribus, & ex albicante purpureis: radice supe-
rius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo
villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum:
capillamentis inuicem contextis, flavescentibus,
odoratis, cum quadam odoris gravitate nardum
amis.

emulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest. ad lateris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur quoniam haec dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum. CAP. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phlomis, asarum, nirus. secus autem res se habet. Nanque malabathrum folium sui generis est, quod Indici gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuiitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua vi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmitum verò & minutim contusum, praesertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Eisdem nardo sortitur vires, sed efficacius omnia praestat. Urinam vehementius citet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusque tritum & in vino feruesfactum commodè illinitur: subditum linguae, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum

seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & aliis veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia. CAP. XII.

Cassia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, **μετὰ πολ* pulchri coloris, coralli æmula, perquam angusta, *λῆς .i.* cum longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens & **cum* multo. aliquanto feruore adstringens, aromatica, vinoso

odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, achy appellatur, ab Alexadria negotiatoribus, daphniis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta.

**Græcus* Tertia, cui Museletico blasto, id est germini, cognomen est. Reliquæ viles, & quæ **aphemum* dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quam vt explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans, sca

scabra, hircinum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad mælagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omnes & renum vitia, pota proficit. Fœminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

Cinnamomum. CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrum sibi nomen vendicantia. Præferitur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergens, laue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens, Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cū optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadantenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscel-

lanea quaedam esse videntur. Quæ autem melius
 spirant, suo halitu cum nares primum consulun-
 tur, olfactum expleant, deterioris dignotionem
 impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumi-
 lum, fulvescens admodum. Tertium à Mosyliti-
 co, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum,
 paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fun-
 gosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac fri-
 abile, magnam habens radicem, quæ cassiam pla-
 nè representat. Quintum genus, odore nares fe-
 riens, subrusum & cortice fulvæ cassiæ simile,
 tangenti firmum, minus nervosum, densa radice
 firmatum. Iis quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amo-
 mi odorem spirant, minus suavitatis inest. Deli-
 gito scabrum, album, rugosum: at læue, & ligno-
 sum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiam
 num simile aliud, cui pseudocinnamomo cognò-
 men est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium.
 Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocin-
 namomum, præbens quandam cinnamomi faciem.
 Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta lon-
 ga robustaque ferens, odore longè cinnamomo in-
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamo-
 mo genere differre dicant, quod à natura eius ab-
 horreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit,
 & concoquit, urinam ciet: tam menses, quàm par-
 tus potum aut ex myrrha impositum pellit, con-
 tra bestias, quæ virus ei aculantur, venenâq; con-
 uenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem
 discut

discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum vitia, & urinæ difficultatem efficax est, vnguentis pretiosis inferi solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, umbraque siccatur, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui Desunt in pseudocinnamomum appellant, perquam denso Græco, atque crasso sarmento, longè tamen inualidius cinnamomo, & odore, & gustu.]

Amomum. CAP. XIII.

Amomum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs * vitis albæ similibus. * bryoniæ. Laudatur quàm maximè Armeniacum, * fuluo * χρυσοῖον auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medi τῆ χρόα, id cum, quoniam in campestribus, & aquosis ena est, colore scitur, infirmius esse constat. Est autem maior aurum imignum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, tans. odore origani. Ponticum verò subrusum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec adstrictum cohereat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur: seminis plenum, vuis paruis simile, graue, valde odoratum, modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnum al-

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq;: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerumque lenit ex vna passa, ad vuluarum vitia in pessus, aut in sektionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagrae, potui conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguentis. Adulteratur amomum herba simili, quae amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Quare in huiusce modi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quae ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus. CAP. XV.

Pracellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber, vt ferula niger. Teratius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, a teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei ex calfactoria, vrina ciet, menses pellit, vitus, quae vuluam male habent, tam impositu quam fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq;: ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris teneas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrinua

rium accessiones, & nervorum resolutionibus
blinitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle
llitus emēdat. Additur in antidota & malagma=
a. Sunt qui admistis helenij comageni præduris
radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est:
si quidem neq; gustu feruet helenium, neque vali=
dum odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia na- Officinis
scitur. Laudatissimus ex Nabathea, proxi- squinantiū.
mus Arabicus, quem aliqui Babylonium cogno=
minant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligen
dus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, ru=
bentibus fragmentis, qui manibus confricando ro
se odorem emittit, igne & mordacitatis ad linguā.
Floris, culmorum, radicusq; est vsus. Vim vrinae
ciundæ habet, menses pellit, discutit inflationes,
caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit,
excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos
eius in potu utilis sanguinem reijcientibus, dolo=
ribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum mi=
scetur antidotis. Radix adstringentior est, ideo fa=
stidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma
vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot da
tur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desie
dentium fetus, vtile est.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur: me=
lior est fuluus, dense geniculatus, & qui

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lenius in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Vrinam potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cutem fusa morbo, renum vitij stillicidio vrina, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. In si suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infessus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagma: tisq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. CAP. XVIIII.

* Marcello **B**alsamum, arbor * alba violæ, lycij, siue locus hic su **B**pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutæ proximum longe candidius, perpetuò virens: in Iudæa solum quadam valle & Aegypto nascens, his differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibus ferreus inciditur, manâtque è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quim seni septenive congruuntur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, lenis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè vitatur, misto ab aliq

quibus terebinthi, cypri, lentisci, balani vn-
mento: item susino, metopio, melle, aut Cypria
raliquida. quod maleficium facile deprehen-
tur. Nanque merus in laneam vestem fusus,
neque maculam facit, neque si eluatur notam re-
linquit: vitiatum autem inheret, & lac instilla-
tus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quin-
tiã syncerus in aqua aut lacte celerrimè liqua-
tur, coloreq; lactescit: vitiatum verò olei modo in-
statat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens.
Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur.
Hallucinatur, qui aqua concretum pessum ire, et ad
ima fidere arbitrantur, postea dissipatum superna-
tare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant,
probatum recens, sarmento tenui, folium odoratum,
quadamtenus opobalsamum spirans. Necessarius
etiam seminis erumpit usus, quare eligatur fla-
uum, plenum, grande, ponderosum, mordens gu-
stu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens.
Adulteratur semine hypericosimili, quod à Petra
oppido desertur. Sed coarguitur magnitudine,
inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Effi-
cacissima vis inest succo, & quàm maximè cal-
faciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupil-
lis offundunt, medetur perfriktionibus vuluæ cum
rosaceo cerato appositus: menses quoque, secun-
das & parius extrahit, horrores illitu discutit,
vlcera sordida expurgat & cruda concoquit, vri-
nam potu ciet, agrè spirantibus prodest: datur
in

in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis.
In summa, præcipua authoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur
doloribus lateris, pulmonum vitis, tussi, ischiadi-
cis, comitialibus, vertiginosis, orihopnoicis, vrina
difficultati, torminibus ac serpentum morsibus:
ad muliebres suffitus perquam utile est: vulnam
aperit in desensionibus balnearum decoctum, &
humorem euocat. Lignum easdem habet vires,
aliquantò minores. Ex aqua potum cruditatibus,
torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitula-
tur, vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca iri
conuenit, squammas ossium extrahit, & ad vn-
guentorum spissamenta additur.

Aspalathus.

CAP. XIX.

^{* ξυλῶδης} **A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est
id est, ligno in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula:
^{sus.} quo ad vnguentorum spissamenta pigmentarij
vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice
rubens, aut in purpuram vergens, densus, odora-
tus, gustatu amarus. Est & alterum genus can-
didum, lignosum, sine odore: quod deterius habe-
tur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet.
vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera col-
luenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordi-
da vlcera infunditur, subiectum in pesso, partum
extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sangui-
nis

is reiectionem potu cohibet, vrinae difficultatem
inflationesq; discutit.

Muscus.

CAP. XX.

BRyon, id est muscus, à quibusdam splachnon
appellatur: in cedro arbore, populo alba, &
quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proxi-
mum populneum: in quo genere candidum &
odoratius præstat, nigricans improbatur. Adstrin-
gendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis
utile: vnguento balanino, oleusq; inspissandi gra-
tia inseritur: thymiamatum, acoporumq; compo-
sitionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

AGallochum, lignum est, quod ex India atq; Putatur li-
Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, ma-
gnum aloës
culatum, odoratum, gustu adstringens, cum qua-
dam amaritudine, cute verius quam cortice vesti-
tur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut de-
cocto os colluitur, commendandi halitus gratia.
Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad-
suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ
vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbe-
cillitatē, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisve
dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infe-
stant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum.

CAP. XXII.

NArcaphthum ex India defertur, cortico-
sum, simile sycomori libro: quod iucūdi odo-
ris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-
pos

positis : constrictiōibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

Videtur **C** Ancamum Arabici ligni lacryma est, myrr-
quibusdam **C** rhæ quodammodo similis, virosi gustus,
Lacca offi- quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additis
sinarum. styrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur ob-
tinere extenuandi obesos, si ternum obolorum
pondere ex aqua, aut mulsa aceto, plusculos dies
ebibatur : lienosis datur, comitialibus, & suspi-
riosi : menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cæ-
catrices confestim emendat, vino madefactum
medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gine-
cuias humore prægnanteis, doloresq; dentium, nō
aliud efficacius.

Cyphi. CAP. XXIII.

C Yphi odorati suffimenti compositio est, di-
cata dys, qua abundè Aegyptij sacerdotes
utuntur. In antidota misceri solet, suspiriosis da-
tur in potu. Per multæ componendi rationes, quas
rum una hæc est : Sumito cyperi dimidium sexta-
rium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo-
rue passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duo-
decim : resina repurgatæ minas quinque : calami
& iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum
minam : myrrhæ duodecim : vini veteris sexta-
rios nouem, cum duabus mellis minis : ruam pas-
sam detractis vinaceis tusam, cum vino & myr-
rha subigito : cætera tusa & cribrata adycito, die
uno humorem combibere. finito, dein mel coquito
dum

um sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatâ
resinam accuratè permisceto cum reliquis diligen-
ter contritis, & in fictile vas recondito.

CROCUM. CAP. XXV.

CRocum, optimum in medendi usu Cory-
ceum, recens, & boni coloris, paulum can-
didi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis
partibus constans, non fragile, plenum à quo de-
tractum est nihil, quod mades factum manus infr-
git, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacree
sui huius generis non est, aut vetus, aut humo-
re perfusum creditur. Secundus locus datur Co-
ryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Ly-
cio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ.
Cyrenaicum & Centuripinum inter Sicilica o-
mnia viribus infirmius est. Omnium natura ole-
racea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris ve-
nustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: qui-
bus de causis magno venditur. Vtilissimum in
medicina quod antè descripsimus. Adulteratur
immiſto crocomagmate tuso, atque etiam sape
sublitu: contrita, quò pondus adiciatur, simul
argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficium
declarat insidens pulvis, præsertim si desitutum
in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum o-
doratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus
drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim co-
quendi, emolliendi, atque substringendi habet: vri-
nam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passò
liber

biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vuluæ etiam sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerem stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collationibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma vocat. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehe-

* Rectius menter dentes ac linguam insicit, * multis durans Marcellus annis, quale est quod à Syria defertur. Habet aliquot ho suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuerras perma sant: urinam cit, calfacit, concoquit, & emollit, vinente colores croci proportionem quadam tenuis representat, re. quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

Vulgò Enula cāpana.

Helenium.

CAP. XXVI.

* ἐν ὀρεῖ = **H**elenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga, caulem quibusdam vōis, nō in locis non emittit, radicem subalbidam, interoniosis, id dum subrusam, odoratam, subacrem, vegetam, maest, in mongnam, ex qua agnatae propagines lilioris aut aristosis ac opa modo feruntur. * Montibus in vmbrosis, siccoq; eis. solo prouenit. Foditur æstate radix, particula-

timq;

imq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum
nenses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex mel=
e prodest tussi, orthopnoea, ruptis, conuulsis, in=
lationibus, & serpentium morsibus. In summa
excalfaciens. Folia ex vino cocta vtiliter ischia=
licis illinuntur. Helenium stomacho vtile in pas=
o conditum: siquidem salgamarj paululum sic=
catam radicem, mox decoctam, & frigida aqua
madefactam, in sapam coniungunt, & ad vsus re=
condunt. Trita potaque ad cruentas excreationes
efficax est. Alterum helenj genus in Aegypto gi=
gni Cratenas tradit: herba est cubitalibus ramu=
lis, serpylli modo per humum repentibus, folijs len=
ticulae circa ramos, sed longioribus crebrisq; radi=
ce pallida, digiti minoris crassitudine, per ima te=
nui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in
maritimis collibusq;. Radix vna. in vino epota,
contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. CAP. XXVII.

Oleum, quod ex immaturis oliuis exprimi=
tur, ad multos vsus rectè valentibus accom=
modatissimum: omphacinum id appellatur. Præ=
stat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale
unguentorum compositionibus idoneum intelligen=
tur. Stomacho vtile est, quod adstringat: gingi=
uas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore,
sudores cohibet, & quò vetustius ac pinguius, eò
ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in com=
mune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ven=
6

erem, à persfrictionibus corpus tuetur, ipsūque promptius ad obeūda munera reddit, aluum emollit, vlcera venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, assidue potum reddit, tumque vomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanæ succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur, ventris animalia pellit, idē maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetustas non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut vetustatem repræsentet.

Oleum sylvestris oliuæ.

CAP. XXVIII.

Oleum, quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer adstringit, & ad sanorū vsus secundum sibi locum vendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, lepræque abstergit: tardius cautionem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec amiculo vetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur: ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, ictuque agitatam respumet: octaua die fœnum græcū mundum quinquaginta denariorum pōdere, calida aqua madefact

Etum donec emollescat, in supradictū oleum dei-
tur, ita ne extillet aqua: postea tede præpinguis
ceæ, assulatim casæ æquale pondus adijcitur, &
transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi
undorem contraxerit, in vas nouum vetere vino
fustum recondi debet, substratis fertulæ campa-
æ corollis drachmas undecim pendentibus, cum
iri iridis pondere: sin minus, rursus Soli mandan-
um, & idē munus obeundū, usq; dum inalbescat.

Sicyonium.

CAP. XXIX.

Sicyonii componendi ratio hæc est: In lebetem
Soris lati stanno inductum, funditur olei albi
quod cruda oliuæ reddiderūt, congius vnus, aquæ
semicongius: leui id igne coquitur, leniter mouen-
do: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refrixit,
matans oleum concha decapulatur, & adiecta
nova aqua conferuescit, & reliquis, vt diximus,
transactis reponitur. In Sicyoni maxime fieri con-
uenit, Sicyonii inde accepto cognomine. Calfactio-
niæ ad quendam vsque modum vim habet. Febrili
c neruorum vitis prodest. femine ad commen-
dandum faciei nitorem eo vtuntur.

Strigmenta balneorum.

CAP. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, di-
scutiunt: ad sedis rimas & condylomata illi-
untur. Illa vero quæ ex palestris puluerem sibi
isciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorum
modos imposita adiuuant: ischiadicis in fotus aut
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

Deraſæ gymnaſiorum parietibus ſimulacrisq; ſordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem perducuntur, diſſipant: deſquammatiſ & vlceribus ſenum profunt.

Elæomeli.

CAP. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, oleum melle craſſius, ſapore dulci. Bilem, cruditatēſque detrahit, ſextario cum vna aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcunt & viribus deſciuntur: quod minime vereri oportet, verum crebro excitare, ne veterino preſſi ſomnos captent. Fit & oleum è pinguitudine ſurculorum oleæ: optimum vetus, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorum illinitur: lepras, nervorumque dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

CAP. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini, qua voles quantitate, torrido ſole flacceſcunt, & vuarum more inſtrati tatiſper inſolantur, dum veſtiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquâ habeat, demittitur, ſubiectoq; igni ferueſcunt: & ubi inſitum proſus humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit uſus, longè ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accurate molitos perſport

Sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cū continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vulnus conuersis atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potius aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatusq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ serbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quā antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitus hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. Singulis heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vitæ renum, calculosis, difficili vrinæ, suspiciosi, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, timitusq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato, & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & fures cum vino abstergit.

Balaninum. CAP. XXXIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Aluum soluit, stomacho aduersatur, contra
aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum
anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio.
Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum
vocant. Eandem vim habet quam balaninum.

Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

HYOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum, res-
cens ac siccum tunditur, & calida asper-
gitur aqua, ut in amygdalino diximus. dumque
insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cum
reliqua massa permisceantur. hoc in ante fieri oportet
dum nigrescat & grauiter oleat: mox pres-
sum atque excolatum reconditur. Ad aurium do-
lores efficax est, pessis miscetur, ad emolliendum
utile. Fit & è grano gnidio purgato & tuso. Vis
ei aluum soluere potius. Non secus cnicinum oleum
temperatur: cui facultas eadem est, quæ factum
è gnidio grano, verum inualidior. Rhaphaninum
è rhaphani semine fieri solet, ceterorum more.
Phthiriasis mala valetudine contractas tollit, sca-
bitias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtun-
tur Aegyptij. Melanthinum idem quod rhapha-
ninum potest. Tritum sinapis semen, & calida
aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimi-
tur. Id ad diuturnos dolores efficax est, transfert
humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myr

Myrteum. CAP. XXXVI.

Myrtei faciendi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut satina, foliorum mollissima quæque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectusq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia cõtusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Præuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupressò, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Adstringit & indurat, ideò medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores compescit, & omnia quæ ad strictionem inspissationemque desiderant.

Laurinum. CAP. XXXVII.

Laurnum fit hoc modo: Lauri bacce cum maturæ sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia cõcoquunt, alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij styracem & myrtum addunt.

Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quòque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factus prius spissamentis, vt in laurino diximus. Hoc scabiē iumentorū canumq; sanat: vtilissimum pēsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

Mastichinum è trita fit mastiche, quod contra omnia vulue mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. CAP. XL.

De ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidē ea in nonnullis corporū vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt: in quorum probationibus cōsule-

re

re nares oportet, an ea oleāt, ex quibus temperan-
tur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in qui-
busdam planè observari nō potest, propter ea quæ
admiscētur odore cæteris prævalentia: vt in ama-
racino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cre-
bra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum.

CAP. XLI.

Rosaceum sic fit : Iunci odorati quinque li-
bras & bessē tundito, & subactas aqua
in viginti olei libris & quincunce subinde mouen-
do, coquito: dūmque percolaueris, in olei libras vi-
ginti & quincuncem, adijcito rosas non madesa-
ctas numero mille, & manibus melle perunctis
identidem moueto, interdū premens, finito no-
cte tota macerari, postea exprimito : & ubi re-
cremētum pessum ierit, mutato vase, in craterem
melle illitum recondito. Cæterū rosas, quæ an-
tea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & assu-
sis octo libris & quadrante spissati olei, iterum
premito, eritq; secundarium oleum. Quod si ter-
tias vsq; quartasve perfusiones infundens expri-
mere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quar-
tarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa
melle oblini debent. Si verò secundam infusio-
nem instituire libet, in expressum oleum, numero
pari recentes rosas, nullo humore imbutas inij-
cito : manibus melle præmadesactis, agitans pre-
mito : & iterum, tertio aut quarto simili modo
exprimens facito, totiesq; recentes rosas detra-

Etis vnguibz immittito: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibz, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosæ quæ selibram pondere equant, in sextario olei diebus octo madescunt, & vsq; tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim adstringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, vlcera cana replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficacis est, ad laceßita interanea & concitatas vulvas utilissimè subijcitur.

Elatinum.

CAP. XLIII.

FRacta elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionere spondet: aluum tamen non mollit.

Mel

Melinum.

CAP. XLIII.

Melinum hoc modo temperatur: Olei cōgins decem aquæ sextarijs admiscetur. Adycitur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetustâ tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem dierum spatio operimentis inuolunt, vt contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vinæ refrigeratorem & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniunculósque effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infusum, sudores cohibet, contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Oenanthini compositio. CAP. XLV.

Oenanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Adstringit proximum rosaceo effectum præbens: sed alium non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthen refert.

Tel

Telini componendi ratio. CAP. XLVI.

Foenigraci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituant, & cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vuluarum duritijs magnopere conuenit, fœminis difficilè parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prodest, vlcera capitis manantia fursuresq; expurgat, ambustus, & perionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recēs, quod non vehemēter fœnigraci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini compositio. CAP. XLVII.

Serpylli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frōdium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro viribus ipsorum coniectatione, vnātunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euincat: hæc post quadriduum exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura, & equali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet

tet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborū inguinumq; dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Lasitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulsorūq; cataplasmata utilissimè additur.

Ocimini compositio. CAP. XLVIII.

Ocimum oleum sit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarū vndecim, & beßis pondō, die noctūque viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhauseris quallum, rursus parum olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum equali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctūq; madefactas premito. Quod si in longum

gum

gum tempus oleum velis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficace est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. CAP. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras vndecim & bessem, maceratas in oleo die vna, manibus premito & recondito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntis auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Susinum.

CAP. LI.

Susinum, quod alij liliinum appellant, sic temperatur: Olei libræ nouem cum quincunce, calami libræ quinque & quadrans, myrrhæ vnciæ quinque, permisto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia decerptis folijs in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimitur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: (non enim, ut rosaceum, moram tolerat: nam concalfactum
fer

et & computrescit : quare sepius decapulan-
lum) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus,
& si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda.
Odoramentis iam expressis ex quasillo in label-
um transfusis, rursum olei prius odoribus imbuen-
ti, quod primum pōdus æquet, & cardamomi tu-
si drachmæ decem coniiciuntur. Hæc manibus sci-
è pressa, interiecta breui mora exprimuntur :
quod profluit, repurgatur. Tertiò eadem infundun-
tur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus mel-
le madefactis. Longè optimū erit, quod prius ex-
primitur : secundum, quod sequitur : tertium lo-
cum sibi vendicat, quod nouissimum prodit : De-
mò in mille lilia euulsis solus expressum primò o-
leum infunditur : tum eadem ratione prosequen-
dum, idemq; faciendum, vt prius, addito cardamo-
mo, dein expresso : & quò frequentius recentia li-
a maceraueris, eò validius vnguentū efficies. De-
nique cum factum abundè videbitur, singulis com-
positionibus miscere conuenit myrrhæ quàm opti-
mæ duas & septuaginta drachmas, & croci de-
cem, cardamomi quinq; & septuaginta : croci ve-
rò & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cri-
bratæ in lutrâ cum aqua demittuntur, expressumq;
primò vnguentum infunditur, & paulò post exci-
piuntur vasculis siccis, myrrha aut gummi antea
perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. Ea-
dem sunt in altera aut tertia expressione. Aliqui
implex ex balamino, aliòve oleo, & lilijs cōponūt.
Opt

Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redollet. Excalfacit, emollit vuluæ præclusiones, & collectiones aperit, vtilissimum ad muliebria mala: ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices cicatricēsque celerrimè ad colorem reducit, ita vt sepe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseaam parit.

Narcissinum.

CAP. LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ aspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinque assumentur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris, & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferverit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniunguntur, qui bidui spatio (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ durities, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

Crocium.

CAP. LIII.

Cum crocium componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisd

eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras
treas & semissem, croci vnciam vnam assumes,
identidem quotidie moueto, & sexta die, quàm
hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incerni-
to, eidem croco parem olei modum adycito, moue
triduo, dein contusæ myrrhæ atque cribratæ dra-
chmas quadraginta permisceto, & in pila agita-
tum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cypri-
num imbuto in crocini compositione vtuntur. Opti-
mum est, quod abundè crocum spirat, in medendi
vsu expetitur. Proximum, quod myrrham refert.
Calfacit, somnum allicit, quare per sepe phreniti-
cus subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut
illitum: pus mouet, vlcera purgat, contra vuluæ du-
ritias atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoëthe
vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, dupli-
cato olei pondere. Concoquit enim, emollit, hume-
stat, & permulcet: ad oculorum glauцитates ex
aqua illinitur. Huic autem proportionem respon-
dent butyrium, onychinum & styracinum: quæ
& si nominibus distant, viribus & compositione
cognata sunt.

Cyprini spissamentum. CAP. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cælestis
tantundem cum semisse, cuius vna parte
oleum diluitur, altera adyciendis odoramentis
admiscetur: dein assumptus aspalathi libris quin-
que, & semisse, calami libris sex, & semisse, myr-
rhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & do-

drante, olei libris nouem, & uncis quinque. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, contususque simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint, sublato alieno, oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo pressatur: & iterum aut tertio si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, orarum venarum adaperit, vuluæ neruorumque vitiijs conuenit, pleuriticis, fractisque per se vel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum oputulantur: item in acopa adijcitur.

Irini spissamentum. CAP. LV.

Spathæ quàm minutissimè contusæ sex libræ cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromati-

bi

bus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride
ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia
est componendi ratio: In olei septuaginta libris &
quincunce, xylobalsami (ut dictum est) contusi, li-
bras quinque & sextantem excoquito, postea de-
tracto xylobalsamo nouem libras & dextantem
aducito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato
perfusam, & in olei uia odoribus imbuti quatuor-
decim libris, totidem tussæ iridis, binis diebus ac
noctibus madesacito, strenuè & vehementer di-
stringito. Quod si vis validius fieri, par pondus
iterum ac tertio similiter maceratum exprimito.
Longè optimum est, quod solam irin olet, quale est
in Perga Pamphylia, & Elide Achaiæ natū. Vim
habet calfactoriam atque emollientem, crustas
adimit, sordida vlcera & putrida purgat: confert
fæminis vuluæ causarijs: item inflammationibus
eiusdem atque præclusionibus, partus eijcit, hæ-
morrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex ace-
to, ruiæ & amaris nucibus, prodest: diuturnis
destillationibus, naribus illitum, & contra gra-
ueolentia earum vlcera, quas oxenias vocant, au-
xiliatur: aliu purgat cyathus epotus, facit ad ilei
cruciatu, vrinam mouet, difficileis vomitiones
adiuuat, peructis eo digitis & immissus, vel ijs quæ
ad vomitū ciendum induuntur: angina etiam illini-
tur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item contra
arteria scabritiam. datur etiam ijs, qui cicutam,
coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

Gleucinum. CAP. LVI.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, asspalatho, fertula campana, costo, & musto: circumdatus interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulnibus; vitis auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Amaracinum. CAP. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentum est xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, conditusque amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carpobalsami & myrrhe odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogentius tusorum aromatum offus. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vris nam cit, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustus, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vulnæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulnæ tumores discutit, vulneratis neruis, & mu-

scis

sculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

Megalinum. CAP. LVIII.

FActitabatur olim megalinum, sed nunc compositio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad historię complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leniter emollit. Resina vnguenti, neque tutelę neque voluptatis gratia adijcitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendę ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedychroum. CAP. LIX.

Quod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditum viribus & misturis, quibus amaracinum, sed suavius spirat.

Metopium. CAP. LX.

Fit in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbanę mistionem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatum pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quam galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit, ora venarum aperit, vlcera purgat, extrahitque: ad præcisos nervos, & musculos, ad

hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur, horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulas detecta, & retrorsum contracta est, utile habetur sudores ciet, vulvæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium. CAP. LXI.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staëte. CAP. LXII.

Staëte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tuse, & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentum per se facit, quod staëte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mixturem admisit, cuius minima portio compos est viriū plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum. CAP. LXIII.

Cinnamominum confit è balanino oleo, & xylobalсами, calami, iunci odorati spissamentis, atque cinnamomi, & seminis balsamini suavitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur.

Laud

Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham
 edolens, crassum, odoratum, gustu perquam ama-
 ro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obti-
 nuit: resina enim neque amaritudinē prabet, ne-
 que ullam odoris gratiam adycit. Vim habet admo-
 dum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora
 venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humo-
 res & spiritus attrahit, caput aggrauat, contra
 vuluæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla effi-
 cax est. Ita enim ferè multum acrimoniæ exolefcit,
 & quædam emolliendi vis contrahitur. alioqui
 adurit, & præ omnibus crassis vnguentis indurat.
 Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera, quæ
 putredinis vitium senserunt: item ad hernias hu-
 midiores, carbunculos, februm horrores, tremores,
 gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpen-
 tium morsus illinitur, scorpionum & phalangio-
 rum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. CAP. LXIIII.

Ratio nardini ficiundi euariat. Nam aut
 malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq;
 autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odora-
 tus spissamenti gratia adycitur: sicuti propter odo-
 ris suauitatem, costus, amomum, nardum, myr-
 rha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi
 aride aut amomi odorem referens. Vis ei exte-
 nuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget hu-
 mores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet
 strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat.

Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinum. CAP. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet, insuper myrrhæ plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Iasminum. CAP. LXVI.

Apuà Persas fit, quod iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant: grauius enim spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. CAP. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectis tegetes, alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, qua expressa, stacte emittitur. Alia gabirea pinguisima, læto & pingui solo nascens, ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiridis, ac mordens.

dens. Quinetiam legitur tenuis quædã, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carēs, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modo candidas & laues ostēdat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: supernacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vulnam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit, cum absynthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluvio, & dysenteria: horrores discutit, duabus horis ante febrim accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua: subdita linguae liquataq; scabritie arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum man-

ditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alu-
mine illinitur: gingiuas & dentes stabilit, colluto
cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutin-
nat, medetur fractis auribus ac ossibus nudatis,
peruncta cum crechle & carnibus. Item purulentis
auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, &
glaucio: ad varos autē cum cassia & molle illini-
tur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capil-
los cum lalano & vino myrteo illita, firmat: diu-
turnas destillationes lenit, illitis penna naribus:
oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginē
discutit, scabritiē laeuigat. Fit ē myrrha, perinde
atq; thure, siligo, & ut postea ostendemus, ad ea-
dem conueniens. Bœotica myrrha, dissecta radix
est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior
est, quæ myrrham odoris suauitate repræsentat.
Vis ei calfactoria inest, emollit discutitq; suffimē-
tis commodissime inferitur.

Styrax. CAP. LXVIII.

Λιπαρὸς, **S**Tyrax lacryma est arboris malo cotoneæ si-
milis. Præfertur * sordescens, flauus, resino-
id est, pin-
sus, albicantibus grumis, quàm plurimum in sua
gus. odoris gratia permanens: qui dum mollitur, mel-
leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pisi-
dia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursuro-
sus, friabilis, canoq; sitin obductus. Cæterum la-
cryma inuenitur gummiū similitudine, perluci-
da, & myrrhæ æmula: verum per pauca manat.
Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi eroden-
tes

es excasserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odori-
 zus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrac-
 e subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida
 aqua veluti vermiculos exprimunt, venun-
 dantque. styracem hunc [quoniam in vermiculo- Adiectū ab
 rum speciem contrahatur] scoleciten cognomi- interprete.
 nant, tanquam sincerum imperiti approbant, nō
 animadvertentes ad præcipuam odoris fragran-
 tiam: siquidem acer admodum est, qui adultera-
 tionis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, &
 concoquit: medetur tussi, deſtillationibus, ran-
 cedinī, grauedinī, & interceptæ voci: vulæ præ-
 clusæ duritiæve laboranti conuenit, cit menses po-
 tu appositūq; aluum leuiter mollit, si exiguum cū
 resina terebinthina catapotij modo deuoretur.
 Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, aco-
 piſque. Adoletur autem & igni torretur, vt fiat
 ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem cōueniens
 ad quæthuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styrac-
 cinum oleum componitur, quod calfacit vehemē-
 ter, & emollit: verū caput dolore afficit, adgra-
 uatq; , & soporem adfert.

Bdellium. CAP. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madel-
 con: lacryma est * saracenicæ arboris. Pro- * Vox adul-
 batur gustu amarum, translucidum, taurini glu- terina Mar-
 tinus in morem, intus pingue, liqueſcēs facile, ligni cello.
 ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile.

Est

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas conuolutum, asphalti odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum nõ perinde gustui amaritudinẽ representat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidãque hernias discutit, cum ieiuna salina dilutum: vuluæ spiracula laxat appositu & suffitu, & partus humiditatesq; omnes extrahit, calculos potu comminuit, vrinam mouet, tuſſientibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmati inseritur, quæ contra duritias & nervorum nodos prosunt: contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

* ὑπόκρη=

Thus.

CAP. LXX.

ῥο, id est, subrusum est.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò * fuluescit, & colore li-

id est, Arauet, sed rotundum industria factitant: nam in quibus dictũ, drangulares formas dissectum fictilibus versant, & quod in donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi Smilo pro- thus tempore flauescit, quod atomum aut syagriũ uenit. appellant. Secundum locum habet * Arabicum,

& in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocāt,
 minus multò & fuluius. Est & genus aliud, cui
 amomite cognomen est, alioqui candidum: quod
 dum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adul-
 teratur * in itinere, pini resina & gummi, quod * μισθὸν ὄν
 facile deprehendi potest: siquidem suffitum gum= μισθόν, id
 mi flammam non eiaculariur, & resina in fu= est, artifi=
 mum euanescit, thus verò statim ardet: idem ma= ciosè confor-
 lesicium odor prodit. Ad calfaciendum & adstrin matum. Sic
 gendum pollet, oculorum caliginem discutit, caua Marc.
 ulcera complet, & ad cicatricem perducit, cruen-
 ta vulnera glutinat, infranátque cunctas sangui=
 nis eruptiones, etiamsi cerebri membranis effluat:
 ulcera, quæ cacoëthe vocantur, & sedis & reli-
 quarum partium permulcet tritum cum eo & la-
 tte linamentum, formicantes verrucas inter ini-
 tia, impetiginésque, ex aceto & pice illitum, tollit:
 ambusta igni, pernionésque cum suillo adipe aut
 inferino, & ulcera in capite manantia cū nitro,
 si infricetur, sanat: paronychis cū melle, auribus
 fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium do-
 lores cum dulci vino infunditur, inflāmatæ à par-
 uā māmæ cum cimolia & rosaceo magna utilita-
 te perunguntur, additur ad arteriæ viscerumque
 nedicamenta, prodest sanguinis excreationi po-
 tum: sed in secunda valetudine haustum insaniam
 mouet, & largius cum vino potum interficit. In
 scitili mūdo thus crematur, flagrans glebula suc-
 censum à lucerna, donec exuratur: post perfectam
 vstionem

ustionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alii crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporemve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. CAP. LXXI.

Prefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eiu cortice, sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ei aculat. Thuris modo vritur, & vis eadem quae thuris sed validior adstringentioreque. Quare potius cruentis excreationibus, vulnus fluxione laborantibus in pello confert, ad cicatrices oculorum, & caufordisque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. CAP. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui contrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant: sed haec igne deprehenduntur.

tur. Neque enim aquæ suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suauolentiaë halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensus singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam cocauam imposito: & æreo vase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito: alteram admoneto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si uratur: & quò locus capax fuerit, glebularum alias supposito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris coëgisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato aeris fenore, fuligo omnis inherebit: quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admiscetur. De-rasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi videtur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eidem adscribuntur, sed quandam flagitat specierum distinctionem.
arbor

arbores vulgò cognita: quarum cortex adstrin-
git, prodest tritus & illitus intertrigini, vlceri-
bus summum corpus occupantibus, ambustisque,
cum spuma argenti & manna. Vlcera delictu-
lorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino
exceptus, ad cicatricem perducit: tritus cum su-
torio atramento serpentina cohibet, suffitu partus
& secundas eicit, potus aluum sistit, vrinam
mouet. Folia eorum trita & illita inflammatio-
nes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicāt,
trita autem & decocta aceto, feruenti collutione,
dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt,
drachmæ pondere in aqua aut mulsæ pota. Pineæ
nucis cortex & folia potu idem præstant. Teda ea-
rum particulatim secta si in aceto coquatur, &
decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam
fit spatha acoporum pessorumque cõpositionibus
idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad
librarij atramenti confectiõnem excipitur: ea cir-
cumlutionibus efficacissimè imponitur, quibus
palpebras ornant, colorémque mentiuntur, calli-
brephara Græci vocāt: arrosis oculorum angulis,
callofis glabrisque genis, & collacrymationibus
opitulatur. Pityides appellantur pinorum piceæq;
fructus, qui in conis inueniuntur. Vim adstricto-
riam habent, & aliquatū excoficientem tussi
& pectoris vitis auxiliantur, per se, aut ex melle
sumpti. Nuces pineæ cum strobili repurgatæ
manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine
bib

Pityides.

bibuntur, urinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, stomachi rofiones leniunt: datæ cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussæ ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus.

CAP. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liguamentum autē ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquantur, & ubi abundè cocta refrigeratæque sunt, folia abijciuntur: aqua denuò coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice, dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, * quod *γυνήν* prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, Mastix of & ab aliquibus, * mastiche. Pota vilis est ficinis.

sanguinem reijcientibus, & tussi veteri stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat, manducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula *Inseritū* ab Chio prouenit. Præfertur [nitedulæ modo] reinterprete. splendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex adstringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus cōueniunt, simili parata modo sumptæque. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, urinam mouet, venærem excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petrea defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis: sed præualet candida, perlucida, vitreo colore, & inceruleum vergente, odorata, terebinthum olens.

Officinis, * Terebinthina resina omnis antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, urin

urinam cient, cruda concoquunt, ventrem emol-
liunt, palpebras commodissimè replicant, lepras
tollunt, cum æruginè ac sutorio atramèto, nitroq;
auribus saniem emanantibus cum melle & oleo,
item in pruritu genitalium viles: malagmatis,
acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se,
illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ.

CAP. LXXVII.

Liquida resina è pinu & picea, à Gallia &
Hetruria conuehi solet, atque olim à Colo-
phone petebatur: hinc Colophonie sibi cogno-
mentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina:
quam vernaculo nomine laricem appellant inco-
e. Ea in linclu, & per se, magnopere prodest
ussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia
candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris simili-
tudine, ut larigna. Cupressus etiam liquidam sum-
it resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ verò ari-
larum generi adscribuntur, quædam ex pineis nu-
cibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt.
Eligi debet longè omnium odoratissima, translu-
ens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ
faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete re-
sinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq;
his odore imitantur. Præstantiores à Pityusa
insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita
est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupresso
manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potius
ur. Veruntamen eorundem gratia, quorum &

illa sumi solent. Lentiscina terebinthina respon-
det. Vritur resina omnis liquida in vase quadru-
pla capacitatis ad humorem, qui infunditur: ita-
que resinae congius, in duobus aquae pluuiæ coqui-
tur, subiectis leuibus prunis, resina assidue moue-
tur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis &
retorrida reddatur, ac digitis cedat. Caterum ubi
refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum vo-
cant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij
candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quod
feculenta sordes excernatur. Vrantur quoque sine
aqua, primum lento igne: & ubi coire cœperunt,
maior carbonum strues supponitur, & triduo ci-
tra intermissionem discoquuntur, usque dum an-
tedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, ut dictum
est, reponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse
satis est. Vstæ odoratis malagmatibus, & acopis,
& unguentorum colorationibus magnopere utiles
sunt. E resinæ perinde atque ihure fuligo excipia-
tur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebrae
fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris ge-
nus, collacrymationibus, erosisque oculorum angu-
lis, ex ea sit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pin-
guissimis pini piceæque lignis congregatur.
Optima est splendens, sincera, leuis. Contr
venena, phthisin, purulentam excreationem, tus-
ses, suspiria, & pectoris humores, qui difficile ex-
tusiu

tussiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & ruae inflammationes, anginaeq; vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus: adiecta verò pariter cera scabros vngues extricat, impetiginesq; emendat: vuluæ duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinâque hordeacea & pueri impubis vrina decocta, strumas rumpit: cohibet vlcera, quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Caterum cum thuris manna & cera toto profundos vlcerum sinus conglutinat, rimis seculi & pedum, magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum rua pasta, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarinat, disrumpitq; erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probè immiscetur.

Picinum oleum. CAP. LXXIX.

E Pice sit quod pisselleon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut seruati. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; habitu eius exprimuntur in vas. * Quas pix liquida sunt, habet utilitates, alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix melletur, iumentorum vlcera scabiemq; emendat.

Fuligo liquida picis. CAP. LXXX.

E It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna nona, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis.

incendito, lucernamque fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operiato, & adoleri finito: consumptoque liquore novum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. Usui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososque oculos, insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

Pix arida.

CAP. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrusa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pamosque discutit, ulcera replet, vulnerarum medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa.

CAP. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt derasam navibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen.

CAP. LXXXIII.

Bitumen Indicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpurea modo splendeat, sitque ponderosa.

ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur picce. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Acragantino Siciliae, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunij montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

Naphtham vocant Babyloni, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio proximius in eam transfiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu, emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagata lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tussim veterem & anhelitum adiuuat, serpentium moribus, toxendicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur coeliacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysen-

tericis cum ptisana liquatum infunditur, de stillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum, ceterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum: concalsactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

Cupressus. CAP. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passo, & exiguæ myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur. Pilulae autem ex vino tusa in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè præbet effectus: tusa cum fico duritias emolliunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinus detrita scabros ungues eijciunt, hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulae cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus, quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus. CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera minor,

por, vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mo-
 uet, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ
 nucis iuglandis magnitudine, nonnunquam gran-
 descere, aliæ * nucem Ponticam æquare inueniunt * Auellana
 ur: rotundæ, odoratæ, in mandēdo dulces, subama- intellige.
 ræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ iuniperi
 nominantur. Modicè calfaciunt, & adstringunt:
 stomacho vtilis: contra pectoris vitia, tuſſim, infla-
 tiones, tormina, & serpentium ictus efficacissimè
 hibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, conuulsis, &
 vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam
 habent: ideo tam ipsa, quàm eorum succus, ex vi-
 no contra viperarū morsus illini aut bibi prodest.
 Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ra-
 mentaligni deuorata interficiunt.

Herba Sabina.

CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cupresso
 similis, spinis horridior, grauitèr olens, acris
 & feruens: arbor est coactæ breuitatis, quæ sese
 magis in latitudinē fundit: huius folijs nonnulli pro
 ſuffitu vtuntur. Altera tamarici folio similis est.
 Vtriusq; folia nomas sistunt, collectiones illitus miti-
 gant, & cum melle nigritias sordesq; repurgant,
 carbunculos cum vino pota rumpunt, sanguinē per
 vrinam eliciunt, partus apposita extrahunt, &
 ſuffitu idem præstant, vnguentis calfacientibus
 immiscentur, & priuatim gleucino.

Cedrus.

CAP. LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colli-

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas
 parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas.
 Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odo-
 ris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata.
 Cedrus coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conser-
 uentur, mortuorum uet, & uiuentia corrumpat: quæ ex causa mor-
 uita dicta. tuorum vitam aliqui appellauerunt. Vestimenta
 quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi
 dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamen-
 ta usus, quippe illita oculis claritatem affert, al-
 bugines cicatricisq; detergit: instillata autem cum
 aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto
 infusa sonitus sibilosq; sedat, canis dentium indi-
 ta eos frangit, & dolores lenat. Idem facit cum ex
 aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali
 abortiuum fieri constat: angine ea perunguntur,
 tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes
 pediculosq; illitu enecat, cerastæ morsibus cum
 sale impoita subuenit, contra hausta leporis ma-
 rini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in ele-
 phantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pul-
 monum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbea-
 tur, persanat: vermes & tineas subter indita ne-
 cat, & parius extrahit. Fit & oleum, à cedria
 separatum, dum coquitur, velleribus supra hali-
 tum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia
 usus: priuatim vehementer perunctum scabiem
 quadrupedum, canum, bouumq; persanat: inhaeren-
 tes ricinos enecat, ulcera quæ ex tonsura accepe-
 runt,

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, cōuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginē, quo modo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

CAP. XC.

LAurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, vuluæ & vesicæ vitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumque ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouet. Lauri bacca magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate triata cum melle vel passo prosunt tabi, orthopnœæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, vitilignes emaculant. Succus baccarum vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosa ceo. In medicamenta autem adiunguntur, quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocant: & ad vnguementa, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest.

prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Platanus.

CAP. XCI.

TEnerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentium moribus auxiliantur: ex ceptæ autem adipe, igni ambusta sanant, insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

CAP. XCII.

FRaxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus.

CAP. XCIII.

Potus albæ populi cortex vnciæ vnius pondere, ischiadicis ac vrinæ stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes posita, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilule, quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriæ proderunt corticem albæ populi, & nigræ particulatim cæsum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigræ folia cum aceto illita, magna vtilitate podagric

gricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lacrymam populi commemorant, quæ in Padum annu defluat, dicitur De ortu electari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, electri multa alii chrysophorum. Id attritum iucundum odore spiritus lib. vlt. cap. rat, et aurum colore imitatur: tritum potumque sto 3. et 4. apud machi ventrisque fluxiones sistit. Plin.

Macer. CAP. XCIII.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, et alii fluxiones bibitur.

Ulmus. CAP. XCV.

Vlmi et folia et cortex et rami, vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in lori morem flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solidescent, si decocto foliorum, corticis aut radice foveantur. Humor in folliculis nascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorem prestat. Quiddam siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia usurpantur.

E Lignorum marcor. CAP. XCVI.
Ex caudicibus lignisque veteribus caries coegitur.

ritur, quæ farina modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, lintesq; imposita illinantur.

Harundo.

CAP. XCVII.

IN harundinum genere quædam nastos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia fœmina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu valatoria, gracilis, cãdicans, vulgò cognita: cuius trieta radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumque dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur, paniculæ lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus.

CAP. XCVIII.

Papyrus, qua chartæ sunt, nullis non cognita, præcipuè in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatu, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Ae-

gyp

gyptij eā mandunt, succum tantum deuorantes, & nansam expuunt. Ipsīs radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascentia vlcera cū mniū partium, tum oris maximè, cohibet: verò melius id combusta charta præstat.

Myrica.

CAP. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgò cognita est, Officinis cū apud pigras & stagnantes aquas ena Tamari= catur, fructum quasi florem ferens compage muscus. cosum. Aegyptus Syriæque alteram gignunt nitiozem, syluestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter adstringentem rustu: quo conuenienter vtimur vice gallæ in melicaminibus oculorum orisq;. Datur cruentæ excretioni in potu, & cæliacis, & contra profluuiā fæminarum, regium morbum, & phalangiozū morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eosdem vsus adhibetur. Decoctum filiorum cum vino cotum, lienem absūmit: ad dolorem dentium in colutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ pporiūnis in desestionibus, phthiriasi lendibusq; circūfusus prodest, abundantiam fæminarum istit impositus arboris cinis, potorios calices eaudice lienosis moluntur, quò datus in his potus roficiat.

Erica.

CAP. C.

Erica* fruticosa arbor, myrica similis, longè * Plin. fruticosa minor: cuius flore apes reprobū mel efficiunt, cem dicit. a flos quā comā serpētū iētibus illitus medetur.

Acac

Acacalis. CAP. CII.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fructu-
ticis, seminis myricæ quadātenus similis: cu-
ius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur,
quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus. CAP. CIII.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens
rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, fo-
lijs paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterū
ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq;
folijs constat, & quadātenus rubetibus:
cuius rami quinim ferè cubitorum longitudinem
implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus mi-
nusq; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, can-
didum, tennem, folliculariq; specie, & verticillo simi-
lem. *σφοδῖλω, lem.* Omnium folia igni sacro, & serpentibus
id est, a= vlcerebus, efficaciter illinuntur. Fama est ra-
sphodeli fru mos. huius valus fenestrisve impositos, veneficia.
Etui simile: depellere.

Halimus. CAP. CIIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, simi-
lis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latiori-
bus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia deco-
quuntur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta,
torminaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mul-
sa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus. CAP. CV.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, du-
rus, cuius semen pingue & fuliginosum in-

uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorū decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

Acuta spina. CAP. CV.

Acuta spina, quam pyrinam aut pityanthen Officinarij aliqui vocant, arbor est pyrastri similis, spinosa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendentem. Huius baccae potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam foeminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut semel feriatur, aut perungatur.

Rubus canis. CAP. CVI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: seruefacti enim in vino, mox poti, arteriam inestant.

Ligustrum. CAP. CVII.

Ligustrum arbor est oleæ folijs circum ramis similibus, latioribus, mollioribus, & Alcanna.

f

colore viridioribus flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia adstrictoriam vim habent: quare commanducata ulceribus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur, capillum rufant trita folia, quæ in radice succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitque nervos: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

Tilia. CAP. CVIII.

Xivw,* **Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu lenis tisci, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia adstringunt: ad eadem vitilia ad quæ oleaster, cum adstrictione est opus: maxime ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus. CAP. CIX.

Vox ex Plinio reposita.* **Cistus, quem aliqui citharon, aut cissaron vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vi mali puniceæ, semina albet. Vis adstringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent, vetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistus, orobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices

radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamẽ exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliqua; vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verum aliquantò magis siccatur, & adstringit. Prodest dysentericis, coliacis, sanguinem excreantibus: faminarum profusio & pota & indita.

Ladanum.

CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem ladani non conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhaerescens reportant: quam deperentes incole, colantesq; cogunt in offus, & ita recondunt. Alij verò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subviride, facile mollescens, pingue, quod aræas non collegit, nec squallore oblitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumque vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illu-

f 2

tum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit, pestis immistum vuluæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tuſſimq; ſiniunt, & malagmata vtiliter inferitur: album ſiſtit cum vino vetere potum, & vrinam ciet.

Ebenus.

CAP. CXI.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens venarum diſcurſus, factitij cornuſ laeuore: cum frangitur denſa apparet, mordens guſtu, atque leniter adſtringens. Suffitur iucundo odore ſupra carbones, ſine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem ruſeſcit. Altera eſt Indica, internatis ſegmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis: cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam ſeſamina, aut ſpineæ ligna conſimilia pro ebena veneunt: quod diſcernitur ex eo, quòd fungoſa ſunt, & in purpureas aſſulas reſoluuntur, nihil mordacitatis in guſtu, nec redolentiæ in ſuffitu præferentia. Caliginem oculorum abſterget, ad veteres deſtillationes puſtulasq; mirum in modum pollet: ſi quiſpiam facta ex eo coticula collyrijs vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax eſt, ſi ſcobs ramentæve vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipſa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fictili no-

uo,

no, donec in carbones redigatur. Lavatur plumbū
vsti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus
conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca multo
magis. Succus recentibus folijs exprimitur,
de seclis forfice vnguibus (sic appellantur candidæ Quid vno
foliorum partes) reliquum in pila premi & teri quis intro-
lebet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculo-
um circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum
folia rosarum, continuo versata, ne muceant, ne ve-
ritus in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis
expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium,
oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini ac vul-
væ, penna illitus aut infusus. Eadem sine expres-
sione tusa, præcordiorum inflammationibus, hu-
midis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest: sic-
is ac tritis femina asperguntur. Misceri solent
vulnerarijs antidotis, atque compositionibus,
quas antheras vocant. Folia vruntur in calli-
olephara. Flos, qui in medijs rosis inuenitur, sic-
atus, gingivarum fluxionibus efficaciter insper-
ritur. Capita pota citam aluum, & cruentas reie-
ctiones sistunt.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nullo
antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-

cem, myrrha drachma sex, trita digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus aequent: siccatique in umbra, in fictili non picato, atque obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricae totidem, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad illitiones & diaspasmata, quae sunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperris, nigro, leni, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Succus extrahendi ratio haec est: Rami cum radiculis tusti, & antè per multos dies macerati, coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurcae, aut absynthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamenti additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimũ, quod vri potest, restinctumque rubentẽ spumam ostendit, glebis

bis extrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis,
 & odore minimè viroso, cum amaritudine adstringit. * Ita ex Plin.
 gens, crocino colore (cuiusmodi Indicum est) cæteris nio.
 præstantius atque efficacius. Lycium adstringit,
 caliginem oculorum discutit, genarum scabiem,
 pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad puru-
 lentas aureis, exulceratas gingivas, tonsillas, labio-
 rum fissuras, sedis rimas, attritusq; illi: cælia-
 cis, dysentericis, potum inditumque conuenit: da-
 tur sanguinem excreantibus & tussi, ex aqua:
 contra rabiosi canis morsus in catapotio deno-
 ratur, aut in aqua bibitur: flavos facit pilos: re-
 duis, vlceribus, quæ serpant aut putrent, mede-
 tur: foeminarum profluvia appositum sistit: ra-
 biosorum ictibus ex melle potum, aut vice catapo- * Videntur
 ti denotatum, auxiliatur. * Tradunt Indicum fieri Marcello
 lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea spina= quæ hinc se-
 rum generi adscribitur, ramos rectos habens ter= quantur, no-
 nùm cubitorum longitudine, maioresve, rubo cras tha.
 flores, à radice numerosos. Fractus cortex rubescit,
 folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur
 lienis inflammationibus & regio morbo mederi, * Non est
 & foeminarum purgationes elicere. Assenerant genuina of-
 etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. ficinarum
 Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurga= Acacia,
 re: venenis quoque auxilio esse. quâvis ea=

Acacia.

CAP. CXV.

dem vi ac

A Acacia in Aegypto nascitur spina instar ar- natura præ-
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens, dita.

Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra: niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimat, mensuram abundantiam sistit, prociduum vuluam cohibet: citam aluum suppressit, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lavatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu terflata. Spinae decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinae gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustus ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acaciae genus in Cappadocia Pontóque provenit, Aegyptiæ spinae similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semen lentis
tricula

icula minus fert autumnno, in loculis cōnexis, ternum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex. CAP. CXVI.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; agnus calidis locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fruticosos. Et peruiaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius, una harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excelsæ vires habet, & adstringentioras. Semen eius potum venenatis ictibus, aquæ, quæ cutem subijt, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet, drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit, caput tentat & soporē affert. Decoctum herbæ & seminis in defensione, mulieribus vuluæ malo opportunus opitulatur, item inflammationibus: purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoque serpentium morsibus auxiliantur: testium duritias cum butyro & folijs vitium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgum qui ma Nominum nu teneat dum iter facit, negatur intertriginem agni & ly sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Græci ratio.

ci, quoniam matronæ in thesmophorijs Athenien-
sium castitatem custodientes, folijs huius cubitus
sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter inui-
etiam ferè ramorum flexilitatem.

Salix. CAP. CXVII.

Salix vulgò nota est: cuius semen, folia, cortex
& succus spissandi vim habent. Trita folia
cum exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniunt:
sumpta per se & cum aqua præstant mulieribus
ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinè
expuentibus prodest: cortex eosdem præbet effe-
ctus. Corticis cinis admisto aceto maceratus, illi-
tu clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice suc-
cus cum rosaceo in calyce punici calfactus, au-
rium doloribus auxiliatur. Decocto eorum poda-
gras foueri utilissimum: fursures purgat in cor-
pore. Excipitur succus, qui manat ex ea cum flo-
ret, exciso cortice: in plaga enim concretus hu-
mor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant ocu-
lis, suam vim præbet.

Sylvestris olea. CAP. CXVIII.

Sylvestris olea, quam Latini oleastrum appel-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstrin-
gunt: trita autem & imposita ignem sacrum, vl-
cera, quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, redu-
cias nomasque cohibent: crustas emarginant
cum melle illita. Quinetiam sordida ulcera repur-
gant: inflammationes panosq; cum melle im-
posita discutunt: cutem à capite vulsam congluti-
nant;

ant: oris vlceribus, & priuatim infantium, com=
manducata medentur. Succus & decoctum eosdē
habent effectus: sanguinis eruptiones, ac mulie=
re profluuium, ad motus succus inhibet: vna o=
culorum, pustulisq; prodest: vlcera & veteres
lesiones sistit, (quæ propter in collyria addi=
tur.) ad genarum erosiones perquam utilis. Expri=
mitur succus tuis folijs, affuso vino aut aqua,
siccatusq; sole in pastillos digeritur: sed longē va=
lidior ad recondendum succus habetur, qui cum
vino quàm cum aqua expressus est. Auribus sub=
uenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia con=
uenienter cocti acis cum farina hordacea illumina=
tur: vruntur cum floribus folia, ut spadij vicem
cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, vsque
dum siglinum percoquatur: restinctaq; vino &
rursus subacta, eodem modo vruntur, postremò ce=
russæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusce=
modi cinerem in medicamentis oculorum constat
spodio non cedere, sed eisdem viribus præditum
esse putandum est. Foliorum fatiue olea eadem
vis intelligitur, sed aliquantò inferior: vnde ocu=
laribus medicamentis ob suam mitiorem vim con=
uenientior est. Sudor ligno virenti accenso ma=
nans, illitus sanat lichenas, furfures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur surfuribus, &
vlceribus quæ depascunt vorantq;: quod autem in=
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros m=
gues excutit. Colymbades tritæ & ambustis il=
litæ

lit & pustulas gigni prohibent, sordida ulcera purgant, muriæ succus collutas gingivas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua, & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilis, calfacti fotus gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admoouere, donec albæ spectentur.

Lacryma Aethiopica olea.

CAP. CXIX.

Lacryma, quæ Aethiopica olea stillat, scammonio similis quadamtenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastrisque, similem lacrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, urinam & menses ciens, canis dentium impressa ad dolores efficacax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis olea.

Amurca. CAP. CXX.

Amurca (expressæ oliuæ recrementum) decoct

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insup-
 dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino
 aut mulso commodè illinitur: additur in medica-
 menta ocularia, & meatus inductu suo obstruē-
 tia. Vetustate meliorem fieri constat. Utiliter in-
 funditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulceratio-
 ni. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis
 crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumento-
 rum scabiem cum decocto lupini, & chamaeleonte
 illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras
 articularesque dolores foueri, utilissimum: perũ-
 cta in villosa pelle, & hydropicis imposita tumo-
 ris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus, ilex.

CAP. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet,
 præsertim liber, qui cortici & ligno inter-
 cedit: quinetiam tunica putamini
 glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysen-
 tericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in
 pello, foeminis fluxione vuluæ laborantibus subij-
 citur. Glâdes eosdem effectus exhibent: urinam
 ciunt, capitis dolorem & flatu in cibum sumptæ
 pariunt, resistunt esitata venenatorum iclibus.
 Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino
 potum, prodest contra toxica: intrita crudæ, in-
 flammatiores illitu leniunt: ad duritias, quas ca-
 coethe vocant, & malefica vlcera cum salsa axũ-
 gia

gia conueniunt. Iligne & glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi astignantur, & consimile munus obeunt. Iligne radicis cortex cum aqua coctus, cum mollis intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillus membrorum partes corroborant.

Castaneæ. CAP. CXXII.

Sardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercursat. Carobis, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, solidula, nullo foramine peruiua. Altera plana, leuius, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Trita excrecentia in carne, fluxiones gingivarum & rucæ, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus, dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbombus, donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum, quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulnus procidentia, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis cœliacisq; cum vino an

ut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibum
ur: obsonijs addi debet, aut integra in aqua præ-
qui, in qua nihil excoquendum est, quod his
fectibus conferat. In summa, his utendum ad ad-
ringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus. CAP. CXXIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Officinis *ser-*
erythros appellata, semine est coriary fruti- mach, Ara-
is, sic vocati, quoniam coriorum infectores eo vtun- bum more,
ur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris
ascens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs
blongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acina-
uarum gracilium denso, magnitudine terebinthi,
madamentenus lato: cuius corticosa tunica per-
uam utilis est. Folia vim habent adstringendi,
& acacia effectus præbent. Decoctum capillos
emigrat, dysentericus infunditur, & in potu eo-
um in seßusq; adicitur: insillatur auribus puru-
ntis. Gangrenæ & pterygia cohibent folia ex
ceto aut melle illita. Liquamentum sit ex aridis
lijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad
adem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effe-
lus exhibet: coeliacorum, dysentericorumque ob-
nijs inspergitur: fracta, desquamata, liuida q;
litum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lin-
ua asperitates cum melle abstergit, candida foe-
inarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat,
um querno carbone intrito admodum. Aqua, in
ua semen maduit, decocta, cogitur conque effica-
cior

cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium canis imprimatur, ad dolores finiendos.

Palma. CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumno decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est & adstringens: contra alui scæminarumq; profluvia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt, copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum cotoneo & cerato ænanthino vesicæ vitæ. Cariotæ, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri sumptum: ciboidem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu & gargariatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto, spodij vicē efficiunt: miscenturq; in calliblephara. Quod si non iustam vitionem acceperint, denuò cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculorum ruam & pustulas, palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præbent.

bent: corporis excrescentias cum vino reprimunt, ulcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. CAP. CXXVI.

Palma, quam aliqui elaten aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc florentium, involucri est calyxq; quo in spissamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, praelusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit ulcera quae depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis: prodest praecordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congrue, renum, vesicae, & viscerum vitijs: vuluae ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Involutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathae effectus praestat, non sic vnguentis expetit. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit, quae borassus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

Malum punicum omne boni succi est, stomacho Vulgo malcho utile, perexiguum sufficiens alimentum granatum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed tum. aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febre abdicantur. Acida ad-

stringunt, æstuantî stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; ledunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidî punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem aluum stomachumq; sistunt. Cœlesti aqua madescent, bibunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad desessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione vulvæ laborantium vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reiduias, & ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia: præsertim acidorum.

Cytinus.

Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstant utilitates: humida gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, hereniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoria tradunt, qui tres quàm minimos cytinos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplum.

Malicorin.

Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet usus. Deco-

Balaustium.

easdem euocat. Balaustium sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstr-

adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypaci-
stus, & cytinus.

Myrtus. CAP. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina
quam candida, & in hoc genere multo
magis montana: semen tamen imbecillius parit.
Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viri-
de aut aridum in cibo datur sanguinem excrean-
tibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus
bacis expressus eosdem effectus exhibet: stoma-
cho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij
morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis de-
coctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera
in extremis membris nata sanat, oculorum inflam-
mationes illitum cum polline polentæ lenit, contra
agilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum
vinum, quod feruefacto aliquantum eius semine
exprimatur: alias enim acorem contraheret. Præ-
stat idem seminis effectus. Utile procidentia vul-
varum, in desectionibus sedis virijs, & feminis flu-
xione vuluæ laborantibus purgat furfures, ulcera
capitis manantia, atque eruptiones papularum
fluentes, capillos continet. Additur quoque in me-
dicamenta, quas liparas vacant, uti oleum quod
ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad
desectiones balnearum convenit, & contra laxa-
tos artus, & malè solidescences. Eo fracta ferru-
minationi repugnantia utilissimè foveantur, vitili-
ginem emendat, purulentis auribus infunditur.

§ 2 capit

capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimatur folijs succus adfuso vetere vino aut aqua coelesti, cuius recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidaceum dicitur, adnatum inaequabile, verrucosum intumescensque, & concolor: quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. Magis quam myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccatur in umbra, multò efficacius, & folio & semine, cerato, pessis, in sessionibus, cataplasmatu admistum, ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia.

CAP. CXXIX.

Cerasia alio vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata, illam sistunt. Gummi, quod cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetustè medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Siliq

Siliqua. CAP. CXXX.

Siliqua recentes stomacho aduersantur, aluum Gracis Celsoluuunt: eadem siccata sistunt, stomachoque ratia: artiliores fiunt. Vrinam ciunt: sed præcipue, quæ bor autem vinaceis conuoluntur.

Mala. CAP. CXXXI.

ipsa Gale-
no cerato=

Folia, flores, & germina cum omnis mali, nia dicitur. tum maxime cotonea adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest: maturis verò longè secus. Eæ uis uernabilem gignunt, neruos omneis ladunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, urinam ciunt: uerum tosta mitiora habentur. Prosunt celiacis, dysentericis, purulenta extusientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fomentur vuluæ, & sedes si procidant. Cotonea, quæ melle conuoluntur, urinam mouent: mel autem si bi constringentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmati adyiciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis expressuq: sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia.

que dicta sunt. Sit & oleum ex ijs, quod melinum
 vocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo
 est opus. Eligi oportet vera, que sanè sunt rotun-
 da, parua & odorata: que verò Struthia dicun-
 tur, magna quidem sunt, sed minus vtilia. Flos
 & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs
 conueniens, que adstrictionem desiderant, inflan-
 matibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis.
 Contra citam aluum, & mensium impetus, in vi-
 no bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo
 animalia expellunt, stomacho negotium exhibent.
 Aestiuosa. Ea multis dulcia mala vocantur. Epi-
 rotica mala, que Latine orbiculata dicuntur, sto-
 macho vtilia: sistunt aluum, vrinas euocant, ma-
 lis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala
 similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc
 vsum immatura omnia opus sunt. Persica po-
 ma matura tam stomacho, quam veri vtilia sunt.
 Acerba aluum cohibent: sed sicca vehementius.
 Decoctum è siccis alui stomachiq; fluxiones sistit.
 Armeniaca, que a Latinis praeocia dicuntur,
 minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora.
 Medica mala Persicave aut cedromela, qua
 Latini ciuria vocant, nemini non cognita. Arbor
 ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs de-
 ciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est,
 rugosum, colore aurum imitans, cum granitate
 odoratum, semen habet pyri. Id in vino potum ve-
 neni resistit, aluum mouet, oris suauitatem com-
 mendat.

mendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiarijs impositum ab erosione vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra.

CAP. CXXXII.

Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: promde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata lædunt.

Achras pyrastræ genus est, quod tardissime maturescit. Vim pyro adstringentio rem habet, & ad eadem conuevit: stringunt etiã eius folia. Lignis pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cõ eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus.

CAP. CXXXIII.

Mespilus, quæ à nonnullis aroma vocatur, spinosa arbor est, folio pyxacanthæ: fere pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esus adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alteri mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanti, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor.

CAP. CXXXIIII.

Lotus arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-

tam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis ac foemina fluxione vuluæ laborantibus, auxilio est rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus

CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virēt, deinde per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt, profluvio alui atque dysenteria salutaris, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, ut oliuæ, condiuntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba.

CAP. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referentia prius, quam maturescant, dissecta & sole siccata manduntur, ut aluum sistant. Eadem est functio molitorio farinæ, si polentæ loco sumatur: quod & decoctum eorum in potu præstat.

Prunus.

CAP. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed stomachum malè habet, aluum molit. Syria: ca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt, aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargariatu ruam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantibus reprimunt. Præstant idem syluestrium prunorum baccæ, post maturitatem exiccata, cum sapa verò decocta, stomacho utiliores redduntur, aluum

ulūmque magis adstringunt. Gummi primo-
rum agglutinat, potum in vino calculos commi-
nit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium
sanat.

Arbutus. CAP. CXXXVIII.

ARbutus, siue vnedo, arbor est cotoneæ malo
nō dissimilis, tenui folio: * cuius fructus pru- * Prunus
ni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic magnitudi-
nem acylo cognomen est: maturus aut flauet, aut ne quidem
rubescit: in esu acerosus, stomacho aduersatur, ca- hic fructus
pitūq; dolorem mouet. nequaquā

Amygdalæ. CAP. CXXXIX. cedit: cate-

AMygdalæ amaræ radicum tritarum deco- rum effigie
Etum vitia cuius in facie corrigit: illitæ nu- adeò expres-
ces idem munus præstant, menses admotæ ciunt, se refert fra-
capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut tempo- ga, vt nil
ribus cum aceto vel rosaceo: epinyctidas sanant queat ex-
ex vino, item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, pressius.
& morsus canū cum melle: earum autem esu do-
lores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt,
urinam cient, contra sanguinis reiectiones cum
amylō assumuntur, renum vitis, & pulmonū in-
flammationibus ex aqua in potu aut eclegmate
cum resina terebinthina dantur: calculosis diffici-
liq; vrine in passo auxiliantur, & illinctu cum
melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus co-
li, nucis auellane magnitudine: quinis septenisve
presumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vul-
pes, si cum quadam esca eas vorauerint, emoriun-

tur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijciens
 bus sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quæ
 summum corpus occuparunt, illud cum aceto
 tollit: in si velusta cum diluto vino potum mede-
 tur: callositas cum passo bibere prodest. E nucibus
 græcis, dulces cibo idoneæ, sed multo minus valent
 in remedijs, quam amaræ: attamen extenuant, &
 urinam ciunt, recentium esu cum suo putamine, hu-
 mida stomachi vitia emendantur.

Pistacia.

CAP. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nu-
 cibus similia sunt, & stomacho amica: trita
 cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue e-
 dantur, siue bibantur.

Nux iuglans.

CAP. CXLI.

Nuxes iuglandes, quas nonnulli Persicas voc-
 cant, sunt difficiles concoctu, stomacho inus-
 tiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussienti-
 bus inimicæ, & vomitibus ieiunis in cibo aptæ.
 Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo
 cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni has-
 tu comedantur: largius esitæ tinea latas pel-
 lunt, illinuntur mammarum inflammationi, ab-
 scissibus, luxatisq; cum mellis exiguo, & ruta: cum
 cepa autem sale & melle, canis hominisq; morsus
 proficiunt: tormina, cum calyce suo perusta, &
 umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum
 tritumq; in oleo, & vino, infantium capite perun-
 to, nutrit capillum, alopecias replet. Si stuni men-
 ses

es nuclei vsti, si triti ex vino admoventur: idem
veteribus, illiti carbunculis, gangrenis, & agi-
opys medentur: alopecys commanducati, & im-
piti presenti sunt remedio. Nucibus ius oleum ex-
trahitur. Recentes stomacho innocentiores sunt,
utpote suduiores: itaque allio mista eximunt acro-
niam. Liures in corpore illitu tollunt.

Nuces anellanae.

CAP. CXLII.

Nuces anellanae, quas & leptocarya vocant,
stomacho infesta sunt: ipsae tamen tritae, &
in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tostae
& cum exiguo piperis potae destillationem conco-
quunt, crematarum cinis cum axungia aut adipe
vsti perunctus alopecys capillum reddit. Aium non
nulli vsta earum putamina, & incineris speciem
redacta, cum oleo, caestorum oculorum pupillas in-
fantibus denigrare, persuso sincipite.

Morus.

CAP. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum
solut, stomacho inutilis est, & facile cor-
ruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus:
decoctus autem aereo vase, atque insolatus, ad-
stringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas,
& tonsillarum inflammationes, addito mellis exi-
guo. Sed inolescit vis eius, adiecto scissili alumine,
galla, croco, & myrrha: item myricae semine, iri,
& thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq;
acinorum rhois vice obsonijs miscentur, ut coelia-
cos innuet. Radix cortex decoctus in aqua & po-

tus

ius aluum resoluit, latas ventris tineas excutit, his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustus igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & fici nigra frondibus simul coctis in aqua celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruesacti corticis & foliorum iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

SYCOMORUS. CAP. CXLIIII.

SYcomorum aliqui etiam sycaminum, id est, smorum, vocant, cuius fructus sycomorū etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, vt ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossus, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nasceitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: vbi proventus fecundo restibilibque iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio vtile est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructū ferat, eximitur, lapidis iclu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga viol

ioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere
 icryma excipitur, quæ siccata & in pastillos
 coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vul-
 era conglutinat, discutit collectiones coctioni re-
 ugnantes: bibitur etiam aut illinitur contra ser-
 pentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores,
 & perfrictiones. Celerrimè teredinem sentit. Gi-
 nitur & in Cypro arbor genere distans, quæ
 um sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori,
 cuctu pruni magnitudine, multò dulciore, supradis-
 tis cætera similis.

Fici.

CAP. CXLV.

Fici matura recentes stomachum lædunt, ale-
 um solvunt: sed facile contracta ab eis flu-
 cio sistitur: sudorem euocant, papulasq; sitim fee-
 lant, calorem restringunt. Siccis natura excal-
 faciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant,
 illo viles, rheumatismus ventris & stomachi con-
 traria: gutturi autem, arteriæ, renibus, vesicæ,
 & ijs, quos longa valetudo decolorauit, anhelato-
 ribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ: ferue-
 factæ cum hyssopo & potæ, thoracem purgant:
 usq; veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conue-
 niunt: alium molliunt tuscum nitro & cnico,
 dein manducata. Decoctum arteriæ & tonsila-
 rum inflammationibus gargarizatu prodest.
 Cum hordeacea farina cataplasmatibus miscetur,
 & in muliebres foras cum fenogrecis & ptisana.
 Ceterum cum ruta cocta torminibus infundun-
 tur.

tur. Coctæ illitæq; duritias discutiunt, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratis ferè tubiarum fluxionibus, & cacoëthicis ulceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito absynthio, & hordeacea farina, utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniciæ, pruriginæ, sonitusque si crudæ terantur, & sinapi liquoreque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici lacteus succus coarctulimodo lac contrahit, concretumque dissolvit, ut acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, solvit album, vulvam recludit cum detrita nuce græca potius, menstrua ciet cum luteo ovi appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatibus cum farina fenigræci & aceto utilis: lepras, lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, psoras, & cera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussus à scorpione, venenatorum ictibus & rabiosi canis moribus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum additus: verrucarum infirmicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu canine. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussim exprimuntur, & siccatibus in umbra reponitur.

itur. Et lac & succus impmuntur exulceratorijs
medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramis
ficulni, faciem afferunt decoctionem. Lac effi-
unt quod magis soluat, si inter coquendum ficul-
neo surculo spatula loco moueatur.

Grossi.

CAP. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ,
illitæ strumas nodosq; omnes emolliunt: cru-
æ formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq;
additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sa-
& aceto vlcera in capite manantia, epinycti-
as, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes,
& genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficos
olys cauliculisq; candidæ vitilignes perunguntur,
ficiunt ad canum morsus, & vlcera quæ ceria, id est
ueros, vocant. Grossi cum syluestri papaueris so-
is ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiunt,
contra muris aranei morsus, & scolopendræ vene-
ra, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex ci-
ere ficos tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, cre-
iatis ramorum cauliculis: quod subinde macerari
buse est & inueterascere: siquidem inter causti-
a intelligitur. Gangrænis prodest: namque ex-
urgat & consumit, quæ excrefcunt: eoq; sic uten-
um est: Spongia assidue hoc lixiuo imbuta su-
erponitur. Interdum dysentericus, & in fluxio-
es vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, ma-
nosq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-
lutinat, carne replet, & oras committit, nõ secus
atq;

atq; emplastra, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, enema vocant. Bibitur ad discutiendū sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, cōmulsæ, cum cyathis aquæ recentis colatæ: addito olei exiguo, cœliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: nervorū vitijs, convulsionibus commodè illimitur ex oleo, utpote quod sudores moveat: aduersus gypsi potum, & phalangiorū morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiua, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea. CAP. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem: in quo phalangia cranio colapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinā redacta, illitis sanguinis eruptiones sistūt. Arborem hanc prodiderūt aliqui in Perside exitiosam esse, trāslatāq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. CAP. CXLVIII.

Iberis, siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virētiora: caulem cubitalem, aut minorem: in incultis nascitur, æstate lacteū florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes: ipsæ enim ischiadicis cum salsa xungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

Liber II.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



N primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; disseruimus. In hoc autem secundo de animalibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acriter prædita sunt facultate, ut pote quæ cum ipsis cognitione iuncta sint: qualia allium, cæpa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disjunctis se videamur.

Echinus, siue erinaceus. CAP. I.

Marinus echinus stomacho ventrique utilis est: urinam cit, huius testa cruda inasata commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt: cremata verò cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat.

h

Terrestris erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissime illinitur, assecatum corpus & cum aceto mulso potum, rerum vitis auxilio est: item aqua, quae cutem subijt, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exsiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactione, ad eosdem usus utilissime reconditur.

Hippocampus. CAP. XII.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

Purpura, buccina, eorumque volutæ,

CAP. XIII.

Purpura usta exsiccat, dentes abstergit, ex crescentius in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant cremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis salus plena, fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustus utiliter illinuntur, quibus solui medicamentis non oportet: nam postea quam vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua deciderit. Fit etiam calx e buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocantur purpurarum buccinarumque media partes, circa quas testæ volumen clauiculae intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisque facultatem vrendi consequuntur.

111.

tur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles: sed aluum non molliunt.

Mituli.

CAP. IIIR.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

Recentes tellinæ aluo utiles, sed maximè ius carum: salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

* τὸ βλεφάρον
ρῶν.

Chamæ.

CAP. VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

CAP. VII.

Vnguis siue onyx conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura integitur quod in Indis & nardiferis lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquàm stagnantes aquæ æstiuis caloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans; pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspi-

citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquāte-
nus castoreum olent. Iidem suffitu excitant fœmi-
nas vuluæ strangulatu oppressas, comitialesq; poti-
us ventrem molliunt. Crematum conchylum eadem
efficit, quæ purpura & buccinum.

Cochlex. CAP. VIII.

Terrestris cochleæ stomacho vtilis sunt, &
non facile corrumpuntur. Optima Sardonia
cæ, Aphricana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac
Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, poma-
tia, id est operculares, cognominata. Marina stoma-
cho idonea, & facile aluo excernitur: fluuiati-
lis virus olet. Quæ verò repribus frutetisq; glu-
tinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon,
ventrem & stomachum turbat, vomitiones exci-
tat. Cremata omnium testæ excalfaciendi & vren-
di naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligi-
nes, dentesque: emendant oculorum cicatrices, &
vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudi-
nes, si cum carne sua vstæ tritæq; ex melle illinan-
tur. Cruda cum tegumentis imposita, aqua inter
cutem tumores exugunt: sed non antè solvantur,
quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflam-
mationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ
euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes ea-
rum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera a-
lia, tum maximè quæ nerui acceperunt, congluti-
nant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpen-
tem infrænāt: vinæ corpus, & præsertim Aphrica-

ne, cum aceto deuoratum, stomachi dolores miti-
gat, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum
inde bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanat. Terre-
stris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu
lentore eius, pilum attingat.

Cancrī. CAP. IX.

Cancrorum fluiatiliū exustorum cinis, quō
duo cochlearia expleat, adiecto dimidio ra-
dicis gentianæ modo, triduo potius cum vino, ma-
gnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas
pedum sedusq; , perniunculos, & carcinomata,
cum decocto melle lenit: triti crudi, potique ex asi-
nino lacte, auxiliantur contra serpentium phalan-
giorūque morsus, atque scorpionum ictus: deco-
cti autem & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe
conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt: ne-
cant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Pos-
sunt eadem marini, verū inefficacius omnia præ-
stant.

Terrestris scorpīo. CAP. X.

Terrestris scorpīo tritus & impositus, suæ
plagæ remedium est: quin estur assatus, ad
eandem.

Marinus scorpīo. CAP. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones
oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus. CAP. XII.

Draco marinus dissectus & apertus imposi-
tusq; ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

Scolopendra.

CAP. XIII.

Scolopendra in oleo docta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis.

CAP. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet: eadem apposita euersam sedem prociduanq; coërcet.

Viperæ.

CAP. XV.

Viperinae carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, nervorum vitis auxiliantur, increscentes strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaq; quoniam carne vacanti, amputari debent. quippe commentitium est quod præcipitur, certam virinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum verò corpus exëptis interaneis elotum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esitent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adyiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo rescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vina autem vipera in fœtile nouum demittitur, adyiciuntur salis caricarumq; tritarum, singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex, mox fœtilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris facië, reconditur. Plerumq; ut ori gravior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabailhri momentum.

Senecl

Senecta anguim. CAP. XVI.

Senectus anguim in vino decocta dolori aurium, infusus & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipue viperinam.

Lepus. CAP. XVII.

Lepus marinus liliigini parus similis est, qui per sese tritus, aut cum vitica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetudine contracti sunt: affrictu aut cibo facilius infantibus dentitionem praestat: exustum caput & cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vuluae & alui fluorem sistit, comitiales inuat, contra venena ex aceto bibitur, praesertim aduersus concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. CAP. XVIII.

Marine pastinacae radius, qui eius caudae Menatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

Sepia. CAP. XIX.

Sepiae coctae dum estur atramentum agrè concoquitur, aluum mollit, collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritia perfricantur:

ustum in sua testa donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes, fursum res, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absomit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis. CAP. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

Hippopotamus. CAP. XXI.

Hippopotami testes exsiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

Fiber. CAP. XXII.

Fiber ancipitis vitæ animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua victum capefit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sterutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent usus: siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundasque eijciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargicos, & utcunque veterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus nervorum vitis. In summa, calfactoriam vim habent. Eligi debent testes qui ex vno ortu conexi sunt (fieri enim non potest,

st, ut gemini folliculi in vna membrana coniun-
ti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore
raui & virus redolente, gustu acri, mordente, ac
irascibili, naturalibus tunicis circūdato. Quē si au-
tem aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gum-
mi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio
tribactum, & ita exiccantes. Vanum est quod tra-
hitur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, quū ve-
ratu vrgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, vti
in sue, substricti. Opera autem pretium est, diuina
à pelle melleum liquorem cum eueſtiente tunica
assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris. CAP. XXIII.

Mustela, quæ in domibus nostris oberrat,
ambusta exenteratur, & inueterata sale,
in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum vino
pota, aduersus omnia serpentium venena præsen-
taneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, re-
sistit. Eius ventriculus coriandro faretus inuete-
ratusq; percussus à serpente, & comitialibus potu
auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert,
cinere ex aceto illito. Sanguine peruncle struma
uiuatur: comitialibus etiam prodest.

Rana. CAP. XXIIII.

Contra omnium serpentium venena pro an-
tidoto sunt ranae, si ex sale & oleo decoctæ
edantur, iusq; earum itidem sorbeatur: contra in-
ueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum
cuius profluentis sanguinis impetus sistit: exple-

dis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illi-
nitur. Viridium ranarum cruor auulsos genus pi-
los renasci prohibet, in vestigia euulsorum instil-
latus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores
collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præ-
bet aluum: sale verò conditus, minimū suppe-
ditat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem
expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpo-
ri spicula extrahit. Muria eius incipientibus dys-
enterijs prodest, si in desidentium fots adijcia-
tur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit:
ischiadicus infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes
ulcerum oras puluillosq; reprimat: nomas co-
hibet, thymos clauosq; absunit. Caro non secus
atque salsamentum prodest à scorpione percussus,
aut à cane demorsus.

Manæ.

CAP. XXVII.

Manarū ex capitibus cimis si illinatur, cal-
losas sedis rimas abolet. Eius etiam garū
oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus,
si cōsuta rima in duodecim aquæ sextarijs,
donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub
diuo refrigeratus potui detur, aluus sine molestia
deie

cyctur. Illitus contra serpentium canumq; mor-
s auxilio est.

Thunus. CAP. XXIX.

Thunitanei thumi caro, quam omotarichon
vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera
omine prester momorderit: sed oportet vinum
quam plurimum subinde cogantur haurire, ita vt
omitione reddatur. Contra acrimonijs esitatorij
maxime valet, canum morsibus vtilissime illinitur.

Garum. CAP. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusque
sale maceratis liquamen est, si ex eo fotus
at, depascentia ulcera sistit: morsis à cane mede-
ur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: nō
nullis, vt exulcerata adurat: alijs autem, ad lace-
randa, quæ ulcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXI.

Recentium piscium ius, modò per se, modò ex
vino potum, alium subducit. Privatim ad
vunc vsum conficitur è phycidibus & scorpionibus,
& iulide: è percis, & recentibus alijs saxati-
bus, nec virus resipientibus, simpliciter cum
aqua, oleo & anetho.

Cimices lectularii. CAP. XXXII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, canis fa-
barum inclusi, si ante febrium significatio-
nes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: &
citra fabas sumpti, percussis ab aspidē prosunt:
vuluarum exanimationes olfactu reuocant: poti-
cum

cum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti & vrinariæ fistulæ impositi, vrinae angustias leuant.

Millepeda. CAP. XXXIII.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nientia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem: hæ ex vino potæ difficili vrinae, & regio morbo auxiliantur. Millepedus illini anginis cum melle utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, convenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. CAP. XXXIII.

Blattæ eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pulmones. CAP. XXXV.

Podagras pernionisque emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus. Suillus & agnus vrsinusque pulmo impositu attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui. CAP. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, à viperæ demorsis auxiliatur.

Vngula asini. CAP. XXXVII.

Ngularum, asini cinis per dies multos bibis

ms

cochlearibus potus proditur comitiales adiu-
tre, eadem oleo subacta strumas discutiunt: &
ita per nionibus medentur. Caprinarum cinere
eruncta ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII.

Ichenes sunt in equorum genibus, & *su= *κατ' επι-
per ungulas in flexu harum partium indu- γναφλῶ, nō
ui calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus επιγρα-
vederi traduntur. φλῶ.

Iocinera. CAP. XXXIX.

ASini iecur inassatum esu comitialibus pro-
dest, veruntamen ieiunis edendum præcipi-
tur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi
sciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos
alitu eius vaporari: prodest in cibo tostū ad ea-
tem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales
prehendi. Aprinum recens si arefactum tera-
tur, ex vino potum contra serpentū volucrumq;
morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagita-
tur, tostū & in cibo ab emorsis sumptum, ne tē-
entur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem
ad arcendos aquæ pauores dente eō, qui caninus
icitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, &
alliculo inditum, pro amuleto brachio adnectūt.
ueteratum autem sale mergi iecur, ex hydrome-
te binis ligulis potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

VEteris corij cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum
attri

atritus sanat.

Gallina.

CAP. XLII.

Dissecta gallina, & adhuc calentes apposta
ta, serpentium morsibus auxiliantur: sed
identidem alias sufficere oportet. Earum cere-
bellum in vino bibendum datur contra serpentium
morsus, sanguinem à cerebri membrana profluē-
tem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu re-
sidet membrana, secti in laminas cornus specie
similis (ea verò inter coquendum alijs ci solet) sicca-
tur, tritaque in vino cōuenientissimè stomachicis
datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluum deij-
cit. Abiectis itaque interancris salem conijci opor-
tet, & confuto ventre decoqui in viginti sextarijs
aque, donec ad tres heminas redigantur: totū id
refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt
olus marinum, mercurialem, cnicū, aut filiculam.
Crudos humores crassosq; atram bilem, & stri-
gmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, ar-
ticularijs morbis, & inflationibus stomachi.

Ouorum natura.

CAP. XLIII.

Ouum molleculum plus alri forbili, & durum
plus molli. Luteum oui, contra oculorum
dolores utile est: inassatum sedis inflammatio-
nibus prodest, cum croco, & rosaceo: & con-
dyomat, cum meliloto: cum vua autem fructus
eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigio-
tur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta

cutis

itis ocludit, inflammationes oculorum infusum
 nit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas
 non sentiant: faciem à Solis adustione tuetur, fron-
 tibus imposuim cum thure fluxiones arcet, auer-
 titque: inflammationes oculorum lama exceptum,
 luto rosaceo, melle & vino, mitigat: vtiliter cō-
 tra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbe-
 re: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, re-
 m exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reie-
 ctionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis
 pneumatisinis.

Cicadæ. CAP. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, vesicæ do-
 loribus prosunt.

Locustæ. CAP. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates ad-
 iuuant, præsertim quæ feminis malè habet:
 eorum carnes nullo sunt in vsu. Est & quoddam
 genus locustæ, quæ astracos aut onos dicitur, sine
 pedibus, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex
 vino bibatur, contra scorpionis morsus magnope-
 re proderit. Hæc ab insidè rescuntur Aphrii, qui Le-
 tin incolunt.

Osifragus. CAP. XLV.

Venter eius anis, quam Latini osifragum
 appellant, particulatim potus, calculos cum
 urina pellere prodest.

Galerita. CAP. XLVI.

Galerita ancilla est parua, apicem in ver-
 tice,

tice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuvat.

Hirundines. CAP. XLVII.

Dissectis crescente luna pulli hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedule, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrum in scythili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, angina eo commodè perunguntur: vna & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuat, qui angina morbo conflictantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vini adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

Suis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longisque torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. L.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus.

bus cum tragacantha: foeminis fluxione vulue la-
borantibus, cum liquore huic rei accommodato.
Cervi cornu contusum, crudo fictili, luto circumli-
to, & in furnum indito, vritur donec albescat: id
admiræ modo elotum, vlceribus oculorum, & de-
luxionibus salutare est: infriclum dentes expur-
gat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur:
feruefactum in aceto, si eo gingivæ colluantur,
maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca.

CAP. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo
peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides.

CAP. LII.

EFRUMEN:IS congectæ cantharides ad recon-
dendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non pica-
to conduntur, & raro linteo obligato ore, & deor-
sum conuerso suspenduntur super aceti feruentis
quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimen-
tur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ
omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuer-
sas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattari-
onodo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ
minus sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

SIMILI modo reconduntur buprestes, genera quæ
dam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ su-
pra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper
tostæ, reponuntur. Vis omnium communis ero-

dere, ulcerare, calorem elicere: qua de causa admi-
scuntur medicamentis, quæ lepras, ferasq; lichenias
& carcinomata sanant. Menses ciunt pectus emol-
lentibus additæ. Aliqui cantharidis antidotis
impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodide-
runt: argumento, quod urinam moveant. Alij pen-
nas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse
tradiderunt.

Salamandra.

CAP. LIIII.

Salamandra lacerta genus est, iners, varium,
quod frustra creditur est, ignibus non vri. Vini
habet erodentem, calfacentem, exulcerantem.
Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum
vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo re-
conditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exentera-
ta, detractus pedibus & capite in melle servatur
ad eundem usum.

Araneus.

CAP. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupi-
tus, prolatuq; utriusq; temporibus aut fronti, tere-
tiano circuitus persanat. Tela eius imposita san-
guinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occu-
parunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est
& alterum aranei genus, qui candidam, tenuem,
densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum,
& lacerto appensum, quartanis circuitibus mede-
ri narrant. Decretus ex rosaceo, & infusus, aurium
doloribus auxiliatur.

Las

Lacerta.

CAP. LVI.

Lacerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: varos, formicantes verrucas, & pensiles, quas acrochorodonas vocant, tollit. Iecur ex esis dentibus coniectis dolores finit. Si diuisa admoneatur, ictus à scorpione leuamentum præstat.

Seps.

CAP. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus.

CAP. LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quauis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt *idiorson's carnes, quæ renes amplectantur, id sibi viriū vendicasse, vt si drachmæ pondere bibantur, veneremur in accedant. Verum decocto lentis cum melle aut semine lactucæ cum aqua potio, veneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

Terreni vermes.

CAP. LIX.

Terreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutiunt: decocti cum anserino adipe, & infusi, affectus auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: tritum in potu ex passo urinam eiunt.

Mus araneus.

CAP. LX.

Mus araneus dissectus, & impositus, suis

morsus veneficia luit.

Mures.

CAP. LXI.

MVres, qui in domibus oberrāt, concisos scor-
pionum plagis utilissimè imponi, in confes-
so est, si massatos infantes ederint, oris salinā exic-
cari promittunt.

Lac.

CAP. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus
alit, aluum emollit, stomachum & intestina
inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstivo
habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit.
Probatum autem candidum, æquali crassitudine,
quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus
tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringenti-
bus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondi-
bus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde
stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum
autem dulce, crassum, & præpingue, non usque-
adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asinum,
& equinum, ventri magis idonea: sed ipsum tur-
bant. Quibus in locis pecora, scammoniam, verat-
rum, clematidē, aut mercurialem pascuntur, lac
omne ventrē & stomachum subvertit. quale in Iu-
stinis montibus esse, à nobis productū est. Siquidem
capræ, quibus candidum veratrum pabulo fuerit,
primo foliorum partu euomunt: & eorum lac hau-
stum nauseam creat, & stomachum in vomitiones
effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum,
precipueq; candentibus calculis marinis exustū:

& in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-
 rationibus, præsertim faucium, pulmonis, intera-
 reorum, vesicæ & renū: foris verò contra pruritiū
 cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corporis
 succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur
 exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcūque se-
 nel feruēfactum. Decoctum cum calculis marinis
 ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuuat.
 Lac quodcūque serum continet implicatum, quod
 ubi discescit a lacte, multò potentissimum ad pur-
 gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia
 volumus derectionem moliri, vt melancholicis, co-
 mitialibus, lepris, elephantys, & erūpentibus toto
 corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum,
 id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo fer-
 uet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis,
 postquam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti
 mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim
 ferescens liquidū ab eo diuiditur, quod in caseum
 concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, con-
 ueniet sponsia ex frigida continuo fictilis labrum
 detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua
 plenum demittere. Bibitur heminis per interualla
 singulis, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus
 spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens ef-
 ficax est contra rosiones vstionesq; ab exitialis
 medicamentis factas: vt à cantharidibus, aut
 salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyos-
 cyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præser-

tim bubulum ad id eximie confert. Gargarizatur,
autem exulceratis faucibus, tonsillisq; Asininum
peculiariter collutos dentes gingivasq; stabilis. Flus-
siones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosq; ouilium,
bubulum aut caprinum cum marinis lapillis deco-
ctum, sistit: per se autem & cum hordeacea ptisa-
na aut halicaceo cremore infusum magnopere in-
testinorum rosiones mitigat: exulcerata vulua im-
mittitur. Humanum lac dulcissimum est, & ma-
ximè alit: mammae autem exuctum, prodest tabi,
& stomachi rosionibus: contra haustum leporem
marinum praesidio est: oculis cruore ex ictu suffusis
cum iheris polline instillatur: podagricis utile est,
cum m. onio, & cerato illitum. Lac omne respuen-
dum plenitudo, hepaticis, comitialibus, vertiginosis,
& nervorum vitio laborantibus, febriculosis, &
capite dolentibus: nisi si quis interdum purgatio-
nis gratia, ut ostendimus, schistum prebeat. Pri-
miparae canis lacte perunctos narrat glabrescere:
potum contra venena antidoti vicem obtinet, abor-
tus mortuos expellit.

Caseus.

CAP. LXIII.

CAsens recens sine sale sumptus alit, stomas-
cho utilis est, & facile in membra delega-
tur: corpus auget, aluum modicè emollit: alius ta-
men alio praestantior, pro natura lactis, à quo con-
ficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde in-
assatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflamma-
tionibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens
salit

alitus est, minus alimēti præbet: corpus aptè mi-
 nit, stomacho aduersatur, negotium ventri inter-
 neisq; exhibet: vetustiore sistitur aluus. Sero,
 quod à caseo manauit, quàm optimè canes aluntur.
 Quod hippacē vocant, caseus est equinus: ea virus
 edolet, magnopere alit, bubulōque proportionē re-
 spondet. Nec desunt, qui hippacen, equinum coagu-
 lum appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXXIII.

E Lacte pinguisimo probatū si butyrū, quā-
 le ouillum est: fit & ex caprino, agitato in
 vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum na-
 tura oleosum est & emolliens: vnde largius epo-
 sum, ventrē resoluit: prodest, vbi oleum non adfue-
 rit, contra venena. Cum melle si infricetur, den-
 titiones adiuuat: gingivarum pruritus, & oris vl-
 cera infantibus emendat. Illitum foris capaciora
 alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis
 per summa scatentibus asserit. Contra inflamma-
 tiones & duritias vuluæ, quod nec virus resipit,
 nec vetustatem sentit, butyrū efficax est: dysenterī-
 cis, & coli exulcerationibus infunditur: in medi-
 camenta addi solet, quæ pus mouent: vtile præse-
 rim cū nerui, aut cerebri mēbrana, vesicæ ceruix,
 vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, car-
 nem creat, ab aspide percussis vtilissimè imponi-
 tur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat,
 & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligenda ex
 eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernā no-

nam ingestum accenditur, fictilique operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cinuculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

Succidæ lanæ molles, è collo feminibusq; laudatissimæ habentur. Subveniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, luidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidem facile succos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudum sordem [sic enim æspum vocant] emolliunt: capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus fimbriati martinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatis

tix

im interstratis, leuiter succendunt, & vřtas tollunt: quod si ẽ tẽda pix, pinguitudine vlla profusa, collecta recõditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & cõsidere patiuntur: idq; sepius, nutantes aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum CAP. LXVI.

Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinẽ. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, vti respuet, agitur, aut lignea rude validiusculẽ conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur, confidente pingui quod supernatabat, collectoque in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ oesypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur: tum in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigie

da aqua eluunt, & manibus, non secus atque ce-
 ratum mulieres, confricant: ita enim candidius
 redditur. Alij elotis lavis & sordibus quibuscunq;
 exemplis, ac lento igne in aneo vase ex aqua de-
 coctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut
 diximus, lauant: colatumque in fictilem patellam,
 quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt,
 atque Soli mandant, donec calidum fiat, & satis
 crassum. Alij b. diu spatio aquam effundunt, no-
 namq; adiciunt. Melius est læue, radícula non cu-
 ratum, quod succidat in virus oleat, & si manu in
 concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil
 in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato
 aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, ex-
 plet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ,
 cum meliloto & butyro in vellere appositum, men-
 ses & partus euocat, vlcera non aurium modò sa-
 nat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra
 erosos angulos oculorum, scabiososque, genas, quæ
 occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In
 testa noua torretur, donec redactum in cinerem
 pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colli-
 gitur, uti demonstrauimus: quæ in oculorum me-
 dicamenta commodè addi solet.

Coagulum. CAP. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, vene-
 ratorum morsibus, celiacis, dysentericis, &
 feminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reie-
 ctionibus à pectore, auxiliatur. Sanguinem in grus-
 mos

os concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuam coeliacis dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ luicornus, & dorci, apri, cerui, vuli, bubalique coagula similes naturas sortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto, conuenienter assuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires reseruant: comitialibus, strangulatis vuluis, potum conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata coagit, & coacta dissoluit.

Adeps.

CAP. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter

ter

ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: eliques-
cens inde humor in fictile alterum excolatur,
donec adeps omnis absumatur, mox loco vehe-
menter frigido reconditur, & ad usus digeritur.

Aly fictile fulcium super aquam calidam, aut te-
nuem & elanguidam prunam, quæ Solis vicē per-
set. Est & alia curandi ratio: Exemptus mem-
branis teritur, comectusque in ollam eliquatur,
adiecto minuti salis momento: mox lineo colo-
transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta
additur: quæ lassitudines & fatigationes leuant.
Suillus adeps & ursinus hoc curantur modo: Re-
cens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in
largiore aqua cælesti, & quam frigidissima, exē-
ptis tunicis, diligentissime manibus confricatur,
& exprimendo fermè siccatur, subindēque noua
aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duple
induitus, in aquam demergitur, & subditis leui-
bus prunis spatula mouetur: eliquatusque colo-
transfunditur in aquam: ubi verò refrigit, & gut-
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quò facilius feculentum vi-
rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-
etiam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in
imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliqua-
tur, repurgatusq; fictili benè operculato, perquam
frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum,
cervinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunq;

tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exemptus, pila emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquid innatet sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem conycito, & adiecta aqua, vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratũq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conyciendum, & marina aqua, quæ non minus do drante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrenicæ ceræ drachmis: excolatũque, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: operatũq; Soli interdum credendum, vt ad candorẽ reducatur, & odoris virus euinescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue prouolente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperferis, liquefacito: dein in nitentẽ aquam excolato, & ubi concrefcere cœpit, manibus iterum

rum confricando vehementer lauato, aqua sepius
infusa refusaq; donec quam optinè elotū videatur:
rursus in olla cum pari modo vini odorati deco-
quito, & cum iterum efferbuerit, depto ab igni va-
se, ibidem sinito pernoctare: postridie si grauer
adhuc oleat, noua olla repetitū, vino odorato per-
fundatur eadem quæ prius fiant, dum omne virus
euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim af-
fectionum earum causa, quibus sal aduersari so-
let, sed ita paratum non magnopere albescit. Eo-
dem modo pardorum ac leonum pingua curari
oportet. Taurinum autem & vitulinum pingue,
necnon ceruinum, atque etiam huius animalis
medulla, odoramenti imbuuntur, hac ratione: Ping-
ue, quod odoratum reddi debet, demptis, quæ di-
ximus modò, membranis, elotum & vino quàm
odoratissimo, nulla maris aqua diluto, sernefactū,
pernoctare sinitur: alterū id genus vinum eadem
mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè co-
latur: nouēque eius heminis, iunci Arabici se-
ptem drachmæ adyiciuntur. Quod si ipsum odo-
ris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris
eiusdem drachmæ, cum paribus palmas, calami,
& casie modis adduntur: & xylobalsami, aspa-
lathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamo-
mi, & nardi, singulæ uncie: omnia exactius tun-
duntur, & affuso vino odorato, in vase operto,
quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter
efferuescunt, & semoto ab igne vase inibi perno-
ctant:

Elant: post tridie vinum effunditur, aliudq; generis
 eiusdem adijcitur. Ter simili modo bene conferue-
 scat. Deinde matutinus exempto adipe vinum ef-
 fundatur, & abluto vase, si quid imo subsidens ha-
 sit, detergatur. Postremò eliquatum pingue & ex-
 colatum, ad vsus reconditur. Hoc autē modo odo-
 ramentis imbuitur, quod antea curatum est. Ver-
 rüm antè dicta prius inspissari solent, quò facilius
 sibi odoramentorum vires adsciscant. Itaque assu-
 mens quodcunq; horū voles, cum vino feruefacito,
 impositus vnā myrti ramulis, serpyllo, cypéro, item
 asspalatho plenius tuso. Aliqui tamē ad hūc vsū,
 vno duntaxat horum contenti sunt. Cum autem
 ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatū,
 aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus
 spissamenta sic fiunt (quemcunque acceperis, opor-
 tet ut recens tundatur.) Syneerus & sanguinis
 expers adeps, reliquas habens notas, quas sepe
 retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso vino
 albo, vetere, odorato, quod semipedis altitudinem
 superet: lento igni feruescat, dum vernaculus
 odor aboleatur, planēque vinum redoleat. At
 ubi deposito vase refriguit, dua adipis minæ in ol-
 lam mittuntur, & duo vini eiusdē sextarij, & se-
 minus loti, eius, inquā, cuius è ligno ludicra tibi
 faciuntur, tusi minæ quatuor adijciuntur: lento
 igni subinde miscendo decoquuntur, cumque odo-
 ris virus euauerit, excolatisque adeps refrigex-
 rit, vna conlusi asspalathi mina, cum amaraci-
 nō

ni floris minis quatuor, & vetere vino subigitur.
 Nocte una hac odorem rapiunt, combibuntve.
 Postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, una feruescunt, quousq; & vim & odorem spiritus samentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquescentis colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisimae myrrhae vino maceratae, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus asserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusvis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: erysiceptri, xylobalsami, palmae elatae, & calami planè contusi, singulorum sescuncia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus unus adijcitur: ea ter effervescunt prunis, mox vase sublato ab igne, die noctuque refrigerantur: postridie liquata per linteam crassum, mundum in vas excolantur. Vbi verò adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfrigidus locus reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: aestate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicae cerae momentum adijciant, quod facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus, ceteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo: Curati quam optime adipis, praesertim taurini, mina una, tempestiviq; sampsuchi exquisitè confracti, sesquimina miscen

foentur, & inperso largiore vino digeruntur in offas, quæ in vase cooperto nocte quiescunt: matutina in sicula olla leuiusculo igni, affusa aqua, leuiter coquantur: dūmq; suum adeps odorem exuerit, defecatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die deterfa sorde, quæ pessum ierat, sampsiuchi, vt dictū est, contusi iterum sesquimina prioris pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs quæ diximus peractis, decoquitur & collatur: & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipē anserinum, gallinacē, aut vitulinum, à putredine tueri velit, ita faciendum est. Quemuis adipē diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrū, per lintea munda manibus vehementer exprimat, linoq; consutum umbroso in loco suspendat, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguis autem indito melle vindicatur à putredinis vitio. Vis omnium est excalescere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantulum adstringunt: earundem virium cōpos leoninus: nam resistere eū aiunt ijs, qui insidias moluntur. Cernio, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus: qua ex causa decoctus cum polenta, rhoē, & caseo, dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ins decocti phthisicis in sorbitionibus prodest. Datur quoque vtiliter ijs qui cātharidū venena hauserūt hircinus, vt

qui validissimè discutiatur: podagricis auxiliatur, cum fino capra & croco impositus: huic proportionē respondet ouillus. Suillus verò contra vuluæ & sedis vitia idoneus est: ambustus igni medetur. E sue vetustissimus quisq; si le cōditus excalfacit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asinum tradunt cicatrice corporis concolores reddere. Anserinus gallinæque cōueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonix andam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos vitio alopecie capillos restituere, perniombus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Vipera adps contra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis emulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

Medulla.

CAP. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus: qui parte cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, nisi quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullæ molliunt, calfa

calfaciunt, rarefaciunt: vlcera expleant, ceruina
perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes,
adipis modo, aqua respersu subacta, selectisq; ossi-
bus tantisper elota, & in linteum expressa, do-
nec aqua sincera emanet: & deterfa sorde penna,
si qua innatet, liquata in duplicato vase in pilam
exprimuntur: & ubi coiere, omni fece, quæ ad ima
fidit, derasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet
incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum
& gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel.

CAP. LXX.

Fel omne curatur hoc modo: Recens prælia-
gato ore folliculilino tandiu demissum in fer-
uentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum
percurset, mox exemplum siccatur umbroso lo-
co, asperginem non redolente. Sed quod ad oculos
rum medicamenta adijci solet, ligatum lino in
vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: cir-
cumuoluto ad os vasis lini principio, & aperto va-
se reconditur. Est enim vis omnium acris & ex-
calfaciens: intensis tamen & remissis viribus diffe-
runt: siquidem præstantius in effectu esse vide-
tur fel marini scorpionis, & piscis qui callionys-
mus appellatur, marinæ testudinis, hianæq; item
perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris
capræ: quod priuatim prodest contra suffusiones
incipientes, & oculorum caligines, argemas, &
genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque vr-
sino, taurinum multò efficacius. Felle omni perfas-

k 2

cilem, præsertim infantibus, deiectione quis molietur, si intinctum eo tomentum aut simbriam sedi subiciat: Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuenit vulnerarijs emplastris & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur. Phagedænicis ulceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat. Ouillum & ursinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstât. Ursinum eclegmate comitiales adiuvat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimat. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

CAP. LXXI.

Sanguis anseris, anatis & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palumbi autem, turturis & columbae, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque allinuntur. Peculiariter columbae sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capre, cerui & leporis sanguis in assatus sanctaginis

ne, dysenterias & celiacorum profluvia sistit: in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginesque emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua supergrediatur: leuat podagræ dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum.

CAP. LXXII.

ARmentariæ bouis fimum, si recens admodum ueatur, vulnorum inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo bone redditum est, procidentes vuluæ reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

k 4

Fimum caprarum, præsertim in montibus de-
 gentium, potum in vino, regium morbum emena-
 dat: menses cit cum odoramentis haustum, &
 partus euocat: tritum in farinam, & impositum
 laniis cum thure, feminarum profluvia sistit, cæ-
 terosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet: me-
 detur alopecys exustum, & cum aceto aut oxy-
 melite illitum: cum axungia verò impositum, his,
 qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum
 in aceto decoctum imponitur serpentium morsi-
 bus, vlceribus quæ serpunt, igni sacro, & paro-
 ridibus. Vitilem ischiadici vstionem hunc in mos-
 dum accipiunt: In eo interstitio vbi pollex bra-
 chiali committitur, caua veluti lacuna subsidet,
 in qua lana oleo imbuta substermitur, deinde sigillo
 latim feruentes stercoris caprini pilulæ impun-
 tur, dum vapor per brachium ad coxam sentiatur
 peruenire, & coxend cis dolorem mitigare: adus-
 tio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex
 aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles
 verrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cera-
 to exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in a-
 qua aut vino potum, reiectiones sanguinis sistit:
 vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta & con-
 mulsæ ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo
 medetur. Tam asinorum quàm equorum fimum
 siue crudum siue crematum, addito aceto, sangui-
 nis eruptiones cohibet. Armentary, qui herba
 pascitur, siccum fimum liquatum in vino, mox
 potum,

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum vehementius & excoalfacit & urit, cum hordeacea farina mustum strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra venena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ finum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini finis nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, ad opeccis medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum vino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur sed ea statim glutinat, sicco ex melle anginae perungi commodissimè iraduntur. Terrestre crocodili finum, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minimè pôderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fermenti acorem quadâm tenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile vendunt. Alij amylium aut cimoliam miscent, & adscito ancluse colore per rarum cribrum paulatim

tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui sic atque pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina. CAP. LXXIII.

Humanam urinam suam cuique bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemque aquam inter cutem proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina ad persundendos canis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manantia, fursures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit: nomus, & præcipue genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctaque in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginisque, ex ea & cupro idneum auriferrumen conficiunt. Quod in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: ferues factum cum cyprino, inditumque, vuluæ dolores mulcet: strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit.

extrahit, aurium doloribus instillata medetur.

Afinina traditur renum vitis mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coirere in calculi darditiam, vulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse coniuncitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quòd pennas ad se allicit. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininae urinae potus renum vitia sanari traduntur.

Mel. CAP. LXXIIII.

Pincipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hyleum. Magis probatur dulcius & acre, odora- Mellis pro-
tius, sublauium, nec humectum, graue, & mini- batio qua-
mè fluxum, quid ob sequacem lentitiam non fuci- lus.
lè abrupitur, tractumque resilit in digitos.

Mel abstergerendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinisq; commodissimè infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & fœda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum cali-

k s

ginem discutit, faucibus, tonsillis, angina collu-
tum gargari. Latumve medetur: urinam ciet, aus-
xilatur tussi, & à serpente percussus: contra hae-
stum meconium, cum rosaceo calidum assumitur:
aduersus venena fungorum, & rabiosi canis mor-
sus linctum aut potum proficit: crudum tamen
aluum inflat, tussim lacepsit, & ea de re despuma-
ti vsus aptior est. Prunatum tenet in mellis gene-
re vernum, deinde aestiuum: hybernum vero, ut
pote quod crassius constet, deterrimum reputatur.

Mel Sardinicum. ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gi-
dum amaguitur mel, amarum est: quomā apes inibi absyn-
thio vescantur quo vitia cutis in facie & maculae

apertissime perunguntur. Heracliae in Ponto qui-
busdam anni temporibus, propria quorundam flo-
rum dote, mel conflatur: quod qui edere, mente
abalienantur, ac sudore diffiunt. Remedio sunt,
esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsum,
resumpta, quoties vomitione reijciuntur. acre au-
tem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod
cum costo illitum, foeminarum cutem emendat,
& cum sale sugillationes rapit. Est & aliud con-

Saccharum. creti mellis genus, quod saccharon nominatur.
In India vero, & felici Arabia in arundinibus
inuenitur: salis modo coactum est, dentibus, ut sal,
fragile, alio idoneum, & stomacho utile, si aqua
dilutum bibatur: vexat & vesicae renibusque auxi-
liatur, illitum ea discutit, quae tenebras oculorum
pupillis offundunt.

Cera,

Cera. CAP. LXXV.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadāntenus melleū referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album sincerūque, atque transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petiæ, insperfoque nitri momēto, decoquunt: cumq; iterum tertiore inferbuit, separatū vas refrigerant, ac cere pastillum eximunt, deersa sorde, si qua forte adhesit: tū denuò indita noua maris aqua fernet, uti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu inungunt, quò celerius concreseat, & quā minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis inum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immittō debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino confuti, internaciæ spatio, suspendūtur, & interdū, contūnuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, vsq; dum perfectè albescant. Verūm si eximius ille candor desideretur, eadem faciliari, & identidem recondi operæ pretiū est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quā acerrima semel aut iterū excoquāt: dein laguncula tenui, rotūda, ansam habente, extrahunt postea orbiculos, substrato affatim cespite herboso, insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

Cura

cum sol remissa vehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modo dicitur explet corpora: datur in sorbitione dysentericus, ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. CAP. LXXVI.

Propolis eligi debet flava, odorata, styracem referens, in vehemente ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixa corpori extrahit, in vetere tussi sufflata proficit, impetigines admodum tollit: ea in alueariorum foribus, cerose naturæ inuenitur.

Triticum. CAP. LXXVII.

Optima est tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tinea: gignunt, canum moribus prosunt, mansa & imposita: confectus eorum similagine panis, plus alit, quam cibarius, est trimestrium farina panis leuiorē cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Item contra interaneorum inflationes, lentigines ex acetomulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur, & torminosis prosunt.

sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedū, clauosq; extenuat, & cætera tubercula furunculōsq; ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino cōmodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum delin-
gatur, cruentis excreationibus proderit: contra
tussim, & exasperatas arterias, cum mentha &
butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex a-
qua malsa, aut hydreleo decoquatur, omnem di-
scutit inflammationem. Panis & crudus, & co-
ctus cū aqua malsa inflammationes omnes illitus
mulcet, cū emolliat, & quadātenus refrigeret:
sed herbis succisve huic rei accommodatis admi-
sceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientis-
bus, citam aluum cohibet. Recens muria macera-
tus, illitus vetustas impetigines sanat. Glutinum
ex similagine, & polline, quo chartæ glutinatur,
sanguinem excreantibus prodest, si liquidus ac ta-
pidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purumq;:
id minus quā triticū alit. Ptisana tamen
ob cremorem in decoctione redditū, plus alimentū
præbet, quā polenta ex hordeo facta. Contra
acrimonias atque gutturus scabritias, exulcera-
tionesq; pollet: quibus etiam triticea ptisana præ-
sidio est: sed plus alit, magisq; vrinam mouet. Lac
abundè suppetitat, si cum fœniculi semine deco-
cta

Et a forbeatur. Hordeum absterget, urinam cit,
inflationem parit, stomacho aduersatur, tumore
concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsā
aqua cum fico, ut inflammationes collectionesque
discutiat: duritias cum resina, & fimo columba-
rum concoquit: cum melioto autem, & papaueris
calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduer-
sus intestinorum inflationes cum lini semine, foe-
nogræco, & ruta, illini iuuat: strumas cum pice li-
quida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad con-
coctionē perducit: & cum myrto, aut vino, aut
malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, aliu-
proflumia sistit: podagricis inflammationibus, cum
cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto,
modo quo hordeaceum cataplasma, & calida im-
posita, leprus medetur. Cremor verò farinæ ex a-
qua, atq; cum pice, & oleo decoctus, puri mouen-
do est: cum aceto subactus iidem, & cum pice
contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex
his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. CAP. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est.
Is urinam cit, renes & nervos tentat, mem-
branis, præsertim cerebrum vesientibus, officit.
inflationem parit, vitiosum succum creat, elephan-
tiasin gignit: perfusum Zytho ebur, obsequiosum
& operi tractabile redditur.

Curmi. CAP. LXXX.

Fit & ex hordeo potus, quē curmi nominant
eoq;

quoque saepe potus pro vino vtuntur: verum dolorē
capitis monet, malum succum gignit, neruis nocet.
Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri so-
lent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Bri-
tannia.

Zea seu semen. CAP. LXXXI.

ZEa duorum generum est: vna simplex, alie= Vulgò spelta
ra in geminis putaminibus grana bina iun= ta.
ta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quàm
hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, mi-
nus quàm triticum alens.

Crassior farina. CAP. LXXXII.

Crimmon crassior est ex Zea triticoque fari-
na, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, fa-
cile conficitur, aluum vehementius adstringit, si
Zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. CAP. LXXXIII.

EIdem generi siligo adscribitur, sed minus ali-
quandò nutrit: in panes, vt Zea cogitur. Fit
quoque è siligine crassior farina, quam Græci cri-
mmon vocitant.

Athera. CAP. LXXXIIII.

AThera ex Zea fit tenuissimè moluta: est au-
tem sorbitio, quasi liquida pulicula, infan-
tibus conueniens, & cataplasmatibus effica-
x.

Tragos. CAP. LXXXV.

TRagos quandam halicæ frugis figuram ge-
rit: multò minus, quàm Zea nutrit, quod
multam aceris habeat: quare ægrius conficitur,
aluumq

aluumq; magis emollit.

Auena. CAP. LXXXVI.

AVena, genicula quaedam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeū. Pulte huius aluum sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. CAP. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum supprimit.

Halica. CAP. LXXXVIII.

Halica fit ex Zea, quam dicoccon appellamus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longè vtilior. decocta in aceto illitaque lepras tollit, vnguium scabritia extricat, incipientibus egilopijs medetur. Decocti dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. CAP. LXXXIX.

Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, vrinancit. Torretur milium, seruensq; in sacco ponitur vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur auxilio sit.

Panicum. CAP. XC.

Panicum, frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemque modo in pane subi-

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama. CAP. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus grauitatem facit, quoties inter mandendū commissuris dentium inhaesit: nervorum crassitiem illius discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasæ morsibus: capitis dolores, qui estuatione concitantur, ex rosea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorum doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium. CAP. XCII.

Lolium, quod inter segetes nascitur, molitum illitu nomas, putrescentia ulcera, gangraenasque emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenes, & ex aceto, & sulphure viuo, lepras: strumas quoque discutit, cum fimo colubino, & lini semine decoctū in vino rumpit, quae acrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua malsa, vtilissime ischiadici illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

Amylum. CAP. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum

emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vni excludatur, ubi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi furfures in cerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisque siccatur tegulis novis confestim torreatur fragrantissimo in sole: namque si paulisper vltimum maneat, a corem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauæque vlceræ efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atque obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farine modo manibus subigitur: pressaq; feruentissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi discutiendiq; in aqua malsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius foeminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlceræ purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pesti vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlceræ sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus

ten

tenesmos, foetidamque dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & genitalium cicatrices absterget.

Linum. CAP. XCV.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdem, quas fœnumgracũ, vires habet. Discutit, & emollit omnem intus forisque inflammationẽ, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie varosque crudis tollit, illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiãque discutit: vlcera, quæ serpunt, fanosque, cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituatur: tussim lenit, venerem stimulat: si farina piperis, & melle exceptũ, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vulnũq; erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vulnũ inflammationes in defensionibus perquam vtile.

Cicer. CAP. XCVI.

Cicer satium aluo idoneum est, vrinam ciety, inflationem parit, colorem comendat, membra ac partus expellit, lac auget, cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas inforumicationes, ad scabiẽ, vlcera capitis manantia, impetiginẽsque: contra carcinomata, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, cum melle & hoc Cicer arietino deo prodest. Alterum genus arietinum nominatum.

tur: utrunque cit urinas, dato cum rore marino, hydropicus aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Ladunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantiū pensiliūq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo deligata abici post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satiuam præstat.

Faba. CAP. XCVII.

Faba inflationem excitat, egrè concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnē gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maiorēq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices concolores facit, turgescentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: lac restinguit, furunculōs, sugillata, parotidasque cum fenigraci farina & melle discutit: cum rosa aniem, ihere & oui candido, procidentes oculos, tumores, vnaq; reprimi: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in
vi

vino testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imò ventri illinitur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimentum capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Ponticam vocant, in Aegypto * plerumque provenit: in * $\pi\lambda\alpha\gamma\sigma$ Asiae etiam Ciliciæq; lacubus, inuenitur. Folia id est, pluri habet ampla * etiam si ad arborum frondes commarentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine: * Sic Plin. florem roseum, dupla papaueris amplitudine: & ubi lib. 21. cap. flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes. Græculæ, in quibus faba supra operculum, bullantis amplexus pullæ modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideo $\pi\acute{\epsilon}\tau\alpha\sigma\omicron\nu$, nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, id est instar humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissagaleri. Radice firmatur harundine crassiore, quæ crudacotàve estur: ei colocasia nomen est. Faba viuens manditur, & exiccata nigrescit, vulgare magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem: dysentericis, celiacisq; prodest, insparso, polenta vice, lomento: datur

quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio vix ride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

CAP. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, agrè coquitur, stomachum malè habet, eumque & intestina inflat: sed alium cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddēs. Vim habet adstringendi: quæ ex causa alium cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primæque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resolvit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmone inutiles: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhois, quæ obsoniis insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, aliàs alium conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in aceto

aceto duritias & strumas discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorū, sedisque, addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernio nibusque, ut antea dictū est: cōtra mammas, in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Phasioli.

CAP. C.

Phasioli instant, spiritus cient, agrè coquantur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum.

CAP. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, an= Officinis guſto folio, tenuis, semina in valvulis habens, orobus, græ è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi ca appellatus conueniens. Eruū capiti onerosum est, aluum tione vocatus turbat, sanguinem per urinam extrahit, elixatur. boues saginamur. Paranda farinæ ratio hæc est: Vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua respergunt, donec sufficienter combibant: postea torrentur, usque dum lians cortex distrupatur, molitaque, farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. urinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totumq; corpus emendat: nomas, gangrenas, duritiasq; serpere non patitur: marum duritias emollit, atra vlcera, quæ theriomata vocant, fauosq; emarginat, carbunculos rumpit: cum vino subacta illitu morsibus viperarum, canum, hominumq; medetur: vrinae difficultates tenesmosq; ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumq; conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini.

CAP. CII.

Satius lupinus notus est: cuius farina cum melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem vlcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimum. Men ses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cælesti aqua,
don

donec in cremorem lentescant, faciem abster-
gunt: medentur pecorum scabiei, cum radice ni-
gri chamæleontis, ita ut tepente decocto abluan-
tur. Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini
irriti, ubi maceratu dulcescere coeperint, cum ace-
to poti, fastidium detrahunt, & cibi aviditatem
faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini, satius
similes, sed omnino minores, qui eadem, quæ sativi
possunt.

Rapum.

CAP. CIII.

DEcocta rapi radix alit, inflationem parit,
humentem ac fluxam carnem creat, venerē
stimulat: decocto podagra, pernionisque fouetur,
contritūq; rapo atque imposito iuuantur: si exca-
uata radici rosaceum ceratum adigatur, & fer-
uenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus
proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & uri-
nam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præser-
tim quæ sensum doloris auferunt, anodina vocāt,
idoneum est: potum contra venena salutare est,
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-
nus alimenti sufficit: sed multo magis appetitiam
recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur, *fru- * Vox ex
ticosum in cubili altitudinem assurgēs, ramosum, Plinio ada-
læne: in cacumine folia fert læua, digitali latitu-
dine, aut maiora: & fructum in siliquis calycula-
tis: cumq; eorum involucra aperiuntur, alia intus
siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem
præbet, in qua semina paruula concipiuntur, fo-

rus nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus.

CAP. CIIII.

Cocta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidoti admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

CAP. CV.

Radix (quæ Græcis raphanus dicitur) exco-
calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciēt, urinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionem adiuvet: quum autem præsumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissimè datur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicus commodissimè illinitur, lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & vomas amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea farina emendat, his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutarius est. Semen vomitiones facit, urinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrænas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso anginis perquam utiliter gargariZatur, contra ceruistis morsus, potum ex vino, auxi-

lia

lio est. Syluestris raphani, quam Romani armo-
raciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lam-
psanam imitantur: radix gracilis, * tenera, sub * μαλακή,
acris. Tam solum quam radix in olera recipitur: id est, mol-
sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstiosa est. *lis.*

Sifer.

CAP. CVI.

Sifer vulgo cognitum, cuius radix decocta ori-
grata est, & stomacho utilis: vrinam ciet, &
appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant, Officinis la-
quod in acutum tendit, dura habens extre-
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi
disimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plan-
tagini proximum, humile & molle. Quartum est
quod alij * oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon * Acetosa.
vocant. Folia eius syluestri ac exiguo rumici si-
milia, caule non magno, semine subacuto, ruben-
te, acris, in caule & agnatis appendicibus, emican-
te. Omnium decocto olere aluus emollitur. Crudi
illitu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, di-
scutiuntur. Syluestris & oxylapathi, & eius, quam
oxalida nominant, semen ex aqua aut vino uti-
liter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum
affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-
tiatur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-
pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:
sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-
dus

dus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat,
 si foveatur, aut in solijs balnearum confricetur.
 Cocta in vino & instillata, aurium dentiumque
 dolorem mulcent, strumas parotidasque di-
 scutiunt, lienem cum aceto extenuant. Aliqui
 amoliendus strumis radicem gestamine vtuntur,
 eas collo appendentes. Trita & admotæ femina-
 rum profluvia sistunt: cum vino autem potæ re-
 gio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt,
 menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur.
 Hippolapathon olus est magnum, in paludibus na-
 scens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis
 genera.

Lampfana.

CAP. CVIII.

Lampfana sylvestre olus est: plus alit quàm
 Rumex, & stomacho vtilius. Cuius folia cau-
 lesq; coquuntur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

Blitum estur oleris modo, alio vtile est, nul-
 lius in medicina vsus.

Malua.

CAP. CX.

Malua sativa, esui longè aptior sylvestri:
 stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed mul-
 tò magis caules: interaneis & vesicæ vtilis. Cru-
 da folia cum salis exiguo manducata, agrylo pas ex
 melle sanant: verum cum cicatricem trahere cœ-
 perint, ea demum citra salem vtendum est. Con-
 tra aculeatos apium vesparumq; ictus illita effi-
 cax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti, non
 fer

feriuntur. Vlcera manantia in capite, furfuresq;
cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis de-
cocta folia, tritaq; , utilissimè ex oleo imponuntur.
Eius decoctum vuluas in seissione mollit: prodest
erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, se-
disq; , clystere infusum. Ius decoctæ cum radice
sua, contra omnia venena auxiliatur, si cōtinuò à
bibētibus reuomat. Contra phalangiorū morsus
remedio est, lac euocat. Semen in vino potū addito
loti syluestris semine, vesicæ cruciatu lenit.

Atriplex. CAP. CXI.

A Triplicem aliqui chrysolachanon vocant,
cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre
& satium. Coctum estur, vt olus. Aluum mollit,
panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur.
Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum
sanat.

Brassica. CAP. CXII.

B Brassica satina alio est idonea, si modò leui-
ter feruesfacta edatur (nam percocta aluum
sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixi-
uo coquitur) stomachum autè malè habet: acrior
est æstima. In Aegypto propter amaritudinem non
estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest:
summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini no-
xam restinguit. Melior stomacho cyma, sed a-
crior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condi-
ta stomacho inimica est, aluum conturbat. Cru-
dus succus cum nitro & iri deuoratus alui emol-
lit

lit: cum vino quoque epotus viperarum morfibus auxiliatur: cum fœnigræci farina podagris & articulorum vitis illinjtur: prodest & sordidis ulceribus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyetidas, ignem sacrum, leprasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrenasq; valent, lienosisq; ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctum eius potu, alui & menses ciet. Flos post conceptionem in pessa subditus, partum abortiu viuat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota theriaca additur. faciei cutem lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica syluestris. CAP. CXIII.

Syluestris brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiôrque, amara: cuius cyma in lixiuia cocta, ori non insuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresque discutunt.

ANNOTATIO.

Contendunt doctissimi quique eam esse
her

herbam, quam vulgò Soldanam, aut Soldanellam vocitant: quæ certè aristolochiam rotundam, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, foliis adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro $\mu\alpha\lambda\eta\alpha$, vt Græci codices habent, legendum $\mu\iota\kappa\rho\alpha$, id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ foliis similia? quæ cùm ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinatæ ferè esse rotunditatis, sepe comperimus. Suum tamen cuiq; in hac re esto iudicium.

Brassica marina. CAP. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotunda aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, salso gustu, & aliquantulum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta. CAP. CXV.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cū lēticula, vt ventrē sistat: quod in-

* Antiqui gis radice eius præstatur. * Candida aluo utilis
hoc genus est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem
betæ, ut au quem habet in se, noxi succi est. Unde succus ea-
thor est rum, cum melle naribus inditus, caput purgat, at
Theophrasium doloribus auxiliatur. Decoctum radice &
stas, Siculi foliorum, furfures lentesq; deterget, perimones fo-
rocarum in mitigat. Crudus folijs vitiliginis, nitro antea
quorū exē perfrictas, alpectarum manitates, scalpello priu-
plo extrita exasperatis, atque depascentia ulcera, illini pro-
vratantum deest. Eruptionibus popularum, igni sacro,ambu-
litera Siela stusq; cocta medetur.

hodie dicitur

Portulaca.

CAP. CXVI.

mur.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus,
inflammationibus oculorū, cæterisq; cum pa-
lenta imponitur ardoribus stomachi, sacro igne,
vesicæ doloribus, auxilio est: commanucata den-
tium stupores sedat: stomachi & intestinorum
estuationem, fluxionesq; mulcet: renes & vesicam
adiuvat, etiam si erosionem sentiam: veneris impe-
tus exoluit: succus epotus simili effectu prodest
in febribus valens. Contra toretes ventris tinea,
cruentam excreationem, dysenteriam, hæmor-
rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta effica-
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medi-
camentis utilissimè commiscetur, interancis flu-
xione laborantibus, atque vulvarum erosionibus,
insunditur: contra dolores, quos æstus excitavit,
caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones pa-
pularum in capite, cum vino emendat: vulneribus

qua

quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

Asparagi. CAP. CXVII.

Corruda, siue syluestris asparagus, vulgaris Officinis
est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti sparagus.
ventrem emolliunt, vrinam cient. Radicis deco-
ctum contra vrinæ difficultatem, regium mor-
bum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in
potu proficit: cum vino autem, phalangiorum mor-
sibus auxiliatur. Si decocti succus super dente con-
tineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad
eamdem valet. Canes, vt aiunt, si decoctum bibant,
emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodide-
runt, arietis cornibus contusis, atq; defossis: quod,
quantum equidem sentio, planè à veritate abhor-
ret. * Altilis autem asparagus multis ramis fru- * In græco
ticat, folijs fœniculi, longis, numerosis: radice ro- codice hæc
tunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri ad sylue-
cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. stre quoq;
Assus autem coctusve, vrinæ stillicidium, difficul asparagum
tatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino referuntur,
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta nec fit alti-
cum ficiis aut ciceribus sumpta, regium morbum sa lis mentio.
nat: coxendici cruciatus stranguriamq; leuat. Alli Marcello au-
gata radix, aut haustum eius decoctum, cōceptum tem viden-
adimit, & sterilitatem adfert. tur adulte-

Plantago.

CAP. CXVIII. rina.

Dvo plantaginis genera: minor folia habet
angustiora, minora, molliora, lauiora, &
eniora: cauliculo anguloso in terram inclinato:

floribus pallidis: semine summis caulibus emicante

Altera maior, latior, virentiorq; , latus constan

* Oleris no folijs, * oleracei generis: cuius caulis cubiti altitu
mine per dinem petit, angulosus, subruber, à medio ad ver
antonoma= ticem tenui femine circumdatus: radicibus nititu
fiam Bras= teneris, hirsutus, candidis, digitum crassitudine a
ficā intelli= quamibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & loc
ge. Nec e= humidis. Multo utilior magna est. Vim habent fo
nim simpli= lia exiccatoriam, constringentem: quare omni
citer ad malignis vlceribus, & fluxioni opportunus atq;
quelibet elephanticus, sordidusq; illita profunt: profluui
olera, quo= sanguinis, vlcera quæ serpunt, epimycidas, car
rum diuer. bunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera & in
sa admodū equalia, cicatrice obducunt, chironia sanant, sinu
facies, folia conglutinant: morsibus canis, ambustis igni, infla
plantaginis matronibus, panis, parotidibus, strumis, egypci
referri pos= illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sa
sunt.

olus, dysentericis, celiacisq; sumptum subueni

Datur & in locum betæ cum lenticula coctum

Et ad aquam inter cutem, cui leucophlegmati

nomen est, datur & herba decocta post aridas ep

las, sic ut media antecedit: comitialibus & si

spiriosis data proficit. Foliorum succus, collu

subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut c

rufa igni sacro medetur: fistulis infusus prodes

lippitudinibus & aurium doloribus idem succi

instillatur. Additur quoque in oculorum collyri

Gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiection

bus, potu confert: clystere dysentericis infunditu

contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subijcitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum & vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutiendis strumis vtantur.

Lauer seu Sium. CAP. CXIX.

Sium in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, fo. Officinis slyslatis, olusatro similibus, sed minoribus, & Berula. odoratis. Que cruda coctâque esu, calculos rum-punt, atq; excernunt: vrinas cient, menses & par-tus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. De sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam men-tha, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium. CAP. CXX.

Sisymbrium (alijs serpyllum syluestre vocant) in Officinis solo inculto nascitur, menthæ hortensis simi- Balsa. m. titudine, odoratius, latiore folio. Inferiunt coronis. Calfaciendi vim habet: contra stillicidia vrinæ, calculosque, semen ex vino bibitur: tormina & sin-gultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur: item contra vesparum a= Vu'gò na= piûmque: ctus. Vomitiones potu cohibet. Alte= sturtium a= rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, quaticum.

alijs sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, prouenit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtium, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id excofacit, urinas mouet, crudum estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum. CAP. CXXI.

Crithmum, seu potius, ut aliqui, crithamon fruticosa & vndique foliosa herbula est, cuius bitit altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, cerorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia in cocto vino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctumve in oleo, seruatur etiam in muria.

Fuchsis

Coronopus.

CAP. CXXII.

Cornu cerui vulgò dictum.

Coronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs: coquitur in oleo: radix habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacorum, id est, facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

Soc.

Sonchus.

CAP. CXXIII.

Sonchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinus horret: alter teneritate quadam *Vulgò rosmollescit, cibus expetitus, anguloso caule*, inani, strum porinterdum rubente: folijs in ambitu per intervalla cinum. dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modicè adstrin= * Vox exgit: vnde æstuantì stomacho & inflammationi= Plinio rebus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosio= posita. nesorbitione mitigat, lac elicit, in vellere appositus sedus ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latus constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

ANNO TATIO.

Non video, quanuis & Græcus codex sic habeat, quomodo Seris satiua hortensi, quod planè est idem, stomacho vtilior dicatur: vt subesse errorem non parum suspicemur. Marcellus, qui aut integriore vsus fuit exemplari, aut locum, quem & ipse corruptum iudicabat, restituere conatus est, sic vertit: Latoribus foliis altera, satiua & in cibis gratior.

Seris siue intybus. CAP. CXXIIII.

Seris duum generum est: altera syluestris, quæ spicris & cichorion vocatur: * altera satiua, * Officinis latoribus folijs constat, stomacho quàm hortenscariola. sis vtilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

ma folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho vtilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, vtiliter illinuntur: podagricis, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussus à scorptone subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla. CAP. CXXV.

CHondrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est in cuius ramulus, gummi mastiches simillimum. ** myrabeolum * tuberculo fabæ inueniri solet. quod cum myræ & rha tritum, & linteo appositum, instar oliuæ, scæ id est, minarum menses trahit.* Tusa cum radicibus herbarum, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitroginitudine admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoueatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctus, in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chondrilla genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lateo:

eteo:

Eleo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescen-
te, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi
vim habent. Succus incommodos palpebrarum pi-
los refleclit. Nascitur in latis, & cultis.

Cucurbita. CAP. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumo-
res, & abscessus mitigat. Ramenta eius in-
fantibus contra capitis ardorem, quam syriasin vo-
cant, in sincipite illinuntur: oculorum inflamma-
tiones podagrasq; refrigerant. Succus è ramentis
tussis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium dolori-
bus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre
illitu adiuuat: totius seruesactæ, & expressæ suc-
cus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leni-
ter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem exca-
uatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potus
aluum leuigabit.

Cucumer satiuus. CAP. CXXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquam
utilis habetur: refrigerat, corruptionem non
sentit, vesicæ prodest, olfactus reuocat, quos ani-
mus liquerit. Semen modicè urinam mouet: cum
lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit.
Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epi-
nyctidas, cum melle. Peponis caro in cibus, uri-
nam cit: inflammationes oculorum illita sedat.
Ramenta eius contra adustionem infantium, quæ
syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti ad-
mota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum

semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in
smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem af-
ferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, dra-
chmæ pondere, vomitione mouet. Si quisquã mod-
ratè secundum cœnã vomere cupiat, geminis oboli
sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcer-
concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Lactucæ.

CAP. CXXVIII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratri-
linest, stomacho gratæ habentur: somnum
conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum
decoctæ magis alunt: stomachicis illotas esse pro-
dest. Epotum semen, assiduas libidinum imagi-
nationes in somno, compescit, & veneri refraga-
tur. Ipsæ verò frequentiores in cibo, claritati ocu-
lorum officium: inflammationibus, & ignibus sa-
cris opitulantur, muria condiuntur. Cum in cau-
lem exierunt, vim quandam nanciscuntur, succo
aut lacti syluestris lactucæ similem.

Lactuca syluestris.

CAP. CXXIX.

Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed lon-
gior caulis, & candidiora folia, graciliora
& asperiora: amaro gustu est, & viribus aliqua-
tum papaueri similis: vnde lacteum eius succum
aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum
elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos
argema caliginemq; repurgat, contra adustione
efficaciter illinitur, cum lacte mulierû. In summa
somnum allicit, doloris leuamentum præstat, men-

ses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum
ictus bibitur. Semen, non aliter, quam sativæ, libi-
dinū imaginationes in somno amolitur, ac venerē
arceat. Succus ad eadem valet, sed viribus infir-
mior. Reponitur in fictili novo lac eius, antea, ut
in alijs liquaminibus moris est, insolutum.

Gingidium. CAP. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cili- Nostrum
cia * plerunque nascitur: herbula sylvestri Ceresoliū.
pastinacæ similis, tenuior, & * amarior: radice * πλεῖστον
parua, candicante, subamara. Oulus hoc crudum, id est, pluri
coctum, conditūve estur magna stomachi utili-
tate: urinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ * πικρότε-
prodest. ρον, ἢ πν

Scandix. CAP. CXXXI.

Scandix, sylvestre oulus est, amarum, subacre: Scandix,
quod crudum coctūve manditur, stomacho Aëtio lib.
& ventri utile. Decoctum in potu, vesicæ, reni- 1. aulhore,
bus, & iocineri confert. agreste o-

Caucalis. CAP. CXXXII.

Caucalis, quam alij sylvestre daucum vocāt, gudio simi-
cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirle, acre &
suto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extre subamarū.
ma multifidis, hispidisque: candida in cacumine
umbella, suaviter olente. Crudum, coctūve olerū
modo estur: urinam movet.

Eruca. CAP. CXXXIII.

Ruda eruca venerem largiore cibo cōcitāt.
Semen eodem effectu prodest: urinam cit.

concoctioni prodest, alium perquam commodatam. Semine ad condimenta viuntur: quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris cruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ viuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satina acrior.

Ocimum.

CAP. CXXXIII.

Officinis
Basilicon.

Ocimum vulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, alium mollit, spiritum movet, urinam pellit, lac euocat: egrè tamē conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ichibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes excut. Semen potum convenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisque: naribus haustū, subinde movet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cū sternutamentū vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censent: quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiungunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche.

CAP. CXXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg

vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: unde probanche sibi cognomentum usurpavit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. CAP. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, brevis est caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthii. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera. CAP. CXXXVIII.

Tubera rotunda radices sunt, sine caule, sine folijs flavescentes: vere foduntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. CAP. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semine nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamē: tenues caules, & capreolos, vicinis frut

* Græcè est fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt: in uigis j vt topiarias ſcenas repræſentare videantur: ſili-
 uonv gi = quas fœnigræci profert longiores & toroſiores, in
 Jovra, quibus ſemina renum ſimilia, ſed inæquali colore
 quod re = recluduntur, * quæ quadam ex parte fulueſcunt.
 Etius forſi = Siliqua cocta, cum ſemine in oleribus, aſparagi
 tan reddi = modo, eſtur. Vrinam ciet, & tumultuoſa ſomnia
 deris: quæ facit.

magna ta = Medica. CAP. CXL.

mē ex par = **M**edica, cūm recenter prodijt, folijs & caule
 te fulueſcūt **M** trifolio pratensi ſimilis eſt: procedens verò
 vt intelliga folia contrahit, caules edens trifolij, & ſiliquas
 mus Smila corniculorum modo intortas, in quibus ſemen
 ca hanc di = lentis magnitudine dependet. Id ſiccatum, in
 uerſi quidē cundi ſoporis gratia, conditaneo ſali admiſce =
 coloris ſe = tur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illitu
 mina, ma = ſuffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui
 gna tamen pecora alunt.

ex parte Aphaca. CAP. CXLI.

fulueſcētia **A**phaca in aruiſ nascitur, altior lente, tenui
 procreare. **A**bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in
 Eſt quam quibus terna quaternæve ſemina nigra, lente mi =
 rura Viciā nora, continentur: quæ adſtringendi vim habent:
 ſylueſtrem quare torrefacta, ſtomachi aluique fluxiones ſi =
 vocitant. ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

Porrum capitatum. CAP. CXLII.

Capitatum porrum inflationem facit, no
 xium ſuccum creat: tumultuoſum ſomnum
 parit, urinam ciet: alio accōmodatur, extenuat,
 oculo

oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed ledit exulceratam vesicam, renesque: cum p[ri]sana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in defensionibus, ad præclusiones vuluæ, & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quãdam adstrictoriam vim habet: quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluua sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia tabemq[ue], pro delinctu efficax est: arteriam esu purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo, vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum ruiarhois, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt, veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & aqua li baccarum myrti pondere bibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, & plus porro excalfacit: urinam & menses vehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa. CAP. CXLIII.

Cæpa longa acrior est, quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca, quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes ta-

men

men mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, & extenuant: fastidium pariunt, & expurgant: aluo utiles sunt. E& detra&ctus purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subdit & pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemus, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem perunguntur: suppressos menses pellit, caput purgat naribus infusus: canis morsibus cum aceto, ruita, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in Sole, vitilignes sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos eum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est: citæ alio prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad purulentas aures, & eliciendum earundem aquam, valet: alopecie earum succo perficiantur, qui celerius, quam alcyonium pilos euocat: largiore cibo cæpa capitis dolores ciet, cocta&q; vehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur: elixa, & cispasis ruis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

Allium.

CAP. CXLIIII.

Allium quoddam satiuum atq; hortense habetur, quod in Aegypto, singulari, ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum vergens, paruum: reliqua verò magna, & candida, ex pluribus

ribus coagmentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscorodon, id est anguinum, vocant. Vis alligacris est: excoalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, suum gignit, flatū permouet, summam corporis cutē exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris tineas in cibo sumptum abigit, vrinas detrahut: contra viperarum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut nō aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum morsus & illitū, & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat, veterem tussim crudum coctūve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos, & lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecijs cum nardino vngvine, medetur: eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentigines, vlcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dētium dolorem lenat, si in ore contineatur: contra venenatos mures aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruefactæ comæ ius, sceminarum defectionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficitur. Factum ex eo, & nigra oliua inritum, quod myttoton vocant, esu

efucit urinam, ora venarum patefacit, hydropicis
vile. Scorodoprassum magnitudine porrum aequat,
qualitatum porri, & allij particeps: unde pro-
miscuas sibi vires ex utroque vendicavit, effe-
ctus allij, & porri præbens: inefficacius tamen.
Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum vicem
transit.

Sinapi.

CAP. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi vocant. Eligi de-
bet adultum, valde rufum, nõ magnopere sic-
cum, sed quod fractum internè vire scat, & veluti
quodam succo madeat, cæsum colore: siquidem
recens id genus, tempestivum habetur. Ad calfa-
ciendum, extenuandum, extrahendum, efficax
est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur:
contra præduros tonsillarum tumores, ac veterem
callosamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua, &
melle, convenienter gargariatur: sternutamen-
ta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus
quoque auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulati
oppressus excitat: lethargicus, derafo capite, illini-
tur cum ficis admistum, donec rubescat locus, &
* η̃ σπλ̃ν, ad coxendicum cruciarius impositum, * ad lienes,
να̃ς η̃ να̃ς & omne genus dolores confert, cum permutanda
δ̃ολου̃ ε̃ς valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt.
π̃α̃ρ χ̃ρ̃ο̃ Alopecijs illitum medetur, faciem purgat, sugilla-
τιον̃ ἀλ̃γ̃η̃ τα̃ cum melle, adipe, aut cerato rapit. Feræ impeti-
μα̃. gines & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
tra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui,

pol

polentæ modo, inspargitur: extrahentibus em-
plastris, scabiêmque extenuantibus, vtiliter admi-
sceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui.
cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-
nes oculorum & genarum scabritias magna vili-
tate illinitur. Expressus recenti semine succus, in
sole siccatur.

Nasturtium. CAP. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylo-
nicum. Omnium semen est acre: ex calfa-
cit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
excudit, lienem imminuit, partus exanimat, men-
ses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Il-
litum cum melle, lienem extenuat, fauos expur-
gat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus inco-
ctum. Serpentium venenis potum resistit, atq; eas
suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbun-
culos ad suppurationem perducit, & rumpit: co-
xendicibus cum polenta commodè ex aceto illini-
tur, tumores collectionesque discutit, emittit furun-
culos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem
effectus, licet minor.

Thlaspi. CAP. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali lon-
gitudine, in terram versis, suppinguibus, in
cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo,
tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-
ca ipsum totum, ab extremo in latus se pandens

Dionoeis, te: semine nasturtij incluso * lenticulae vasis effi-
 ds, id est, gie, nisi quod infringitur, (vnde nomen accepit)
 disci figu= flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fos=
 ra. sisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem
 vring; extrahit, potu acetabuli mensura: prodest
 ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, inter=
 nas suppurationes rumpit: menses ciet, sed par=
 tus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateuas,
 quod aliqui Persicon sinapi vocant, latis folys, ra=
 dicibus magnis: utile ischiadicorum infusioni.

Draba. CAP. CXLVIII.

Aly arabis. **D**raha herba ad cubiti altitudinem assurgit,
 * p'as'd'ss, tenues spargens * ramos, & ex utroque
 id est, vir= latere folia, ceu lepidij, sed molliora, & candidio=
 gas. ra: in cacumine verò sambuci umbellam gerit, can-
 didos flores habentem. Herba hac cum ptisana co-
 quitur, in Cappadocia maximè. Semen aridū pro
 pipere obsonijs admiscetur.

Irio. CAP. CXLIX.

Erysion, Latini irionem vocant, iuxta vr=
 bes, rudera, hortosque nascitur, folys eruce
 sylvestris: cauliculis in lori modum lentis & obse=
 quiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gra-
 cilibus, vt fenogreco, cornicularis: semine na-
 sturtij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis flu-
 xiones efficax est, & si purulenta extussumtur:
 regio morbo, & coxendicibus prodest: contra
 venena in delinctis cum melle datur: illinitur
 ex aqua aut melle utiliter cecis carcinomatis,
 par

parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatum, pinsita, farina oblitum perassetur.

Piper.

CAP. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti filiquam promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocant. Longum verò vehementius mordet: & quoniam prius, quàm ematurescat, decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratū esse constat, cādido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens ac minime furosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimique ponderis, quod vocant brasma. Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, disci-

tit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur.
 Piper, febrium horroribus circuitu repetentibus
 siue potu, siue illitu, subuenit: serpentium morfi-
 bus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimi-
 re creditur, statim à concubitu suppositum: tussi
 omnibusque pectoris vitis, siue eclegmate, siue po-
 tu, succurrit: anginae eo & melle conuenienter per-
 unguntur: potum cum recentibus lauri folijs, tor-
 mina discutit: cum vna passa manducatum, pi-
 tuitam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolo-
 res finit, appetentiam mouet, concoctionem adiu-
 uat, ad intinctus esculentorum additum: struma
 cum pice discutit, vitilignes ex nitro emacula-
 *φανῆ, nō Ficuli nouo, vt * lenticula, motum torretur. No-
 φασίρ. est huius arboris radix ginger, vt aliqui exi-
 stimauere, sicuti paulò post ostendemus. Nanque
 piperis radix costo similis est, ora gustantium ac-
 cendit, saluam ciēt. Hæc lienem reprimat, cum
 aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, mandi-
 cata cum semine pedicularis herbæ, quam staphi-
 dem agriam vocant.

Gingiberis.

CAP. CLII.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens: quæ
 virente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtun-
 tur, & primis potibus & edulys admiscunt. Hi-
 ius radices, cyperi modo, parue sunt, candican-
 tes, & odoratæ, atque piper sapore imitantur. El-
 gi debent quæ teredines non nouerunt. A multa
 tamen

tamen ob id *condiuntur, quòd celeriter cariem *ταριχόβε
sentiant, ac fìcilibus in Italiam asportātur. Gin= ται διὰ τὸ
giberis cibo conueniens est, & cum condimento δισπηλον.
assumitur. Excalfactoriam vim & excoquentem id est, sale
habet: aluum leniter emollit, stomacho utilis est, conspergum
efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offun= tur, quòd
dunt. In antidota addi solet. In summa, piperis vi= facile putre
ribus respondet. scant.

Hydropiper. CAP. CLII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ sta= gnant, aut pigro lapsu repunt: caulem edit
geniculatum, *prædurum, multis alis concavum: *τοπίον, id
folia menthæ, maiora, molliora, candidioraque, quæ est, solidū.
stus piperis, acri, citra tamen ullam odoris gra= tiam fructum acrem, in surculis paruis, prope fo= lia racematim coherentem. Folia cum semine illi= ta tumores veteresque duritias discutiunt, sugilla= ta delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro pi pe= re in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

Ptarmica. CAP. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos ha= bens paruos, multos, & rotundos, abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthe= midis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster= nutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in

montibus & petrosis.

Radicula, seu lanaria herba.

CAP. CLIII.

Cēsetur ea
quam vul-
gò saponi-
ria dicunt.

STruthium herba vulgò nota, qua purgandus la-
nus vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est
acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, or-
thopnoeae ex melle sumpta, cochlearis mensura:
aluum soluit. Eadem cum panace & capparis ra-
dice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du-
ritiam lienis absument: menses imposita trahit,
partus efficaciter enecat. Cum polenta autem &
aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum
farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur &
malagmatis, & ocularibus collyrys, claritatis cau-
sa. Sternutamenta mouet, per os purgat, trita cum
melle, & naribus infusa.

Cyclaminus.

CAP. CLV.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
varia, in quibus supra infraque albicant ma-
cula: caule nudo, quaternos digitos equante: flos-
*ωορρυγι= ribus in eo * purpureis, rosarum effigie: radice
ζουτα, pur= nigra, & aliquantum lata, ut rapum videri pos-
purascenti= sit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq;
bus. detrahit: menses potu appositivè ciet. Tradunt,
si prægnans radicem transgrediatur, abortum fie-
ri. Partum appensa accelerat: contra venena,
præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita
contra serpentium ictus, remedio est: immista vi-
no

in inebriat: regium morbum discutit, tribus dra-
 chmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed opor-
 tet eum, qui ebibit, multis vestibus contectum, lo-
 co calido, & à persfrictionibus tuto, recumbere,
 quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei co-
 lore inveniuntur. Succus eius ad purgandum ca-
 put, naribus infunditur: ad deicienda quoque alui
 excrementa, in vellere sedi subicitur: illito um-
 bilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emol-
 lit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusa
 oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest.
 Medicamentis abortum inferentibus admiscetur.
 Succus cum aceto illitus, prociduum sedem resti-
 tuit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis
 crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat,
 eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex
 aceto per se aut cum melle medetur, lienem absu-
 mit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat:
 eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcu-
 scula, pernionesque foveri congruum est: ipsaq; in
 oleo vetere feruifaceta, illito oleo, vlcera ad cicat-
 ricem perducit. Cavata radix oleo expletur, &
 cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyr-
 rhenicæ ceræ momento, ut strigmenti crassitudi-
 nem vnguentum contrahat, cum primis utile per-
 nionibus. Radix, scilla modo, concisa reponitur.
 Narrant ad amatoria assumi contusam, & in
 pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime
 sub arboribus.

Altera cyclaminus. CAP. CLVI.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus geniculatis caulibus, crassissq; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ molibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per vrinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

Dracunculus. CAP. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematurrit, croceo, gustu feruens, mordaxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absument: carcinomata illitus sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excoalfacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussi, destillatione

tionibus, auxiliatur: humores pectoris excreatu facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: urinam pellit, venerem excitat, cum vino pota. phagedenas ulcerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eyciendos partus fieri solent: qui radice suas manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino perniciosis apposuisse prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro oleris recipitur: in Gymnests insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mensibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, sicatur in umbra, & ita reconditur.

Arum.

CAP. CLVIII.

ARon, apud Syros lupha vocitatum, folia Iarus offi-
emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceum semine exit: radice dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta manduntur. Radix,

semen & folia, dracunculi vires habent. Prunatin
radix ex sino bubulo podagris illinitur, & dra-
cunculi more reponitur. In totum, ob mitiore eiu-
acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum.

CAP. CLIX.

Arisarum exigua herbuli est, cuius radix o-
leae magnitudinem implet, longè maiori
quàm aron acrimonie: unde illitu nomas sistit.
Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu ra-
dicis, genitale animalis cuiuscunque in pernicien-
agitur.

Hastula regia.

CAP. CLX.

Officinis
Aphrodi-
los.

Hastula regia vulgaris notitiæ est, folijs ma-
ioris porri: caule læui, ferente in cacumine
flore, quem anthericon appellant: radices sub-
iacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu
acres, quæ excalfaciunt: urinas & menses epota-
ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussi-
bus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur.
Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magni-
tudine commanducata: à serpente demorsis datum
aptissimè, verum trium drachmarum pondere
folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire
oportet. Item vlcera sordida, & depascentia, mam-
marum quoq; & testium inflammationes, tuber-
cula, furunculósque, decoctis in fece vini bulbis,
recentibus inflammationibus ex polenta auxilia-
tur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myr-
rha & croco decoquitur, sitq; perquam utile oculis.

lis medicamentum ad purulentas aureis per se, & cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, *dentium dolorem *ναβ'αυ mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum τὸν ἑγχυσ reducitur. Oleum in excavatis radicibus igni deco= deis. Etum, illitu exulceratis pernionibus & ambustis igni, conducit: & surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, *lintheo antea *προανα= perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen flo= τριφύτα resq; in vino poti, scolopendræ & scorpionū vene= ἐν ἰδονίω. nis, mirum in modum resistunt: alium purgant.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: stomacho & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarum verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, exalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflammationem pariunt: luxatis, fractis, articulorū doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrenas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorū tumores, & canū morsus cum melle & piperis polline illiti colibent, sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures & ulcera, quæ in capite manant, cum tostō nitro abstergunt. sugillata varosq; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant: fractis auriculis unguibusq; ex polenta medentur: idem calidis

calidis cineribus torrefacti, tollunt fici: item cum cinere è manarum capitibus, impositi: cremati vero, & cum alcyonio mixti, vitia cutis in facie, atque trasq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius. CAP. CLXII.

Bulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, *cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones movet.

Scilla. CAP. CLXIII.

Officinis **S**cilla vim acrem atque feruèntem habet: assasquilla, Var **S**tam ad multa vtilior è esse constat. Polline adronis more. crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum conicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: qua exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt: nam quæ ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnis demittatur. Sumi etiam solet quod maximè est medium, direptis viuo tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidè parte se contingant: his scillæ segminibus

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum uti-
mur. Ad rimas pedum, interna pars crude scillæ
in oleo feruesfacta, aut cum resina liquefacta im-
ponitur: decoctia in aceto demorsis à vipera, cata-
plasma est. Ad singulas assæ parteis adiectus octo-
nis tostus salis, cochlear vnum aut alterum damus
ieiunis, ad emolliendam aluum: in potu autem &
odoratus medicaminibus, & quibus urinam ciere
volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus in-
natat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vete-
re, suspiriosis, & ore reijcientibus tres obolos, in
delinctu ex melle sumpsisse satius est. Coquitur cum
melle, & estur eorundem gratia, maximè vt con-
coctionem adiuvet. Strigmenta per aluum extra-
hit. Cocta & simili sumpta modo, eosdem præbet
effectus: sed cauendus scillæ vsus huius, qui intesti-
num sentiunt vlcus. Ad pensiles verrucas & per-
niones, tosta efficaciter illinitur. Tertium semen,
& in carica aut melle deuoratum, aluum emollit.
Scilla tota in limine ianuæ suspensa, mali medica-
menti noxam arcet.

De Pancratio. CAP. CLXIII.

Pancratium, quod aliqui scillam appellant, ra-
dice est magni bulbi, subrufo colore, aut sup-
purpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lili, sed
longioribus. Scillæ vires & preparationem ha-
bet, eodèmq; pondere in morbis efficaciter assu-
mitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas in-
est. Radicis succus cum erui farina digeritur

in

in pastillos, qui hydropicus splenicisq; cum hydro-
melite, commodissime dantur.

Capparis CAP. CLXV.

CApparis aculeatus frutex est, qui in terra
stratus, magis in orbem euagatur: spinas,
ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia
mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui
cum dehiscens panditur, florem candidum pro-
mit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura
inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum
similia ostendit, parua, rubicunda: radices ligno-
sas spargit, grandes, numerosasque. Tenui ple-
runque solo, asperisq; locus, in insulis & iuxta ru-
dera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia con-
diuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim
gignit: cocta tamen stomacho quam cruda utilior
est. Fructus drachmis duabus in vino potus, qua-
draginta diebus, lienem absunit, & urinam cruen-
tamq; excrementum emittit: bibitur utilissime in
coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item
ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. Den-
tium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, collu-
to inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem pro-
ficat: ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ oc-
calluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei il-
linitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum
aceto trita, vitiliginis albas absterget. Radix fo-
liisq; intrita, strumas ac duritias discutiunt. Au-
rium vermiculos infusus succus enecat. Aphri-
ca,

ca, & præsertim Marmarica capparum, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Libyco, & quæ Rubro mari deferitur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingivasq; osse tenus exest: quare in cibis non ab re lamnatur.

Lepidium.

CAP. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Censetur pⁱ vulgò nota: muria cum lacte seruatur. Vis peritis olito foliorum acris & exulcerans: quapropter ischiarum. licis trita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum.

CAP. CLXVII.

Complura ranunculi genera: vis tamen o- Vulgò Apia
mnibus una, acris, & vehementer exul- risus.
cerans. Nam vnum coriandri folijs constat, la-
rioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, in-
erdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: ra-
lice alba, exigua, amaraque, multis capillamen-
is, hellebori modo, fibrata: nascitur in limitibus
humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule,
pluribus foliorum incisuris, * plerunque in Sar- * πλῆτον,
linia proueniens, quàm acerrimum, quod sylvestre id est, copia
ipsum appellant. Tertium minimum, odore graui, sum.
lore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo.
Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulce-
ant, & crustas non sine dolore gignunt: quare
vng

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq; sternutamenta ciēt, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen si angit.

Anemone. CAP. CLXVIII.

Duo anemones genera, vnum syluestre, alterum in cultis nascens. Cuius multae species una phoeniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, ceterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut caerulea: radix oleae magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capitamentis. Acrior est, quae nigra habet folia. Viriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorum dem & hebetudines emendat, sordida ulcera abtergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis praebent: menstruant, vellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonen nominant.

ri en

ri eupatorium putent: quoniam à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verùm papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtrique tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustus admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone superne crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In arvis illa sæpius enascuntur.

Argemone. CAP. CLXIX.

ARgemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem, dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illius inflammationes compescunt.

Anagallis. CAP. CLXX.

DVO anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtrique mitigandi

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus capu gargarizatu purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: a gema cum melle Attico emendat: retusa oculorum aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris & renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cœruleum edit florem, proci duam sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu euocare.

Hedera. CAP. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: helix, fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & * ὀβύμω, folia parua, angulosa, & * concinniora. Hedera τὸ παρ, non omnis acris est, & adstringens: nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, ac cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, mele aut nitro, naribus infunditur, & contra vetera * ἀρμόζει, capitis dolores. * caput eo cum aceto, & rosaceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, anepoti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant.

bant largius sumpti. Acini quinque triti, calfa-
 cliq; in pumici mali cortice cum rosaceo, si insillen-
 tur à contraria aure, dolorem dentium mitigant.
 Denigrant capillum, illiti corymbi. Folia in vino
 decocta, illinuntur omnium vlcenum generi, etiam
 si cacoethe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sa-
 nant, vti antea diximus, decocta. Mouent menses:
 triti & subditi corymbi: ydem poti, post purgatio-
 nes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi
 spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus
 ac vuluæ inditus, mēstrua & partus extrahit. In-
 stillatus succus putrida tedia narium, graueolen-
 tiāque emendat, & sanitati restituit. Lacryma
 hederæ psilothrū est: illius pediculos enecat. Succus
 radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubita-
 li aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranuncu-
 li, mollioribus tamen, & colore cæsjs: flore viola
 albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo suc-
 cus croci, mordax, acris, & aliquantulum subama-
 rus, grauius olens: radix supernè singularis, infer-
 nè in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua,
 ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram
 longa: in qua semen papauere maius recluditur.
 Succus in æreo vase, cum melle prunis deco-
 ctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radi-
 ce, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus
 in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt: imposita cū vino. aut manducata, dentiū dolorē sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduētū hirundinū exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrāt, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIII.

Vulgò Scrofularia minor.

Chelidonium minus, quod triticum syluestre aliqui nūcuparunt, herbula pediculis ab radice pēdens, sine caule: folijs hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in graminum tritici modum acernatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeūt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemone modo, summam cutem exulcerat: psoras & scabro vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eiu cum melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. CAP. CLXXIIII.

Varie de Othonna sententiæ.

Othonnam aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum. Alij permistos cœruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ othonna vocatur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribra-

modo, & veluti à tinea derosis, squallore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adiicitur, ubi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. CAP. CLXXV.

Muris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægylopiæ sanat. Sunt qui al sinem, muris auriculam vocitent.

Glastum. CAP. CLXXVI.

Satium glastum, quo infectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, verum pinguius nigriusque: cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis proflua sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putre-

scientia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre
 glastum satiuo simile est: folia fert maiora, la-
 * *λεπτοτέ* *ε*ctucaceis proxima: caules* prætenues, multifidos,
*πρ*s, id est, quadrātenus rubentes: in quorum cacumine foli-
 tenuiores. liculi multi dependent, quandam linguarum effi-
 giem referentes, in quibus semen flore tenui, luteo.
 Eadem quæ & suprā dicta præstat: potu & illu-
 lienosis auxiliatur.

Telephium. CAP. CLXXVII.

Vulgò
 Crassula
Telephium herba portulacæ similis est, &
 caule, & folijs: alas binas in singulis folio-
 maior, & rum geniculis annectit, ramuli à radice seni se-
 faba inuer- ptenive prodeunt, folijs referti cœruleis, crassis,
 sa. lentis, ac carnosiss, flore luteo, aut candido. Nasci-
 tur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis
 horis illita albam vitiliginem sanant:
 sed postea hordeacea farina illini
 debet. perunctam ex aceto
 etiam in sole vitiligi-
 nem tollunt, sed
 ubi inaruerūt,
 abstergun-
 tur.

SECUNDI LIBRI

FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,
Liber III.

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.



SUPERIORIBVS, charissi-
me Aree, commentarijs, tradidi-
mus de aromatibus, unguentis,
oleis, arboribus, earum fructibus
& lacrymis, item de animalibus,
cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia
praditis. In hoc autē tertio radices, succos, semina,
herbas, & quæ vernacula & inter se cognata
censentur, quæq; pluribus scatent remedijs, proſe-
quemur.

Agaricum. CAP. I.

Agaricum radix fertur laſerpitij ſimilis, ſed
facie ſumma ſolūtior, & rariore fungo-
ſoq; tota contextu. Duo eius genera: ſcœmina, quæ
præfertur, rectis intus venarum diſcurſibus con-
ſtat, mas rotūdus eſt, & vndiq; compactior. Vtriq;
guſtus in initio dulcis, mox ex diſtributione in
amaritudinem tranſit: gignitur in Sarmatiæ re-
gione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem

esse plantæ affirment: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosis verò, in aqua mulsa. Arquat quoque, suspiriosis, iocineris, renūmque vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina ægrè redatur, si vuluæ strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: fœminis, quas inflatio vuluæ vexat, vtiliter equali modo datur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitis cōuenit, pro viribus, & ætate datum, nunc ex aqua, nunc

ex

ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. CAP. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhaponticum vo= Ignoratur. cant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum Nec enim sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, est, quod centaury magno similis, sed minor & rufior, fun Reupontici gosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum ha= nomine ho= betur, quod teredines non sensit: si gustatu cum die indica= remissa adstrictione lentescat, manducatumq; co= tur. lorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinan= tem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi im= becillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intentæ præcordia, & vul= uæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excrea= tiones, suspiria, singultus, dysenterias, & cælia= corum affectus, contra febrium circuitus, & ve= nenatorum morsus. Datur in singulis valetudini= bus eodem, quo agaricum, pōdere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lie= nis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stoma= chi, id est cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. summa eius vis adstringens cum aliquanto calore.

Gentiana. CAP. III. * Græcus
Gentianæ inuentio prima assignatur * Gentio Gentidi.

Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit. Fo-
 līs partim proximè radicem, iuglandi plantagi-
 nīve similibus, subrubris, partim à medio caule,
 & præsertim iuxta cacumē, paulū dissec̃tis: cau-
 le cauo, & læui, digiti crassitudine, geniculato, &
 ex intervallis maioribus foliato, binū sæpe cu-
 bitorium: semine in calycibus lato, sine pondere,
 glumoso, satis ad sphondyli semen accedente: ra-
 dice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur
 in sublimibus montium iugis, umbrasis locis, aquo-
 sisq;. Vis radicis excausatoria, & adstringens:
 contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum
 pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti
 succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi
 deturbatis, ruptis, & convulsis, prodest: hepaticis
 & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix
 collyrii modò subdita, partus eicit: imposita, ut
 lycium, vulneraria est, & ulcerū cuniculatim de-
 pascentium medela. Succus præcipue eodem esse-
 ctu prodest: oculis inflammatione laborantibus illi-
 nitur: pro meconio collyrijs acribus immiscetur.
 Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ra-
 tio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua
 maceratur: postea in eadem tantisper decoqui-
 tur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, lin-
 teo extolatur: mox discoquitur, dum mellis crassi-
 tudo fiat, sic̃tliq; reconditur.

Aristolochia. CAP. IIII.
 Aristolochia nomē ex eo sibi adaptavit, quod
 exist

existimetur optimè puerperis opitulari. Tria
eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina
vocalur, folijs hederaceis: præstanti odore cum
acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una
radice germinibus, prælongisq; palmitibus: flo-
ribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod
rubrum est, grauitè olet. Longa, mascula appel-
latur: nonnullis dactylitis, longiore quàm ro-
tunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flo-
re purpureo, grauitè olente, qui marcescens in
pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda,
in orbem conglobata, rapi modo. Longa verò ra-
dix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudi-
nem implet, nonnunquam paulò maiorem. Am-
ba colore intus buxæo, gustu amaro, & graui.
Est etiamnum tertia longa, quæ clematitis voca-
tur, ramulos habens tenues, refertos folijs subro-
tundis, minori semperuino similibus: flores rutæ:
radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq;
vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis cō-
uenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Lon-
ga verò aduersus angues, & venena, drachmæ
pondere ex vino bibitur & illinitur: pota cum pi-
pere, & myrrha, menses, partus, & omnia vulua-
rum onera eijcit: eadem efficit subdita in pessa.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus,
suspitijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum do-
loribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur.

Aculeos, & spicula extrahit, ostiū squamas illitu
adim

adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: cauat cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

CAP. V.

Liquiritia
officinis.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguibus, taclique gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, ru-
*μαρπός, fas & *parnas: radicibus longis, vt gentianæ, id est, lon- coloris buxei, subacerbis & dulcibus: quæ dens-
gas. santur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: verum oportet vt lingua subditus eliquescat, æstuanti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, com- manducatus ori prodest: recentis radicis decoctum ad eadem cõuenit. Eiusdem farina pterygis com- modissimè inspargitur.

Centaurium magnum. CAP. VI.

Censetur
Rheuponti
cum offici-
narum.

Centaurium magnum folia habet inglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulē, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab rabice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis quib

quibusdam innolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramēta eius in collyrii formam vuluæ subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem præstat, vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaureum minus. CAP. VII.

Centaureum, limnesion aliqui vocauere, quoniam rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, læui & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur.

funditur: trahit enim sanguinem & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat: in vellere appositus, menses & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vitis succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pragnans, & diebus quinque madesacta, decoquitur, donec superemineat aqua: mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem gravidamque contundunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus vasis adhærescat, decradunt, reliquoque humori permiscunt. Nocturne diligenter operiunt: namque ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (ut in gentiane mentione retulimus,) præparantur: sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis faciliantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mædragora reliquisque similibus succus sic ex acerbis vis melligo elicitur. Lycium tamen, & absynthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamæleon albus. CAP. VIII.

Chamæleon albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur
mul

mulieres: folia habet silybo aut carduo similia,
 asperiora, acutiora, nigroque chamæleone vali Sic Plin.
 diora: caulem nō promit, verū ex medio spinas, græcus co-
 echini marini, aut cinaræ modo, erigit: flores pur- dextera
 pureos, veluti papporum lanugines emittit: semen τριγῶν, id est
 cnici simile: radicem in lætis collibus crassam, in crassiora:
 montosis verò graciliorem, in profundo albam: ni fortè ἴσῃ
 aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. χύτριον λε-
 Quæ pota acetabuli mensura, lætus interaneorum gēdū: quod
 tineas pellit. Bibitur autem in vino austerō, cum ex herbariis
 origani seruefacti succo. Hydropicis commodissimæ collatione,
 mē drachma in vino datur, etenim eos extenuat: si quādo vī
 contra difficultatem vrinæ decoctum propinatur. dere continē
 Hausta in vino, serpentum venenis resistit: occidat, facilē
 dit canes & sues: mures item necat, subacta cum diudicanea
 polenta aut aqua, & oleo madefacta. ris.

Chamæleon niger. CAP. IX.

CHamæleon niger, folijs scolymo similis esset,
 nisi minora, tenuioraq; , ac rubro distincta
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi-
 tudine digitali, subrubrū: & in umbella flores
 spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ
 dissecta flauescit, & commanducata mordet. Pro-
 uenit in campestribus, siccis, & cliuosis tracti-
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asci-
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs-
 ter

terget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, vitilignesq; cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedenas, tetraq; Nominis ratione plura illius sanat. Quare chameleo vocetur, à variatione. rietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hinc viridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

CAP. X.

Crocodilion chameleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantum lata, odore, ut nasturtij, acuto. Feruesfacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum, quod suapte vi urinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP. XI,

Virga pastoris vulgò.

Dipsacum, aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis horridum, folijs lactucæ, spinosis, binis genicula singula complectentibus, prælongis, cœu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula circuli capitula insunt, oblonga, echinata

nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaque medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanant rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiumt fornicationibus, verrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo aligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruenta extussunt, efficax est: urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. CAP. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasque fluxiones radix etiamnum

valet. Prouenit in asperis.

Carduus. CAP. XIII.

Est gallorū
Artichan.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chas-
maleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora,
& crassiora: caulem longum edit, foliosum, capi-
te spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, gra-
ueolentiam alarum totiusque corporis emendat:
item si decocta in vino bibatur. Copiosam autem
urinam fetidamque expellit. Herba cum recens
tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. CAP. XV.

Poterium, Iones neurada vocant, largè fruti-
cat, cortice obductum tenui, spinis horridum,
lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, te-
nuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, ro-
tundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nul-
lius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in
aquosis, & collibus. Radices demittit binum ter-
numve cubitorum, nervosas, & firmas: quæ pro-
ximè terram recisæ, dant succum gummi simi-
lem. Tussæ, præcisis nervis & vulneribus gluti-
nandis illinuntur. Decoctum quoque eius nervo-
rum affectibus prodest.

Acanthium. CAP. XVI.

* Additum **A**canthium albæ spinæ simile, folijs nucleas-
tis per extremitates, * & lanugine araneo-
ex Plinio. sa obductis] ex qua collecta & neta, vestes bom-
bycinis similes texunt. Folia vel radices ad reme-
dia opisthotoni bibuntur.

Acan

Acanthus. CAP. XVII.

Acanthus, Romani paderotam vocant, na- Officinis
scitur in hortu, petrosus, & riguis: folia ha- Branca
bet multò lactucaceis latiora, & longiora, eruca sina.
diuisura, nigricantia, pinguis, leuia: caulē binūm
cubitorum, digitali crassitudine, leuem, prope ver-
ticem ex interuallis circundatum foliolis, ceu nu-
camenta quaedam oblonga referentibus, spino-
sis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum,
luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur
longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis
igni & luxatis artubus illitæ subueniunt: potæ
vrinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, con-
uulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt. Nascitur
& syluestris acanthus, scolymo similis, aculea-
tus, breuior quàm sativus, & is qui hortis pro-
uenit: cuius radix ad eadem, ad quæ superior,
efficax.

Anonis. CAP. XVIII.

Anonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò, Re-
mos habet fruticosos, dodrantales, aut pau- sta bonus.
lò maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis
alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticu-
la, tenuibus, pusillis, ad rutæ aut * pratensis loti * Suspicio
folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in- lotum syl-
iucundè olentibus. Muria conditur, antiè quàm uestrem in-
spinoza fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus telligendū:
spinis, & veluti spiculis firmiter horrent: radi ac ob id for-
sem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte- tè pratens-

sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, urinam ciet: quod trifolium calculos comminuit, margines ulcerum erodit. lūpratensis Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium constet fortissimum collutione mitigat. Decoctum eius potu habilius: ut volu morrhoidas sanare creditur.

mine quar= Leucacantha. CAP. XIX.

to à Diosco **L** Eucacantha, prædita est radice cyperi, valida & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potus. Eadem ruptis & convulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbet effectus.

Tragacantha. CAP. XX.

Tragacantha radix lata & lignosa, summo caespite nititur, unde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub Officinis se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est Dragagan= etiamnum tragacantha, lacryma, quæ, vulnerata radice manans, concrevit. Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, ceterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque lingua liquescit, & in passio madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryi

Eryngium.

CAP. XXI.

ERyngium aculeatarum generis est. Cuius fo- Nunc corru-
lia in principio, sale condita, in cibos recipiunt pto vocaba-
tur: lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, lo Iringum
guſtu aromatica. Sed ubi adoleuerunt, circa com- dicitur.
plures caulium eminentias in spinas aculeantur,
in quorum summitatibus globosa capitula, dura-
rum acutissimarumque spinarum ambitu stellatim
circumvallantur, quorum colos alias viridis, alias
albus, interdum cœruleus inuenitur. Radix ob-
longa, lata, foris nigra, internè candida, pollicis
crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & cam- *Per anthe-
peſtribus. Vim habet calfactoriam: pota menses ricum cau-
& vrinas pellit, tormina inflationesque discutit: lē Asphode-
contra iocinerum vitia, serpentium morsus, & li cui aptis-
hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduer- simè compa-
sus plurima, cū seminis paſtinacæ drachma vna: ratur Aloe,
appensa illitave, tubercula discutere proditur. Po- hic intelligi-
ta cum hydromelite radix, opisthotonicis & comi- mus: quan-
tialibus medetur.

us Diosco-

Aloe.

CAP. XXII.

rides in As-

ALoes folium scillæ similitudinem habet, phodeli si-
crassum, pingue, modicè latum, rotundum, ue Hastulæ
retrorsus pandum: folia utrinque ex obliquo lon- regiæ histo-
rioribus interuallis striantur, & in spinulas de- ria, eius flo-
sinunt retusas truncasque. Caulis emittitur non rem hoc ap-
disimilis * antherico: flos albus: fructus hastulæ pellari no-
regiæ cognatus: graui tota est odore, & guſtu mine tra-
amarissima: radice vna, cen palo, in terram depa- dat.

Etia. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (ut in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi generæ: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse videtur. alterum ad iocineris imagi-

* Plin. pin = nem vergit. Eligi debet * syncera, quæ nihil doguis, qui nō li sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friaxαδαρᾶν, bilis, ac iocineris modo coacta, facile liquefscens, ut nostri co eximiæ amaritudinis: improbatur nigra & fradices ha = ctu contumax. Gummi eam adulterant: quod debent, sed prehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: λικαράν eoque argumeto, quod digitus friata nō ad minima videtur le = vsque frusta resoluitur. Nec desunt, qui acaciam gisse.

immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, alium resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, alium soluit: purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs medicaminibus admixta, præstat ut minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq: eadem peculiariter exulceratis genitalibus
medes

medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passio sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginēque angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaque subinde versatur, ut possit equaliter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absynthium. CAP. XXIII.

Absynthium, aliqui bathypicron herba vulgo cognita. Præstantius in Ponto & Capadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calefaciendi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhaesit: urinam cit, & crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo Gallico potum: fastidia discutit, & arthros sanat madesacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconi marino.

Angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item praecordiis & iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cum ficis autem, aceto & loliacea farina, aqua inter cutem lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absynthiten vocant, praesertim in Propontide & Thracia, quo ad ante dicta vtuntur, cum febris carent: alioquin in aestate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In sparsum arcis absynthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & a corpore arceat: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem praestare effectus. At tamen potionibus improbatur, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum absynthiū. CAP. XXIII.

Absynthium marinum, quod aliqui seriphum vocant, copiosissimum in Tauro monte: iuxta Cappadociam & in Taphorisi Aegypti gigni

* Abrototum: quo Isiaci pro oliuae ramo vtuntur. Herba est num mare tenus, * abrotoni parui similitudine, referta miintellige. nutulus seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea

Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adstringit: per sese, aut cum oryza cocta, in ieraneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, alium lenigat: cum edulio autem vel lentis la decocta, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absynthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absynthio non dissimile, verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum.

CAP. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu: id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absynthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruesfactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroribus ex oleo illinitur: serpentes & substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino potum prodest: pri-

p s

uatim efficax contra scorpionum & phalangiorū
venena: oculorum inflammationibus commodè il-
linitur, cum cotoneo cocto, aut pane: tritum cum fa-
rina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: iri-
ni compositionibus admiscetur.

Hyssopum. CAP. XXVI.

HYSSOPUM, herba nulli non cognita, diuinū
generum est, montanum & hortense. Opti-
mum est Cilicium. Vim habet extenuandi & cal-
faciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta,
potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspirio-
sis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: ti-
neas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur.
Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum
ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum
cum ficis viridibus detritis manditur, vehemen-
tiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deicit:
colorem in corpore fouet: lieni, & aqua inter cū-
tem, cum fico nitroque, inflammationibus quoque
ex vino illinitur: cum feruente aqua impositū, su-
gillata discutit: cum decocto ficorum, optimè angia-
nis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium
dolorem in collutione sedat: inflationes auricula-
rum vaporis suffitu discutit.

Stæchas. CAP. XXVII.

Officinis, **Stæchas** iuxta Galliam in insulis eiusdem no-
Stæchas A- minis e regione Massilia gignitur, vnde co-
rabica. gnomentū accepit. Herba tenuibus surculis, com-
thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquan-

tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & fæctis liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cundem vocant, folium habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cum vino potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex pasaso: si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esu datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus virentis tonsillas, ruam, & oris vlcera sanat, & per nares, ex oleo irino infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo, & capis, & rhois frutice, quæ ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos insolatus, dum canicula sydus flagrat. Herba autem substratu serpentes fugantur. Quæonitu appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei organi Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre
orig

origanum, aliqui panace: Heraction, alij cuni-
lam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius.
Folys est origani, ramus tenuibus, dodrantem al-
tis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candi-
di: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percus-
sis à serpente, folia & flores ex vino poti auxilian-
tur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

Tragoriganū tenuis frutex est, sylvestri ser-
pyllo aut origano similis, folio & ramulis.
Quibusdam in locis letius virentiusque inuenitur,
& latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exi-
libus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui pra-
sium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & Creten-
se, & Smyrneum, & in Chio Cooque proueniens.
Omnia excalfaciunt, urinam cient, aluo accom-
modantur, decocto potu bilem deiciunt, lienosis
ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venena
in vino bibuntur, menses trahunt: peripneumoni-
cus, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur.
Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fa-
stidientibus & stomacho acida ructanti, imbecil-
loque traditur. Item si à maritima iactatione nau-
sea, & æstus precordiorum excitetur: tumores ve-
rò cum polenta illita discutunt.

Pulegium. CAP. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat,
calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac
partus eicit: pulmonis vitia ex melle & aloe po-
tur

rum extrahit, & convulsis auxiliatur: nauseas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet: atrabilem per aluum exigit. Bibitur in vino utilissimè contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingivas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omnes sedat, podagris per se subuenit, impostum vsq; dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit, lienosis cum sale utiliter illinitur: decoctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersas vulvas corrigit, contra inflationes duritiasq; vulua, in defensiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona, quoniam dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. CAP. XXXI.

Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium. Græcus, Dictocatur. Cretensis herba est, acris, leuis, Etamnium: ac pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento sic etiã Plin. quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ sitivum pulegium, sed efficacius multo. nam non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eijcit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquove corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum immittit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit.

facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus presidio est. Tanta herbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu scuiunt, appensaue contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdem effectus prabet, sed inefficacius multo. Desertur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbri, ramus maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quae aduersus serpentium iniurias consinguntur, theriaca vocant.

Saluia.

CAP. XXXII.

SAluia siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, per quàm iucundo odore, sed grani: semen summus in caulibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & vrinas, decoctum foliorum ramorumque potus, & partus extrahit, & pastinacae marinae ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerū sanguinem cohibet, tetra vlce-

sa purgat: testium pruritus sedant rami foliaque,
si decocto eorum foueantur.

συν οἶπυ

Mentha.

CAP. XXXIII.

Mentha, cognita herba est, calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones, cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mammæ, si tendantur, aut lacte turgeant, compescit: cum sale, canum morsibus illinatur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit: linguæ scabritiem conficta leuigat: coire fac, densariq; in caseum non patitur, si folia positionibus lactis immergantur. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Latini menthastrum Mentha vocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore, strum. quam sisymbrii, odore magis viroso: quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha.

CAP. XXXIIII.

Ex calaminthæ generibus quedam monti Calamenebus familiaris, folia ocimi habens, incana, thum offi-
circulos, & caules angulosos, purpureum florem. cinarum. Altera pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegium ideo appellant, quod odore ipsum emuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia menthastrum
thast

thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruetia, & acria: radix superuacua. Nascitur in campis, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnoea, torminibus, cholericis, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: praesumpta in vino, venenis resistit: tineas caeteraq; interaneorum animalia, cum sale & melle pota, enecat: nec secus cocta crudare, si teratur. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata, serpentes fugant: nigri cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollunt. Calamintha ischiadici imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum.

CAP. XXXV.

Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs, multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo, & petroso procreuit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti in prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit.

vri

rinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit
excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto
litum: concretum sanguinē dissolvit: verrucas thy
ni colorem reddentes, pensilēsque tollit: ischiadicis
um vino, & polenta impositum subuenit: hebeti
us oculus in cibo prodest. Perquam utile pro condi
mento, duntaxat ad vsus eorum, qui rectē valent.

ANNOTATIO.

Herba, quam Medici pro satureia hodie
surpant, hyssopi folio, thymum magnitudi
ne longē exuperat, vt non esse genuinam, ac
hic descriptam, satis eius historia conuincat.

Satureia. CAP. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in aspe
ris locis, & tenui solo, thymo similis, minor
tamen, & tenerior: defert spicam florum plenam,
coloris herbacei. Eadem potest quæ thymum, si mo
do consimili sumptitetur. Aptus sanis vsus: Est eti
amnum quædam satia, syluestri prorsus minor,
quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in
cibus recepta est.

Serpillum. CAP. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortense odo
re sampsuchum imitatur, atque in coronas ad
di solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam
si qua eius particula terram attingat, inibi ra
dices demittet. Folia & ramulos origani habet,
sed candidiores: in maceris multò procerius as
urgit. Syluestre, xygis appellatum, non serpit,

sed in altitudinem increfcit, ramulos edenstennes, furculosos, folijs refertos, longioribus quam ruta, & durioribus, angustis: flores iucundè olent, gustanti acres: radicis nullus vsus. Nascitur in petris, satius efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi vsum aptius. Menses trahit, vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur: & aduersus serpentes potu illitūre: capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & malefactum in aceto: maximè verò phreniticus, & lethargicus conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. C. R. P. XXXVIII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyxiceno laudatissimum: secundum sibi locum vendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, & Cyxicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius calamint hæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciat. Illita ex melle arida folia, sugillata tollūt: menses subdita in pessō trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur: luxatus tumoribusq; , ceterato excepta imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmati q; , calfaciendi gratia commiscetur.

Med

Melilotos, siue fertula Campana.

CAP. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passio cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut foenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris, intybove. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passio instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum. CAP. XL.

Marum herba cognita vulgò, surculosa, flore Morigani, folijs multò cædidiorebus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modicè calfacit: qua de causa illius serpentia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos. CAP. XLI.

Acinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis, odo-

rata, sed hirsutior: quæ coronæ factitantur: à non nullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis. CAP. XLII.

* οὐδὺς.
i. odorata.

Baccharis herba * fruticosa, quæ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solū amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diuturna tussi, & urinae difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in vino. Recens radix apposita, partum extrahit: puerperis eius decoctum in desensionibus prodest: in diapsmata utiliter inseritur, incundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculorum inflammacionibus, mammis tumentibus à partu, ægypsiis incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta. CAP. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa, & hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa verò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat: vrinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibove:
let

lethaliū medicamentorū antidotū est, si se-
men ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia
per se præsumpta, aut cum nuce iuglande, aridisq;
ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra
serpentes simili modo sumere conuenit: gemituram
cibo potūve extinguit: cum anetho sicco decocta,
tormina sedat. Facit ad pectoris laterūque dolo-
res, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflam-
mationem, coxædicū articulorūque cruciatus,
& horrores febrium circuitu repetentes, pota ut
antè dictū est. Item ad inflationes coli, vuluæ, re-
ctique intestini, cum oleo decocta, & infusa. Fœ-
minas vuluæ strangulatū liberat, si à genitali, se-
de tenus cum melle subijciatur. Feruefacta ex oleo,
& pota, ventris tineas excutit: articularijs dolo-
ribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illini-
tur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad
dimidias partes, & oblita. Cruda conditāque ci-
bo, visus aciem excitat: dolores oculorum illi-
ta cum polenta lenit, doloribus capitis cum rosa-
ceo, & aceto illita auxiliatur, profluentem nari-
bus sanguinem sistit trita & indita, testinū inflam-
mationibus cum laureis folijs imposita, & eruptio-
nibus papularum cum myrto, & cerato prodest.
Cum pipere autem, vino, & nitro affricta, albæ vi-
tiligini medetur. Cum eisdem illita fornicationes
tollit, & verrucas, quæ thymi florem represen-
tant: contra impetigines cum alumine, & melle
utilissimè imponitur. Succus in mali pumici caly-

ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum feniculi succo ac melle peruncti iuantur: ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum acetos, rosaceo, & cerusa persanat: mansa, alliorum caparumq; acrimoniâ domat. Montana, si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam unctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis inspersum feles arcere. Adciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, vipersis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam vrina totum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum montanum vocatur. Sylvestris ruta sativæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicium doloribus: menstrua movet, partus enecat. Acrior est viribus, quàm hortensis, & validior. Sylvestris, vi pote noxia, cibis abdicatur.

Sylvestris ruta. CAP. XLIIII.

Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asia finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò, quàm alterius ruta longioribus, tenerioribusq; odore gravi: flo-

e candido: capitulus in cacumine paulò maiori-
 us quàm sativæ rutæ, quæ tribus maximè parti-
 us constat: in quibus triangulum semen, subru-
 um, gustu amarum recluditur, cuius est vsus. Se-
 nen autumno maturescit: quod cum melle, vino,
 roco, & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur
 contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-
 nalam vocent, Syri besasan. Qui Cappadociam
 incolunt, moly, quoniam quandam cum moly ser-
 iet similitudinem: radice nigra, flore candido. In
 collibus, & lato solo provenit.

Moly. CAP. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, humi spar-
 sa: florem albæ violæ similem, sed minorem,
 ac magnitudine violæ purpureæ respondentem, la-
 teli coloris: caulem candidum, quaternum cubito-
 rum, in cuius cacumine inest aliquid, quod ally spe-
 ciem referat. Radix parva, bulbosa, quæ mirum in
 modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cū iri-
 no unguento, in pessō subijciatur.

Panaces. CAP. XLVI.

Panaces nonnullus heracleum dicitur, ex quo
 opopanax colligi solet. Plurimum in Boeotia,
 & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compendy,
 & questus, qui ex eo liquore factitatur, gra-
 tia studiose colitur. Folijs est asperus, in terra ia-
 centibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea ac-
 cedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: caue-
 le, ut ferula, altissimo, qui lanugine quadam in-

canescit, folijs etiam minutoribus obsitus, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruienti: radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mersibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; , siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, interne albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, levis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera: sed synceri experimentum est, si digitus in aqua friatus resoluitur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq; , vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur: mentes trahit, factum enecat, inflationes, quæ vuluam malè habent, duritiasq; , ex melle dilutus, discutit:

tit: ischiadici illinitur, acopis & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum vna passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, cauis indutus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax est, nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absynthio sumptum, menses pellit: cū aristolochia, prodest aduersus animalia quæ venenum ei aculantur, & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepii. CAP. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuē, cubitalem, geniculatum, circa quem folia feniculi funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq; odorata: in cacumine umbella, vbi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocāt, alij cumilam, de qua in origani mentione diximus.

Panaces chironium. CAP. XLVIII.

Panaces Chironium, in Pelio monte maximè prouenit: folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non aliè demittitur, gu-

stu acris. Pota radix serpentium veneno resistit.
 Illita coma, eadem præstat.

Ligusticum. CAP. XLIX.

Galens Li **L**igusticum, quod alij panaceam, alij panaces
 byziticum. vocant, plurimum in Liguria nascitur, in
 monte Apennino, Alpibus contermino: unde no-
 men traxit. Panaces incole non ab re appellant:
 quoniam & radice & caule, heracleotico panaci
 simile sit, & viribus eisdem præditum. Gignitur in
 altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maxi-
 * *παρά τοις μένερδ ** iuxta fluentia. Cauliculum fert anethi,
ἀνέθου geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertule
 id est, iuxta campanæ, molliora, odorata, prope verticem gra-
 fossas. ciliora, & longè magis diuisa: in cacumine musca-
 rium, in quo semen dependet nigrum, solidum &
 oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, &
 aroma olens: radix candida, heracleotici panacis
 similis, odorata. Radicis seminisque vis excalfacto-
 ria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tu-
 mores, cōcoctiones. Item ad inflationes, præsertim
 quibus stomachus turgeat: & contra serpentium
 ictus: urinas & menses potu trahit. Eisdem præ-
 stat effectus apposita radix. Semen cum radice
 oxyporis & medicamentis decoquentibus admi-
 scetur: ori perquam utile: quare pro pipere vtun-
 tur eo indigenæ, ad obsonia. Adulteratur semine
 quodam simili, quod facile gustu discernitur: ama-
 rum enim est. Alij semen fœniculi aut seselis admi-
 scentes, ligusticum dolo vitiant.

Part

Pastinaca. CAP. I.

PASTINACA sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceum accedente: radix digiti crassitudinis, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos vrinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit: serpentium morsibus ictibusq; prodest: praesumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit: venerem stimulat, partus apposita eicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedaenas vlcerum purgant. Satiuæ ad eadem pollet, efficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli. CAP. II.

SESELI Massiliense folia fœniculi habet, crassiora Recentiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in ribus Siler qua semen oblongum, angulosum: degustanti stimulantium, tim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: potu stranguriae & orthopnoeæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanant. Semencum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile, & contra perfrictiones in itineribus, cum pipere
& vin

& vino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos foetus emittantur. Aethiopium seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suavi. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus prædictum est: nascitur in asperis, riguis, & collibus: in-

* in idæ, uenitur & * in insulis.

id est, in Creticum seseli. CAP. LII.

Idæi monte. **T**Ordylum, quod aliqui Creticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinae difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis, caulisque virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delin-
ctu cum melle.

Sison. CAP. LIII.

Hic omissa **S**ison exiguum semen est, in Syria natum, apio est ab inter simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lieprete describitur vitia bibitur, urinae difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum

cum cucurbita, & aceto, indigenæ vtuntur. In cæcumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LIIII.

Anisum in summa excalfacit, exiccat: oris halitum incundiorem facit, doloris leuamētum præstat, vrinam ciet: aquam, quæ subijt cutem, dissipat, potum sitim colibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba foeminarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumque, fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non surfurosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. CAP. LV.

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, vrinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. CAP. LVI.

Anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac euocat, inflationes & tormina sedat, aluum vomitionesq; sistit, vrinas ciet, singultus * τὸ ἴ lenit, oculorum aciem hebetat, & genituram re= σπέρμα stinguit assidue potum. Foemini vuluæ malo op= καὶ νηρί portunis, ad desefsiones vtile, * condylomata illitus κατὰ πλάε eius cinis tollit. οἶον.

Cum

Cuminum satium. CAP. LVII.

Cuminum satium origratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vna passa, aut loli farina ceratove. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & varibus obiectum, sanguinis profusio sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

Syluestre cuminum. CAP. LVIII.

***Sic quidē** Syluestre cuminū, plurimum efficaciusque in **Græcus:** Lycia & Galatia Asra, atque Carthagine sed rectius ne Hispania gignitur: frutice paruo: dodrantali Marcellus, caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, Galatia A=bus, veluti serratis, & gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satiauo acriore: nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq; item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat, stomacho vtile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vna passa illatur.

naturæ testium inflammationibus, adiectis eisdem
illitum medetur. Est & aliud sylvestris cuminis
genus, satino non dissimile, quod à singulis floribus
promit cornicula in sublimem exserta, in quibus se-
men est melanthio simile: quod potum omnium
serpentium morsibus præsidio est. Calculosis & ijs
qui urinae stillicidio vexantur, aut concretum san-
guinem cum lotio reddunt, auxiliatur sed apud se-
men feruifacitum postea bibendum est.

Ammi.

CAP. LIX.

*ἐνίοι κκεδ

Ammi * Aethiopicum cuminum appellant, ἄμμι.
* plerique hoc natura diuersum esse ab illo * οἱ ἵ βασι
existimant. Vulgò notus est: semen exile, multò mi-
nus cumino, origanum * respiciens. Eligendum est μινον κα-
purum, minimè fursurosus. Vis ei excaustoria, ἄσπις, ἔ-
feruens, & exiccās: facit ad tormina, urinae diffi-
cultatem, serpentium ictus, cum vino potum: men-
strua ciet. Miscetur derodētibus cantharidum me-
dicamentis, quæ ecdoria vocant: ut inde exortis uri-
nae difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tol-
lit, colorem potui aut illiti mutat in pallorem. Sus-
sum cum rui passa aut resina, vulvas purgat.

Coriandrum.

CAP. LX.

Coriandrum, aut corianum, vulgaris est no-
titia, vim refrigeratoriā habens. Quare illi-
tum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ul-
ceribus quæ serpunt, medetur: epynictidas cum
melle vel rui passa, testium inflammationes, car-
bunculosq; sanat: cum faba fresa, strumas & tu-
bero

δαίμον.

bercula discutit: tineas interaneorum expellit* semen cum passo potum, & genituram adauget: largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosore vsu abstinentum. Succus cum cerusa, spuma ve argenti, necnō aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium.

CAP. LXI.

Hieracium magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex internallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex internallis diuisa per ambitum, cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ.] Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in me iudicii, sensu, *κεφάλια μνησνίω παριμφορῶν*. id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autem locus ex Theophrasto ac Plinio, quo Oreoselinon cicutæ folio describunt, hoc modo posse restitui: *φύλλα κωνείω παριμφορῶν*,
id

id est, folia cicutæ non absimilia: quod cum aliis satis aptè cohæret. Velim tamen in hac re, vt & aliis omnibus, suo quæque vti iudicio.

Apium.

CAP. LXXII.

Hortensis apy herba ad eadem, ad quæ co= Nostru Pec
rianum, conuenit: inflammationibus ocu= troselinum,
lorum, cum pane aut polenta illinitur: æstuantem vt colligi= stomachum mulcet: mammarum duritiæ ex la= tur ex no= cte concreto cōtractam reprimat: vrinam ciet, siue tu Pliny.
crudum, siue coctum edatur. Decoctum etus radi= cisque potum, venenorum noxæ resistit, quum vo= mitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehemen= tius vrinam pellit: contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolo= rum leuamenta præstant: iheriacus quoque, ac tussis remedijs. * Eleoselinum in humidis nasci= * Apium offi= tur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreocinarum.
selinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte per cuius ambitum ramuli, * & capi= tula cicutæ, multò tamen tenuiora: semine cumi= ni, oblongo, acri, & odorato, tenui: nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet, semine ac ra= dice in vino potus: menses trahit. Antidotis, nec= non medicamentis vrinam cientibus, & ex calfa= torijs, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis pro= uenit: aliud enim est petroselinum. Petroseli=

r

num in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammi, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admisceatur antidotis vrinam cientibus. Hipposelinum,

* Galenus * Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, Smyrnum. quauis aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, de quo se= ut paulò post referemus. Est autem maius & sa= quenti cap. tiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habentibus Romanis te veluti lineas: folijs latioribus, in puniceum versic dictum gentibus: coma roris marini, florum plena, deperuisse, lib. 2. dentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflo= de Alim. fa rescit: ea semine turget nigro, oblongo, acri, solis cult. tradit. do, aromatico: radix dimittitur odorata, candida nec crassa, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus nascitur. olerum generis, ut apium. Radix cruda coctare estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudæque myria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso vino menses cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrinae stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnum. CAP. LXIII.

Smyrnum, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Cauleni habet apij, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, color

colore in luteum languescente : capitibus caulium
 orbiculatis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo,
 nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita ut al-
 terum aliterius loco cedat : radix quoque odora-
 ta, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis:
 cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbi-
 lus. Nasctur in saxosis, & collibus, atque squali-
 didis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbe, &
 seminis excalfacere. Folys muria maceratis ad
 obsonia vtuntur, alium sistunt, radicem contra
 serpentium ictus bibere conuenit, tusses & ortho-
 pneas mitigat, vrine difficultati medetur: recen-
 tes tumores, collectiones, duritiâsque discutit, illi-
 ta & vulnera ad cicatricem perducit: partus abor-
 tu vitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis,
 renum & vesicæ vitis prodest: menses & secun-
 dus pellit: commodè datur ischiadicis in vino, in-
 flationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus.
 Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra * Intellige
 febrium circuitus.

non corona

Elaphoboscum. CAP. LXIII. riam rosma

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, * aut rimum: sed
 erorimarino similis, geniculatus: folys duum eâ, quæ sin-
 digitorum latitudine, ut terebinthi, prælongis, pliciter hoc
 aliquantum asperis, circumfractis: adnata mul- nomine ap-
 ta habet, ferentia umbellas anethi similes, & se- pellatur. de
 mina eiusdem: florem subluteum: radice ternum qua capit.
 digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, lxx. huius
 candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere libri.

manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere.

Fœniculum.

CAP. LXV.

Fœniculum si herba edatur, aut semen cum ptisana bibatur, mamma lacte replet. Contra decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet: contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur: mensesciet: in febribus nauseam & stomachi feruorem ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandâ oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisque & radicibus prima germinatione incis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, ignique admouent, quò facilius ut calor exudans, gummi remittat, quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippo-

marathrum. CAP. LXVI.

Est & syluestre fœniculum, magnum: ferunt autem semen cächryi simile, cuius radix iuncundè olet, potaque stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrem sistit, radice aut semine potest & contra serpentium morsus auxiliatur, calcu-

lōsq

osq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
tis abundantiam facit decoctum foliorum haustum,
& feminas à partu purgat. Traditur aliud hip-
pomarathri genus, longo, exili, & angusto folio:
semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. CAP. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creti-
cum folijs fœniculo simile, minoribus &
enuioribus: caule dodrantali, umbella coriandri,
lore albo: semine acri, candido, hirsuto, suavisimi
doris in mandendo: radix digitali crassitudine &
dodrantis longitudine adolefcit: in saxosis nascitur,
& locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri
apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis
gustus. Probatissimum Creticum. Tertium as-
signatur genus folijs coriandri, floribus albis, capite
& semine anethi, muscario pastinacæ: semine ob-
longo, ceu cumini, acri. Omnium semen excalfacit:
potum urinam, menses, & partus extrahit, tormi-
nibus liberat, veterem tussim mitigat: phalangio-
rum moribus potum in vino auxiliatur: tumores
illitu discutit. Seminis duntaxat in alijs generibus
inualuit vsus: in Cretico, etiam radicis, quæ maxi-
mè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Delphinium. CAP. LXVIII.

DELPHINIUM, surculos emittit à radice vna
sesquipedales, aut maiores, à quibus folia

exerunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphini-
 norum effigie repræsentant: unde tractum nomen
 est. Flos violæ alba non dissimilis, purpureus: &
 semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud
 utilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt
 enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque igna-
 uos torpescere: semota verò ea, sese recolligere.
 Prouenit in asperis & apricis. Alterum est del-
 phinium, quod Romani bucinum vocant, superio-
 ri simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viri-
 bus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum.

CAP. LXIX.

Pyrethrum Romani saluareem vocant, folia
 caulēque emittit vt daucum syluestre & fa-
 niculum: umbellamque anethi, circinata & rotundi-
 tatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu
 feruidissimo. Pituitam elicit: ideò in dolore den-
 tium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur:
 mansa pituitam extrahit: sudores ciet, peruncto
 ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est
 & contra perfrictiones membrorum, resolutio-
 nēque eximiē conducit.

Rosmarinus.

CAP. LXX.

Dvororismarini genera: vnum fecundū fr-
 giferūque, cuius semen canchrys vocatur:
 folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rota
 speciem, humi sparsa, incundè olentia: caulem cu-
 bitū altitudine, aut maiore, multis concanum alis:

in

in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit: radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferēs latum, nigrum, uti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat, concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Sicca radices cum melle ulcera purgant: torminibus medentur cum vino potæ, & contra serpentium morsus conveniunt: menses & urinas cient, veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quàm herba succus, adiecto melle illitus oculorū aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet, si comitialē malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis & convulsis prodest: podagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur: purgat vitilignes, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-

sci, folijs lactucæ syluestris amaræ asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus author est: potuque idipsum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluiatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

Rosmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, * Commo- * graui odore. Excalfactoria vi præditum est: redius Mar- gium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercellus, cum citationes bibatur: & vbi laborans exercitationi granitate se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinóque vnguento admisceri solet. odorata.

Sphondylium. CAP. LXXII.

Sphondylium folia quadamtenus platani & spanacis habet: caules feniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vularium strangulationi. Veterinosos suffitu reuocat: cum oleo commodè infunditur capitibus phreni-

ticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrasa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula. CAP. LXXIIL.

E Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, coeliacasq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria conduntur. * Ferula itaque caulem profert terminum saepe cubitorum: folia feniculi, longè asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata, sagape codice nonum efficitur.

Peucedanum. CAP. LXXIIII. stro graco, ac antiquis

Peuucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, feniculo similem: comam habet staque Marcel tim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opaci. Tenera radix cultello conciditur, profluensque è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premar, & vertigo sentia-

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etià conereta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusque adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum pencedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitij nervorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vulnè strangulatus, & veternosi renocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ouo assumitur, suspirijsq; & torminibus, & inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absomit, difficiles partus mirè adiuvat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas osium extrahit. In cerata, & calfaciètia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

ANNOTATIO.

* Herba doctis omnibus pro melanthio secepta, foliis fœniculum potius quàm senecionem videtur imitari, vt certè locū hūc esse aut depravatū, aut verum ignorari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

CAP. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, saepe binos drantes excedens: folijs * vt senecionis minus, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, cœu papaueris, oblongo, intercurstantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illitum: circumsarificatos clauos excutit, cum vetere urina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in luteo, & olfactum: urinam & mēstrua ciet, multis diebus sumptū, & lac extrahit, difficultatem spirandi cum vino potum lenat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotū enecare.

Laserp

Laserpitium, & Laser.

CAP. LXXVI.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem masspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excoctat: in cibis egregie concoquitur, vesicae noxia, sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser est radice atque caule scarificatis colligitur. praefertur autem rufum, translucens, myrrhae emulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenai cum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosus reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabae lomento: quod maleficio deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia masspeton vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: canernis den-

tium

stium in dolore inditur, aut cum thure in linteo
circunligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in pos-
sca, os colluitur: ys prodest, quos bestia in rabiem
efferata momorderit, vulneribus immixtum: va-
let aduersus venena telorum, & animalia om-
nia, quæ virus ei aculantur, potum, aut illitum:
scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur:
gangrenis præcoërcitis immittitur: & cum ru-
ta, nitro & melle, vel per se, carbunculus: clauos
callōsque prius circumrasos vellit: cerato aut ari-
dorum sicuum carne præmollitunt, recentes liche-
nas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, po-
lyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio,
aut æruginē illinatur: extuberantia cum forfice
extrahit. Veteribus faucium scabritys opitulatur:
grauem subitoq; irrauescentem vocem, dilutum
aqua, sorbitione confestim expedit: ruam illi-
tum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa
vtilissimè gargarizatur. vescetes eo, latiore colore
mangoniāt: tussi commodè in sorbili ouo datur,
& pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione,
& aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores
discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruo-
rum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli
pondere deuorandum: hærentes gulæ hirudines,
gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus
coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso
proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha po-
tum: celiacos adiuuat, in acino vna sumptum.

CUM

cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptusq; prodest: ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius: cum acetum mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur: eo cum lactucis vititur: exitq; in vicem erucæ. Fertur & altera magdalis in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra nervorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta probe admittitur: menses pellit, sed foetum exanimat, cum hydromelite potum prodest ex vino haustum: serpentium ictibus: olfactum ex aceto, vulnarum strangulatus exiccat, oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

Euphorbium. CAP. LXXVIII.
Euphorbium Libyca arbor est, ferulæ speciem

ciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget: Græcus, in cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, Timolo. omillos ventres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimque è plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocolla modo emicat: alterum in ventriculis concrefcit, atque vitreum spectatur. Eligendum est translucēs, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocolla, & glutini mitione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium respiciat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discit: potius tota die exurit: quare melli collyrijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus: squamas ossium eadem die eximit: verum eo vtentes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum.

CAP. LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metopium vocant. Maxime

xime laudatur cartilaginosum, merum, thuris es-
 figiem præbens, pingue, minimè lignosum, reti-
 nens nonnihil adiecti seminis, & ferula, graui
 odore, neque valde humidum, neque nimis ari-
 dum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniac-
 co. Galbanum excalfacit,urit, extrahit, discutit:
 menses ac partus trahit appositum vel suffitum: len-
 tiginēs aceto & nitro perunctus tollit: denoratur
 ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspi-
 ria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis, potum
 cum vino & myrrha. simili modo sumptum mor-
 tuos partus extrahit: imponitur lateris doloribus,
 & furunculus comitiales, & vuluæ strangulatus,
 & vertiginosos olfactu suscitatur: si uratur, fugat
 nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur:
 serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum,
 necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis in-
 ditum, mitigat: vrinæ difficili prodesse existima-
 tur. Resoluitur ad potiones amaræ nucibus, aqua,
 aut ruta, aut calido pane, mulsæve, aliàs meco-
 nio, cre. vsto, aut felle liquido. Si purgare Galba-
 num. voles, in feruentem aquam demittito: nam
 que cum liquefactum fuerit, eius sordes fluita-
 bunt: quas hoc modo facile separabis: mudo linte-
 raroq; alligatus in fictili aut ærea pyxide ita pen-
 deat, vt imum vasis ne tangat: opertoq; vase in
 feruidam aquam demittito: sic enim syncerum
 veluti per colum eliquescet, & lignosum in linte-
 remanebit.

An

Ammoniacum. CAP. LXXX.

Ammoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, nulla sordis spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phryma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est anhelantibus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur: cruentam urinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. CAP. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

hibet: emplastris inseritur. Adulteratur admiste
gummi.

Glaucium. CAP. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae, quae ad Hieraposa-
lim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati pa-
paueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odo-
ris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Fo-
lia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt in-
digena, usque dum flaccescant, deinde contusis suc-
cum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medica-
menta, ut pote cum inter initia refrigeret.

Glutinum. CAP. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vo-
cant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex
bubulis corijs conficitur, id candidum est, & trans-
lucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum
in aceto, impetigines leprasque: cuius delet: ambustis
igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas
erumpere non patitur. vulneribus prodest, melle
aut aceto madefactum.

Glutinum piscium. CAP. LXXXIII.

Ichthyocolla, gluten piscium, venter est piscis ce-
tacei. Praestat candicans, natione Ponticum,
subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè
liquefcit. Utile emplastris, capitis & leprarum me-
dicaminibus, & tetanothris, quae cutem faciei eru-
gant, & extendunt.

Viscum. CAP. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceu
extra

extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi conc
eperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fru-
icis folio: contusum acinum lauant, & postea in a-
qua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum
fficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & ple-
isque alijs arboribus: quinetiam inuenitur in quo-
undam fruticum radicibus. Emollit, discutit, ex-
rabit: parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones
ad maturationem perducit: cum resina autem, &
era pari, epimychidas in splenio sanat: vetera vl-
era abscessusque, quos cacoethes vocant, ex thue-
re mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio
apide coctum, & impositum absomit: cum san-
laracha, aut auripigmento illitum, vngues ex-
rabit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim
ntendit.

Aparine.

CAP. LXXXVI.

Aparine ramus multis, & paruis fruticat, Vulgò
asperis, quadrangulis, per intervalla orbicu aspergula.
ato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen
durum, rotundum, concavum, album, umbilici figu-
ra, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice-
utuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis, can-
lum, ac foliorum succus, potu contra viperarum
phalangiorumque morsus auxiliatur: infusa au-
rum dolori medetur. Herba cum axungia trita
strumas discutit.

Alyssum.

CAP. LXXXVII.

Alysson exiguus frutex est, unicanis, sub-

asper, rotundus folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latum. in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. contrusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris viris graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vulnæ mammarumq; vlcera, quæ cacoethe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq;: qua fœminæ profusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrēt. flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

Pol

Polycnemum. CAP. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origani caule, ut pulegij, geniculus multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solut debet. Ad vrinae stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

Clinopodium. CAP. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantum altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum praebeant. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochorodons vocant, eijcit, aliquot diebus potum. alium sistit decoctum ad tertias, potumq; , si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum. CAP. XCII.

Leontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, punice coloris: folia brassicae, sed papaueris diuisura: radicibus nigris, rapae similibus, strumosis. nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Misceatur ischiadicorum clysteribus.

Teucrium. CAP. XCIII.

* Chamæ-
dryos.

Teucrium, siue, ut alijs placet, teucriis, herba est virgæ referens effigiem, *trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno, hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vberim prouenit. Recens cum posca, aut arida seruescitur facilius, potu lienem potenter absomit: lienosis cum aceto & ficis illinitur: item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. CAP. XCIII.

Chamædryos Græcis, alijs chamædrops, Latini trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nasctur in petrosis & asperis frutibus. *Plin. colo= dodrantalis, folia habens exigua, amara, *effigie re: quod & diuisura quercus flore paruo, penè purpureo ipsum her= Carpitur semine pregnans. Recens in aqua decocta pulchrè etia. potu tusibus, indurato lieni, vrina difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: citi menses partus extrahit, lienem ex aceto pota consumit: ac uersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est cafacere.

Leucas. CAP. XCV.

Leuca montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato efficacior tamen quàm satina habetur. Vtraque e-

vin

vino contra animalium venena, præcipue marinorum opitulatur.

Lychnis. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis posito: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. CAP. XCVII.

Lilia coronamenti se dedunt, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: seruefacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menses ciet, vlcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervus præcisus, luxatusq; medetur: vitilignes, furfures, & lepras emendat: vlceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici, mutandis testium inflammationibus. Semen potum

morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se=
 *πορφυρᾷ, men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & *ru
 id est, pur=bra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphy=
 purea. lia, efficacissima unguentis nascuntur.

Ballote. CAP. XCVIII.

Vulgò
 Prasium
 foetidum.

BAlloten, nomine alio nigrum marrubium vo=
 cant: caules edit quadrangulos, nigros, sub=
 hirsutos, complures ex vna radice: folijs maioribus
 quam marrubij, hispidis, cingentibus per interual
 *εργυρῶς la caulem, *subrotundis, graueolentibus, apiastrò
 *ρόα i. ro=proximis: vnde aliqui apiastrum eam vocauerunt:
 iudioribus. candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem
 Plinius ni=coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus,
 grioribus: folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia,
 quod magni ut condylomata reprimant: purgant & sordida vl
 arridet. cera cum melle.

Apiastrum. CAP. XCIX.

Melissa of=
 ficinus.

MElissophyllon siue melihana, id est, apias
 strum, id sibi nomen usurpauit, quoniam
 apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia bal
 lotæ, de qua paulò antè diximus, similia es=
 sent, nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta spe=
 ctarentur: citreum malum olent. Folia cum vino
 pota aut illita prosunt contra ictus phalangiorum,
 scorpionumq; item aduersus canis morsum. Deco=
 cto eorundem gratia, foueri prodest: defensionibus
 foeminarum ad ciundos menses conuenit, dentes
 eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundit
 ter. Fungorum strangulationibus folia, addito ni=
 tro,

tro, potu auxiliantur: terminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marrubium. CAP. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat: subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores vericillato ambitu, asperiri. Nascitur propter aedificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspensio, sufficiens, & ad tabitudinem redactus. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsæ sunt: vesicam renesque ledit. Folia cum melle illuntur sordidis vlceribus purgandis: pterygia nomasque sistunt, laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys. CAP. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas

ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet excofacto-
riam & acrem foliorum decoctū potū pellit men-
strua & secundas.

Phyllitis.

CAP. CII.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longio-
ra, & viridiora. sena aut septena, recta, quæ
parte anteriore lania cernuntur, a tergo autē pen-
files quasi vermiculos tennes ostendunt in umbro-
sis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbos:
neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia
in vino pota serpentium morsibus aduersantur:
quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dy-
senteria aut resoluta alius exercet, potui dantur.

Phalangium.

CAP. CIII.

Phalangium à quibusdam phalangites voca-
tur* ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in
Γαβλω λω diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, mul-
τὰν αὐθαρτῶν incisuris habens: semine nigro, lato, ad len-
διαν δισσι. runcule dimidiata figuram, multo tenuiore: radice
* Ita Pli= parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra erui-
mus. Græ. tur. prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos
cui παχύ, cum vino pota, auxiliantur contra scorpionū pha-
id est, cras= langiorumq; ictus: tormina quoq; discutunt.
so.

Trifolium.

CAP. CIIII.

Trifolium, Græci triphylon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocāt.
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, vir-
gas habens tennes, iuncea & nigra, unde ramu-
lares

lares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia: his recenter enatis rui & odor inest: ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem edit purpureum, semen quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus. & his qui aquæ inter cisternæ principia sentiunt, fixinis quoque vulnæ vitio opportunis, auxiliantur: menses ciunt: ternæ drachmæ è semine dari debent, è folijs verò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum fecti dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: quæ autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis, quaternæ, ut quæ februum circuitus discuterent. Radix antidoti inseritur.

Polium. CAP. CV.

DVO genera polij: montanum, cui teuithris nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantulis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alte

1413

rum fruticosus, non usque adeo valens odore, & viribus infirmus. Potum feruifacit ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lien: sis ex aceto: stomachum male habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratum suffumumve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

ANNO TATIO.

Scordii hoc loco depicti vberimus ubique est proventus, ut non iniuria eorum sic explosus error, qui allium sylvestre, aut obuiam quamcunque herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plinio libro 25. cap. 6. autore, aliud quoddam genus latioribus folijs ac mentha stri effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quàm foliorum cum mentha stro similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

Scordium. CAP. CVI.

Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs triisaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustus amaris & adstringentibus: quadrangulus caulibus, subrubro flore. Herba vim ex calfactoriā habet: urinam cit. Cocta recens aridave cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rofiones, dysenteriam, & urine diffi-

difficultatem, binis drachmis cum hydromelite:
 crassamen purulentum pectore expellit. Facit ari-
 de farina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si
 cū nasturtio, melle & resina misceatur in ecleg-
 mate: inflammata modicè præcordia, cerato exce-
 pta, recreat: cum aceto acri aut aqua, podagris cō-
 uenienter illinitur: menses imposita mouet: vulne-
 ra conglutinat: vetera vlcera purgat, & ex mel-
 le ad cicatricem perducit. Sicca excrescentias in
 carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. In-
 ter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;.

Tussilago. CAP. CVII.

Tussilaginis folia sunt maiuscula quàm hede Vulgò vn-
 ra, sex aut septem à radice subalbida à ter- gula cabala-
 ra, supernè virentia, in plures angulos excurrentia, lina-
 caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo-
 nā cum caule confestim exiit: inde nonnulli
 his vacare existimauerunt. Radix tenuis est &
 superuacua: nascitur in amœnis & riguis. Folia
 ex melle trita igni sacro & omnibus inflamma-
 tionibus illitu medentur. Aridæ fumus per insun-
 dibulū hianti ore raptus, hos sanat, qui sicca tussi
 atque orthopnoea infestantur: pectoris vomitus
 rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix.
 Decocta in hydromelite, & pota emori uos partus
 eycit.

Artemisia. CAP. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis nas-
 citur, absynihij modo fruticosa, maioribus
 & ping

& pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem generis duo. Vnum latius habitiusq; folijs virguq; latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellāt, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scæte tenuibus, flauo colore: hæc incūdiorem quā præcedens effiat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres desessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos cōminuunt: remorata mtriam cient: menses pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia. CAP. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs ruta, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquā partem incumbunt.

Botrys. CAP. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem odorem

odorem spirat:quare vestimetis interponitur:inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneas mulcet. Hæc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium.

CAP. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quædrachmæ pondere in vino pota, vulue inflammationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in binas vultus summis alis sursum spectantia gruum capitula gò. insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullus in medicina vsus.

Gnaphalium.

CAP. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Typha.

CAP. CXIII.

Typha folium edit * cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in ea quam lib. cumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculâ aliqui nominat. Huius herbe vocant. flos suillo adipe eloto exceptus, ambustus medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

Circea.

CAP. CXIIII.

Circea, quam & dirceam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdâ veluti corniculis: dodrâti radice, triplic

plici ferme aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nasctur in apricis, saxis, & vento
perflatu. Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulus expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mammas nutricu explet.

Oenanthe. CAP. CXV.

Videtur no-
stra Filipē-
dula.

Oenanthe folia habet pastinacæ: florem can-
didum: caulem crassum, palmi altitudine: se-
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotun-
da capitula extuberantem: nascitur in petris. Cau-
lus eius & folia, cum mulso vino pota secundas ey-
ciunt. Radix è vino, vrinae stillicidio conuenit.

Conyza. CAP. CXVI.

Vulgò puli-
caria.

Conyzæ duo genera, quæ parua vocatur, odo-
re præstantior est: maior verò frutice altior
& folijs latioribus, graui odore. Viriusque folia
oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis bi-
nūm cubitorum altitudine attollitur, in minore
pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subama-
rus, qui in pappum abit: radices superuacua. Suf-
ficiu substraiūq; frutex totus serpentes fugat, cu-
lices abigit, & pidices necat. Folia conuenienter
illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vul-
neribus. Flores & folia cum vino ad menses par-
tusq; eyciendos bibuntur: item contra vrinae stilli-
cidia, arquatū morbum, & tormina: comitiales
pota ex aceto adiuvant. Decoctum in desessioni-
bus medetur vuluæ malis. Impositus succus abor-

tum

tum facit. Ex oleo efficaciter horroribus * obli- * ἡ νόσος.
nitor. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est &
tertium conyzae genus, caule crassiore, ac molliore:
folijs mediae inter maiorem ac minorem ampli-
tudinis, minimè autem pinguibus: multò graui-
oris hæc est odoris & iniucudioris, sed inefficacior.
Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue liliū syluestre.

CAP. CXVII.

Hemerocallis folium & caulem habet liliū,
porraceo colore: flores in caule per singulos
exortus, terni aut quaterni erumpunt, liliū diu su-
ra, quoties dehiscere cœperūt, colore perquàm pal-
lido: radix magna est atque bulbosa: quæ pota,
aut cum melle & lana in pessa apposita, aquam
educit & sanguinem. Folia trita mammarum in-
flammationes à partu cōtractas, oculorūque col-
lectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis
utilissimè illinuntur.

ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes, al-
bam significat violam: solet tamen & pro lu-
tea, cœrulea ac purpurea vsurpari. Nunc of-
ficinis Arabum ferè sequacibus, Cheiri num-
cupatur.

Leucoium, siue viola alba.

CAP. CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus
differentia quedam: nanque aut cœrulei, aut

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea
verò præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores
feruefacti in defensionibus, valent cōtra vuluæ in-
flammationes, & menstrua expellunt: sanāt oris
vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Se-
men duūm drachmarum pondere ex vino potum,
aut cum melle inditum, menses, secundas & par-
tus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem re-
primunt, & podagricos iuuant.

Cratægonum. CAP. CXIX.

Videtur ge- **C** Ratægonū, siue, vt alijs placet, cratægonon,
nus Persi= folijs melampyro simile est, multis calamis
cariæ, non ex vna radice emicantibus, multorumque geniculis
maculatis. lorum: semine milij: nascitur magna ex parte in
opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum
est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die
post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ
duobus mulier, ante conceptum quadraginta die-
bus: & vir modo consili, totidem diebus ante
coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. CAP. CXX.

Phyllum, quod & elæphyllon vocatur, duūm
generum est: quod autem thelygonum appel-
lant, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed
magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili:
florem album profert: semen papaueris maiuscu-
lum. Sed arrhenogonum, cetera huic simile, so-
lo fructu distat: habet enim racemosum quiddam
deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon
potu,

potu, masculi sexus facere partus, ut thelygo-
non fœminei, proditur. Horum Crateus author
est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse
visum est.

Testiculus. CAP. CXXI.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, Officinis
folijs circa imam cav'is partem in terra falso saty-
strais, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, de quo
ribus, lenibus: caule dodrantali: floribus purpureis. Seq. cap.
reus: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angu-
sta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: in-
feriore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices
coctæ, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri,
mares generari dicuntur: si minorem femine,
alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mu-
lieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coi-
tus: aridam verò, ad inhibendos: & alterum
alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sa-
buletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea
authore vocatur, quoniam radix ad multa utilis
sit. folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus,
ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus
penè purpureis, radice testiculi simili: quæ illita
tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem
non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflamma-
tiones lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sa-
nantq; putredines, & oris vlcera cacoethe: aluum
sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testicu-
lo canis, produntur.

Satyrium. CAP. CXXII.

Satyrium aliqui trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam intus ut ouum, candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam: quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum ea dum concumbendi incessit cupiditas, siquidem ea proniores ad venerem fieri affirmant. Est & alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat: eoque magis, si bibatur in vino.

Horminum. CAP. CXXIII.

Vulgò Gal-
litricum.

Horminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemæas albuginésque, & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam ex-
trahit

trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illi & herbæ. Sylvestre magis viribus pollet: quare unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CXXIIII.

HEdysaron, quod unguentarij pelecinum, id est securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasctur in segetibus & hordeis.

Onosma. CAP. CXXV.

Onosma, * oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum, & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur longa, tenui, infirma, rubescente: gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Prægnans, si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

Nymphæa. CAP. CXXVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagnantibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat: nigro semine, denso &

lato, lenti gustus: caulis est levis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum vino pota coeliacis, dysentericisque auxiliatur & lienem absumit. Radix stomachi ac vesicæ doloribus illinitur, vitilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitaléque infirmitat. Idem semen potum efficit. Nymphaea nomen sibi vendicasse videtur, quoniã aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Amygro amne, & in Bœotia Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antè dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ similis. Huius semen & radix, contra foeminarum profusua efficaciter ex vino bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII.

Androsaces herba est amara, tenues spargens uncas, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini potio, & herbæ decocto: podagris vitiliter illinitur.

Asplenium. CAP. CXXVIII.

Ceterach
officinæ.

Asplenium, aliqui scolopendrium vocant, alij splenion, alij hemionium, folijs est multis, scab

scolopendræ animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet: folia * filicula modo diuiduntur, subter flaua = * Polipodiu. scentia hirsutaque, supernè viridia. Vim hanc habent folia in aceto feruesacta, vt per dies quadraginta pota, lienem absument: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

ANNOTATIO.

Ruellio & Fuchsio lingua ceruina nunc appellata: quam alii, minus rectè fortassis, Phyllitida suspicantur, de qua supra Capite CII.

Hemionitis. CAP. CXXIX.

Hemionitis, quam aliqui splenion vocant, filium emittit dracunculi, lunæ modo incuruum: radicibus coheret multis, tenuibus: nūquam flores, neque semen, neque caulem gignit: in petrosi nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Anthyllis. CAP. CXXX.

Anthyllis duplex est: quedam enim lentiissima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in albis terris, & à sole illustratis, non in fulso gut

* Chamæstis. Altera est folijs ramulisque aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichory. Pota drachmis quatuor vrinæ difficultati, renibusque plurimum prodest. Trita, vulnæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte imposita, vulneribus medentur. Quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Officinis **A**nthemidis genera tria, tantum flore dicamomilla. **A**stantia: rami dodrantes, fruticosi, alius Cuius non multis concaui: tenuibus foliolis, paruis, numero minimum variis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, rietas ab inforinsecus orbiculato ambitu candidis, melius, terprete oportet aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ: nascitur in asperis, & iuxta semitas: colligitur vere. Vim habent radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandique: potu, & in fessione, pellunt menstrua, partus, vrinam, calculosque: aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinerum vitia sanant: decocto earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est: hanc propriè heranthemon vocant. Ea, cui leucanthemon nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehementius vrinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur: commanducata ulcerum eruptiones in ore sanant.

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in farinā, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim trita, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars vna, modò contra floris partes duæ & herbæ vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium.

CAP. CXXXII.

Parthenium aliqui amaracon vocant, folijs est Vulgò *macori andri*, tenuibus: flore per ambitum albo, *tricaria*. intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatum, cū aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; *epithymum*, & bilem & pituitā detrahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia uuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Non sunt sequendi, qui *Cotulam* fœtidam vulgò dictam pro hoc obtrudūt. Nam præter quàm quòd folia illius nullā aut saltem paruam cum *fœniculo* habeant similitudinem, flos eius non totus luteus (quod in illo tamen requiritur) sed per ambitum albus, ac intus tantum luteus cōspicitur: quod haud dubiè *Dioscordies*, si *Cotula* illa ve-

rum esset Bupthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. CAP. CXXXIII.

Bupthalmum (quidam, *ophthalmum* vocant) tenuis
emittit cauliculos, mollésq; folia fœniculi: lu-
teum florem, anthemide maiorem, oculi similitu-
dine, vnde nomē traxit: circa oppida nascitur, &
in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores
duritiâsq; discutunt. Aiunt epotam post exitum à
balneis, regio morbo correptis, colorem tractu tem-
poris reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus *pen-
thoron* dicitur: sunt qui idæos *dactylos* ra-
dicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesqui-
pedis adolescit, comitantibus multis stolonibus.
Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet:
in fœmina verò, *smyrnij* more diuiduntur. Sum-

**Amygdalo* caule filiquas emittit, veluti* græcas nuces:
las intelli- in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra,
ge. acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in me-
dio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix ma-
ris [tenuis] digitali crassitudine, & palmi longi-
tudine, gustu adstringens, alba: fœminæ radici-
bus cœuglandes circiter septem aut octo inherēt,
vt in hastula regia. Fœminis à partu non purgas-
tis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ ma-
gnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

ANX

auxiliatur. Valet contra regium morbum, & reum, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximit. Grana nigra auxilantur suppressionibus nocturnis, vulvæ stranguitionibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. CAP. CXXXV.

Lithospermum à seminis duritia nomen accepit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, lium solis. mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulus rectus, tenuibus, firmis, crassitudine acutiunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Vim hanc habet, ut semine cum vino albo potio calculos frangat, pellatq; urinam.

Phalaris. CAP. CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit & æ culmis similes, à minutis ac nullius usus radicibus, multos duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficacæ

ficax est.

Rubia.

CAP. CXXXVII.

Hodie Ru- **E** Rhythrodanum* radix rubra est, quatingu-
bia tincto- tur lanæ. Vna sponte provenit, altera ser-
rum. tur,*vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italia

* ῥυθρόδανον in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur
δακρυον. Hanc non sine quæstu serunt: nanque maximū
υιοι ἡ τὸν, ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & qua-
θριον καλῶς dranguli, longi, aparina non dissimiles, robustio-
σι. res, & multo prorsus maiores: folijs per interval-

* ὥς ἐν θαλάσῃ la certa circum articulos, stellatim decussatis. Se-
βαινὰ ὅτι γὰρ men eius rotundum, inter initia viride, mox ru-
γισαίας. brum, postea cū ematuruit, nigrū: radix tenuis

longa, rubra. Vrinā ciet: qua de causa regio mor-
bo opitulatur, pota cum aqua mulsa: item ischiadi-
cis, & resolutis. Crassam copiosāq; urinam pel-
lit: nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen
quotidie lauare oportet, & excrementorum qua-
redduntur differentiam spectare. Aduersus serpen-
tium morsus, ramulos cum folijs vino bibere pro-
dest. Semen ex aceto potum, lienem absūmit. Imposi-
ta radix trahit partus, menses, secundasque. Al-
ba vitiligni, illita ex aceto medetur.

Lonchitis.

CAP. CXXXVIII.

L Onchitis folia habet porri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in
terram procumbentia, pauca in caule, in quo flo-
res, ceu galericuli, hiantibus comicis personis si-
miles, nigri, & è rictu albam exerentes velut lin-
guam,

am, quæ ad labrum inferius spectet: semen in-
 lucris clausum lanceæ simile, triangulum: unde
 cognomentum arrogavit: radix dauci. Nasci-
 tur in sitientibus, & asperis. Radix ex vino pota
 inam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui
 peram lonchitin dicunt: folia scolopendri emit-
 sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa.
 vulneribus mirum in modum prodest, in eusq; in-
 flammationes excitari non patitur. Pota ex ace-
 lienem absument.

Althæa.

CAP. CXXXIX.

Vulgò Bif-

Althæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue-
 malua, &
 strium maluarum genere est, cui folia vt Maluani-
 clamino, rotunda, lanugine canescunt: flore ro-
 scus.
 iceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. * Ab ἀλθαία
 Althæa appellatur, quòd inter primas sit vti=vw, quod me-
 is, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim deri signi-
 n vino aut aqua mulsæ, & per se cum imponitur ficat.
 usa, efficax est contra vulnera: item ad strumas,
 parotidas, abscessus, mammarum inflammatio-
 nes, fracta sedis, inflationes, neruorum rigores: si-
 quidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicæ-
 tricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto suillo
 adipe aut anserino, terebinthinæve, vt malagma-
 tus lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præ-
 clusionesque, in pectus subdita. Decoctum eodem
 fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasque à par-
 tu extrahit. decocta * succus ex vino potus, suc= * τ πῖς.
 currit vrinæ difficultati, calculosorum cruditati-
 bus

bus, dysentericus, ischiadicus, tremulis, ruptis: den-
tium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto
inde ore. Viride semen siccumq; tritum, vitilignes-
cit. *Quò dicitur.* in sale * perunctis emendat: eodem cum oleo &
aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet
contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq;
profluvium. In posca autem decoctum bibitur,
contra omnes vesparum, apum, similitumque acu-
leatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, &
igni ambustus illinuntur. Constat aquam, trita ra-
dice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

Herba Si- **A**lcea sylvestrium malvarum generi assi-
meonis vul gnatur: folia habet diuisa, verbenace pro-
gò. xima. caules tres aut quatuor, cortice cannabino
vestitos, florem rosæ, paruum: radices albas, latas,
quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cū
vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisque meden-
tur.

Cannabis.

CAP. CXLI.

Cannabis sativa plāta magni in vita vsus ad
robustissimos funes faciendos: folijs fra-
xini, graui odore: caulibus proceris, inanibus:
semine rotundo, quod largiore cibo genituram
extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter au-
*Fortè eu- rium doloribus instillatur. * Sylvestris cannabis
patorium virgas fert alihææ similes, minores, nigriores, &
vulgatum. asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio sa-
tiua, nigriore & asperiore flore lychmidis, subru-
bro:

o: semine & radice althææ. Decocta radix, illitu
 inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos arti
 culorum dissipat. Huius cortex torquendus funibus
 commodatus.

Anagyris. CAP. CXLII.

A Nagyrus * frutex est arboris instar, per = * οἰ ἡ ἀνὰ
 quam grauis odore: folijs * agni, virguq; flo γυγυρ. οἰ
 brassicæ: semen in siliquis non breuib; gignit, ἡ ἀκοπορ
 brotundum, firmum, versicolori facie, simile re = καλδοι.
 bus, quod dure scit vna maturescere. Tenera fo * viticis.
 a trita tumores illitu reprimūt. si partus h. ereat
 & secunde mensesq; morentur, drachmæ pondere
 ibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & con
 tra capitis dolores in vino. Difficulter parientibus
 dalligantur, ita vt à partu statim auferantur.
 radice cortex concoquendis discutiendisque adhi
 etur. Semen commanducatum vomitiones rebe
 nenter ciēt.

Cepæa. CAP. CXLIII.

C Epæa portulacæ similis est, sed nigriora ha
 bet folia, & radicem tenuem. Foliam vino
 ota, vrine stillicidio, & vesicæ scabie laboranti
 us, opitulantur: maximè id præstat, si cum deco
 to radicum asparagi eius, quæ myacanthon, hoc * Vulgò plā
 st, corrudam vocant, bibatur.

tago aqua
 tica.

Alisma. CAP. CXLIIII.

A lisma, * aliydamafonion appellant: folia ei * Vox ex
 plantaginis, nisi angustiora essent, * laci = Plin. adie
 uosa, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, cla.
 cub

cubito altiore: capitibus thyrſi: flore tenui, candi-
do, pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri ni-
gri, acribus, odoratus, modicè pinguibus: aquosos
amat tractus. Radix, ſi drachma vna aut altera
bibatur, huſ conuenit, qui leporem marinum de-
uorant, aut à rubetis ranis demorſi ſunt, aut
opium hauſerunt: torminibus atque dysenteria,
per ſe, aut cum pari modo ſeminis dauci, potui da-
tur. Conuulſis, & contra vitia vuluæ prodeſt. Her-
ba ſiſtit aluum, menſtrua pellit, tumores illita mi-
tigat.

Onobrychis. CAP. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora pau-
lò: caulem dodrantalem: florem puniceum:
radicem parua: naſcitur in vliginoſis & incul-
tis. Herba ſuapte vi, ſi trita illinatur, tubercula
diſſipat: cum vino pota, ſtrangurias ſanat: illita
ex oleo, ſudores mouet.

Hypericum. CAP. CXLVI.

Noſtra **H**ypericum alij androſemon, alij corion, alij
Perforata. **H**chamæpityn appellant, quoniam ſemen odo-
re reſinam imitatur, ſurculaceo frutice, dodran-
tali, ſubrubro, folio rutæ: flore luteo, qui di-
gitis tritus ſanguineum ſuccum remittit, qua ex
cauſa androſemon cognominatur: ſubhirsuta ſi-
liqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudi-
ne: ſemine intus nigro, reſinoſi odoris: gignitur
locis cultis & aſperis. Vrinam ciet, menſtrua pel-
lit appoſitū: tertianis, quartanisque cum vino po-
tum

tum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambustis sanant.

Ascyron.

CAP. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubetesq; folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmum vocauere. Vsus seminis ad ischiadicos, potū in hydromelitis sextario: nam bitiosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANNOTATIO.

*Vinoso succo.] Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius διυώδην, sed potius αἰματώδην, vti capite de hyperico, legisse videtur: quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius libr. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum.

CAP. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis, & folijs rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita* vinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq;: circa quas, flores pu-

filii, lutei: & in calyculis semē papaveris nigri, in
signe lineis. Huius comatrita resinofum odorem
reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum,
biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximē
medetur sed à purgatione aquam exorbere oportet.
Herba ambustis illita medetur, vulneribus san-
guinem cohibet.

Coris.

CAP. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutere
est folio erica, rubro, pinguiore, ac minore,
non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum
semen menses trahit, & urinas: contra phalangio-
rum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos: ex vino
potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opi-
sthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino
decocta potaque, defectis operis ferre creditur: sed
laborantem inter potandum quā optimē cooperari
licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua
re pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys. CAP. CL.

Vulgo Ina
arthritica.

Aiuga herba in terra repens: * incurva si-
milis: folijs sempervivi minoris, multò te-
* minoribus, hirsutis & pinguioribus, circum ra-
* i. sub- mos * densis, odore pinus flore tenui, luteo, vel can-
curva. dido: radice cichorii. Folia septem diebus in vino
* wuaa, pota, regio morbo medentur: & quadraginta die-
id est, fre- bus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur
quentibus. peculiariter urinae difficultatibus, iocineris, &
renum vitis: torminosi profunt. Ea apud Hera-
clo

cleam Ponticam, perinde atque antidoto contra
aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedi-
cta illinitur, cum polenta iure decocti subacta: tri-
ta in farinam & cum fico in pilulis sumpta, aluum
emollit: excepta melle, cum æris squama & resina
deijcit: apposita ex melle, vulnæ vitia extrahit:
mammarum duritias discutit: vulnera glutinat: vl-
cera quæ serpūt, cum inelle illita, cohibet. Alterum
est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ spe-
ciem incuruatis, prætenubus, coma supradictæ: flo-
re candido: semine nigro: hæc etiam pinum redolet.
Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, ala-
bis, pilosis: caule aspero, candido: luteis floscu-
lis, semine iuxta alas. Resipit & hæc pi-
num. Hæ duæ vim superioris ob-
tinent, sed non vsque
adeo efficacem.

* *
 *

TERTII LIBRI
 FINIS.

2.

PEDANII
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,
Liber IIII.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



Ribus autè libris, amantissime
Aree, tradidimus odorama-
nta, olea, arbores, vnguenta, anima-
lia, frumenta, olera, radices, suc-
cos, herbas, seminaq; In ~~h~~ au-
tem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ re-
stant, herbis.

Betonica.

CAP. I.

Cestron psychotrophon vocitatur, quoniam
frigidus locus inueniatur. Latini betonicam
appellant. Herba est, caulem ferens tenuem, cu-
biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia
quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odora-
ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,
semen veluti satureiæ spicatum inest. Decerpta
huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi-
cibus nititur, vt veratri, tenuibus. Quæ ex hy-
dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo-
cant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieri-
bus

bus vuluæ malo opportunus, & ad laxandos vteri
 strangulatus, denarij pondere cum hydromeli-
 te: tres in vini sextario drachmæ, contra serpen-
 tium morsus ebibuntur. Herba magna vtilitate
 illatis à serpente vulneribus illinitur: aduersus
 etiam venena drachma ex vino pota conuenit: præ-
 sumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit: vri-
 nam ciet: aluum subducit: medetur comitialibus
 & insanis, pota ex aqua: & iocineris lienisq; vi-
 tijs, drachmæ pondere in aceto mulso: concoctionem
 adiuvat, si quis eam fabæ magnitudine secundum
 cœnam cum melle cocto deuorarit: modo consimili
 acida ruclantibus propinatur. Stomachicis eam
 manducare & succum deuorare proderit, si postea
 dilutum vinum sorbeatur. Datur sanguinem ex-
 creantibus, tribus obolis, cum diluti vini egelidi
 cyatho: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus, ex
 aqua: aquæ inter cutē binis drachmis ex hydrome-
 lite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio mor-
 bo laborantes recreat, menses pellit, drachmæ
 pondere cum vino pota: aluum purgant dra-
 chmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem cya-
 this. Facit cum melle ad tabem & purulentam
 excreationem. Folia sicca tritaque fictili vase re-
 conduntur.

Britanica. CAP. II.

Britanica aut vetonica, folia habet sylue-
 stris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gu-
 stu adstringentia: radicem tenuem & breuem:

caulem paruum emittit. Folij exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiã ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

LYfimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessa sanguinis profluuio subuenit, si nares ea herba obturetur: vulnorum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

CAP. IIII.

Nunc Centi
modia.

Polygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculus cinctos, qui per terram, vt gramen, repunt: folia ruia, sed molliora longioraq: semine sub omnibus folijs turgescente: inde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam aperit & ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus

sus auxiliatur, daturq; in febris per horam ante
 significationes: foeminarum profluvia impositu si-
 stit: idem succus purulentus auribus *instillatur. *ηγεῖ τῶν
 Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino, ad ὠτὰ λυγία.
 iecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis
 reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sa-
 cris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vul-
 neribus folia illinuntur. Sanguinaria femina fruti-
 cat vno caule, arundini teneræ simili, densis geni-
 culis, & in se tubarum modo factis: articulos in or-
 bem cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radicis
 nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spissan-
 di refrigerandiq; natura, ad eadem valens, sed inef-
 ficacior.

Polygonatum. CAP. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice Vulgò sigil-
 cubito altiore: folijs lauri, latioribus, & leuioribus Salomo-
 ribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum qua-
 dam adstrictione: flores per singulos foliorum exor-
 tus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à
 radice supputatione: radicem habet albam, mol-
 lem, longam, crebro geniculatam, densam, graueo-
 lentem, digitum crassitudine equantem: quæ vul-
 neribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas
 in facie delet.

Clematis. CAP. VI.

Est quæ La

Clematis humi serpit: lato, pinguiq; solo pro-
 tinit Vincæ
 uenit, viticulas spargens crassitudine iunci peruincam
 exiguas: folio lauri figura & colore, multò mino-
 vocant.

Flammula
vulgò.

ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia & dysenterias sedant: subdita in pecto cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentium morsibus, iuuamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opistulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis, quæ viticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilémque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Polemonia.

CAP. VII.

Polemoniam alij philateriam, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: folijs paulò quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut *sanguinariæ proximis, quibus in summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, *Struthio. te, *radiculæ simili: nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus vrinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: eumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

AN

ANNOTATIO.

*Flores lutei.] Ne moueâre sicubi fortè,
vt nos plerisque locis, candidis floribus con-
spexeris: solent enim pro loci varietate in
vna eademqne herba flores non rarò com-
mutari: id quod Dioscorides etiam in Atra-
stylide, ac multis aliis plantis fatetur.

Symphytum, siue alus.

CAP. VIII.

Symphyton petræon, id est alus, nascitur in pe-
tris, ramis tenuibus, paruis, origano simili-
bus: capitulis thymi: *sirculosum totum, odo- *Ita Plin.
ratur, gustu dulce, salinam ciens: longa radi- Græcus
ce, subrufa, digitali crassitudine. Decoctum in ξυλῶδης,
aqua mulsæ & potum pulmonis vitia purgat: san- id est, ligno
guinem reiciantibus, & renum malis, ex aqua sum.
datur: ad dysenteriam, rubraq; fœminarum pro-
fluuia, in vino decoctum: ad conuulsa verò & ru-
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commandu-
catum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vul-
nera recentia enterocelasq; conglutinat, & illitu
cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coa-
lescent. Est & alterum symphyton, quod ali- Nunc Con-
qui pecton vocant: id caulem emittit bicubitalem, solida ma-
aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt son- ior.
chi inanem, circa quem breui interuacante spa-
tio, folia exeunt angusta, buglossa proxima, ob-
longa, hirsuta: caule secundum angulos quosdam
striato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeuntia

bus, in quibus* flores lutei, & circa caulem velut
verbasci semina emicant. Tam caulis, quam folia,
aspera lanugine horrent, tactuque pruritus con-
citant: radices demittuntur: foris nigrae, intus can-
didae, viscosae: quarum est usus. Tritae & potae cruen-
tis excreationibus, ruptisque proficiunt, recētia vul-
nera illitae cōglutinant: carnes quoque, si cōcoquan-
tur, cogunt additae: inflammationibus, praesertim
sedis, cum senecionis folijs utiliter illinuntur.

Holostium. CAP. IX.

Holostium herba est pusilla, tribus quatuor-
ve digitis supereminens extra terram, folijs
viticulisque coronopo aut gramine proximis, gu-
stu adstringentibus: radice alba, praetenui usque in
capillamenti speciem, longitudine quatuor digito-
rum: nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad ru-
pta, in vino potae: nam & carnes coguntur, deco-
ctionibus addita.

Stoebe. CAP. X.

Stoebe vulgaris est notitia: cuius semen & fo-
lia stringunt: quapropter decoctum dysente-
ricis infunditur: auribus quoque purulentis instil-
latur. Illita folia oculis ab iclu cruentis prosunt, &
erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum. CAP. XI.

Clymenum caulem fert fabae, quadratum: fo-
lia plataginis, folliculis supra caulem in sese
inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhis. Proba-
tissimum est e montibus. E frutice toto cum ra-
dice

dicte succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coliacos, rubraque foeminarum profluvia, refrigerando infranat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut filiquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum. CAP. XII. Vulgò Caz

Periclymenum simplex fruticat, ex intervallis prifoliū, & parua folia habens, ipsum amplectentia, sub= Matrisyl= candida, hederacea: inter folia furculi exeunt, in ual= quibus bacca, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nasceitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis, propter asidentibus. Semen eius postquam ematurrit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absorbit, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur: perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus. CAP. XIII.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, viticulus in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum
genus

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori. Ad sunt ei & capillamenta quædam spica: cea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq; persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos sanguinant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium.

CAP. XIII.

Limonium, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio equalem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis cæliacisq; prodest: rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur in praiis & palustribus.

Lagopus.

CAP. XV.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Med

Medium.

CAP. XVI.

MEdion in saxis & opacis nascitur. folia habet *iridis: caulem tricubitalem, & in eo *Alj serio florem grandem, purpureum, rotundum: semine dū. cnici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses fœminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, mēstrua pellit.

Epimedium.

CAP. XVII.

EPimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atque duodenis, neq; florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra. graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposita cataplasmate, mammas increescere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post mēstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus.

CAP. XVIII.

XYphion, alij phasganon, alij machæronion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna

perna pberior : nascitur in aruis. Superior cū ihu-
re illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpo-
re extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite
discutit: qua de re huiusmodi emplastris inferi so-
let. Menses imposita trahit. Superiorem radice ex vi-
no pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta
sterilescere tradunt. Superiorem quoq; vtiliter in-
fantium enterocelis, cū aqua potui dare precipiūt.

Sparganium. CAP. XIX.

Sparganion, aliqui xiphidion vocant: folia ha-
bet gladioli, sed arctiora, & in terram magis
procumbentia: in summo caule veluti pilulae pro-
minent, in quibus semen. Contra serpentis vene-
na, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

Xyris, folia habet iridis, latiora, & in cacu-
mine mucronata: quorum medio caulis eru-
pit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triang-
ulares dependent: in quibus purpureus flos, in me-
dio puniceus: semen in folliculis: simile fabis, rotū-
dum, rubrū, acre: radix longa, geniculata, rufa. Cō-
tra capitis vulnera, fractaq; eff: cax est: aculeos &
spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta
floris aris tertia parte, & radice centaurij ac
mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita
cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad
convulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias &
alui profluvia. Semen tribus obolis potū, vrinā ve-
hementius impellit: & cum aceto, lienē absūmit.

ANC

Anchusa. CAP. XXI.

Anchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactucæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoque versus humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ ætate provenit, ac manus inscit sanguineo colore: læto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vulus indita. Eius decoctum renum vitij lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistent alium folia in vino pota. Radice pigmetarij vtuntur ad vnguentorum spissamenta. Est & altera, quæ aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ mensibus sanguineum succum fundunt: in sabulosis nasciuntur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maximè viperarum, auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alio ligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen mādificatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & mēsturio pota, latas ventris tineas excutit.

Lyc

Lycopsis. CAP. XXII.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactucæ, longioribus, asperioribus, latoribusq; crassius, ad radicis caput recedentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs parvis purpurascens: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium. CAP. XXIII.

Vulgò lin- **E**chium, folia habet prælonga, aspera, aliquan-
gua hirci- tum tenuia, anchusæ proxima, minora ta-
na. men, subrubra, & pinguia, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breviora: flores secundum folia pureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri nō patitur. Folia & semē idē præstāt munus. Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum. CAP. XXIII.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos didrantaes, hirsutos: * Melathij. siliquis hyoscyamo similes, semine, ut * gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum cæterarumq; serpentium mor-
sib

sibus medeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Erinus.

CAP. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, filius ocymy, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisve, flore candido: semine nigro, paruo & acerbo: folia & caules * lacteo succo turgent. Semen drachmis duas * Sic Plin. bus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum In Græco fluxiones colubet. Succus cum sulphure & nitro simpliciter, instillatus, aurium dolores sedat.

Succo.

Gramen.

CAP. XXVI.

Gramen gemiculatu serpit ramulus, à quibus gradices spargit dulces, articulis præcinctus: folia acuminata, dura, & vt arundinis parue, lata, in exilitatem fastigiantur, eaque iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrine difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone, id, quod iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutili: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio deco-

quatur, adiciaturque piperis & thuris tertiae portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in aerea pyxide reconditur. Decoctum radicis idem, quod herba, praestat. Semen vehementius urinam impellit, alium vomitionesque sistit. Natus in Cilicia gramen, quod incolae cinnam appellant, boves inflammat, si eo virenti saepe pascantur.

Sideritis.

CAP. XXVII.

Nunc herba Iudaica, **S**ideritis aliqui heracleam vocant: folia habet marrubij, sed longiora, saepe ad frondem quercus aut salviae accedentia, minora tamen, & aspera: caules edit quadratos, dodrantem altos, ac quandoque etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentius: in quibus per interstitia orbiculatae vertebrae, ut in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum: nascitur in petrosiss. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numerofo, virinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus e summo alarum sinus surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quam betae rotundius aliquando, ac durius. Huius vis, foliorumque, ad vulnera, praecipua est. Sideritis aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam vocat, in macerijs, & vineis nascentem, folijs ab una radice multis, coriandro similibus, circa cauliculos dodrantales, teneros, leues, subcandidos atque subrubicundos: flore

flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. CAP. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dracunculae aut maiores gerit scapos, fussum effigie, minutulus folijs circundatos, ex obliquo crebras habentibus incisuras, sectionibus coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insuauis, verum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurum emulantibus: prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vulua profluua, in vellere. Decocto quoque insident facina fluxione vuluae laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus. CAP. XXIX.

Rubus, notitia vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & facinarum profluua, praeteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firman, & oris vitis folia commanducata medentur, cohibentq; illita, vlcera quae serpunt. Vlcerebus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt, & condylomatus, & haemorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimunturque

succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo mæscendus, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur alius præmaturi cibo, necnon flore in vino poto.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Caterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deicit aluum.

Elatine. CAP. XXXII.

Elatine folia habet helxina, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quibus senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

Eup

Eupatorium. CAP. XXXIII.

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicum esse Est Offici-
rens caulem, lignosum, nigricatem, rectum, narū Agri=
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio- monia: ea=
rem: folijs per intervalla quinquefolij, aut canna- rum autem
bus potius similibus, quinquepartitō aut amplius Eupatoriū
diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum ferra- fortē Can-
tis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum nabis sylue
spectans, quod siccatum vestibus inhaeret. Contri- stris, de qua
ta huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlce- precedenti
ribus, quae agrē cicatricem trahunt, medentur. libro.

Herba & semen in vino potum, dysenteria, ioci-
neris vitis, & serpentium ictibus, liberat. Nec
desunt qui aberrantes * argemonen hanc appella * Gracus
rint, cum tamen longē alia sit, uti exposuimus. Artemisiā

Quinquefolium. CAP. XXXIII. habet: sed

Quinquefolium ramulos fert festucarum si- esse, ut nūc
militudine, tenues, dodrantes, in quibus vides, arge
semen: folia menthae, quina singulis monen le=
pediculis, rarō plura, in ambitu serrata: florem ex gendum, ex
candido pallescentem, auri amulum. Nasceatur in anemone
riguis, & aquarijs ductibus. Subrubram habet (de qua li-
radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē. bro y.) non
Plurimis pollet remedys. Ius radicis decocta ad obscure co-
tertius, si in ore contineatur, dentium dolores se- gnoscas.
dat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arteria
scabritas, gargarizatu lenigat: contra alui pro-
fluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-
lorum coxēdicūque cruciatibus potum. Cocta in

aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasque sanat. Tenera radici succus, contra iocineris, pulmonumque vitia prodest: ite aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana vero, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quam fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

ANNOTATIO.

* Spicam lolio similem.] Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam vulgo cognominatam, cuius in segetibus vbique tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureum florem emittit.

Phoenix.

CAP. XXXV.

Phenix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, * spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octo-
nasve

nasve spicas. In arvis tectisque recenter illitis nascitur. Harum virium compos, ut in vino auster pota, alui profluvium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrinae impetus infranet. Sunt quae adalligatam in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix. CAP. XXXVI.

IDæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circum ea veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensisque, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix. CAP. XXXVII.

Gignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, leuior, inaequalis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Equisetum. CAP. XXXVIII.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur: Vulgò Caucaudiculi prodeunt inanes, geniculati, in se da equinafarcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinis arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbae spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericus in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tri-

tis folijs, & illiis. Radix cum sua herba tussim,
orthopnceam, ruptaque adiuvat. Folijs in aqua po-
tis, dissectiones vesicæ & intestinorū, enterocelæq;
in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equi-
setum caulis est rectus, equalis, cubito maior, in-
anis comis per intervalla brevioribus, candidiori-
bus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneri-
bus remedio est, eadēque fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX.

Coccum, quo infectores utuntur, frutex est
surculosus, parvus, cui grana ceu lentes ad-
herent, quæ electa congeruntur. Optimum gigni-
tur in Galatia, & Armenia, deinde Asia, & Ci-
licia: ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic
spissandi: vulneribus, nervisque præcisis, cōveni-
enter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in
Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium similitu-
dine, quod illius regionis mulieres ore legunt, &
coccum vocitant.

Tragium. CAP. XL.

Tragium nascitur in Creta tantum insula,
lentisco semine, folio, & ramis simile, singu-
* Ita Plin. lis tamen minoribus, * succus ei lacteus, gummi
Græcus non dissimilis. Semen, folia, lacrymæque, illius spi-
dex simpli- cula è corpore eijciunt: omnia quoque corpori im-
citer, suc- pacta, evocant: pota stranguriæ medentur, calcu-
cus. los vesicæ frangunt, menses trahunt. Modus in sum-
ptione est, drachma una. Fama est, sylvestres ca-
præ sagittis confossas, eius herbe pabulo spicula
excu

excutere. Est & alterum tragium, quod trago-
ceros aliqui vocant, folia scolopendry habet, &
radicem syluestris raphani, tenuem, candidam:
quam crudam vel coctam esse dysentericis pro-
dest. Folia autumno, hirci virus olent: exinde sibi Nominis
tragi nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & causa
precipitjs.

Tragum. CAP. XLI.

Est etiam herba tragos: quam aliqui scorpion
aut traganon vocant: maximè in maritima
nascens. palmum alta, aut amplior, fruticosa, hu-
milis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos aci-
nis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacu-
mine, gustu multum adstringente. Racemorum
acini decem ex vino poti, caliacis, & foeminis flu-
xione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tundun-
tur à plerisq; & in pastillos digesti asservantur,
quibus vtuntur cum opus est.

Iuncus. CAP. XLII.

Iunci duo genera: vnum leuis nominati, alte-
rum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cu-
ius etiam duo assignantur genera: vnum sterile,
reliquum fert semen nigrum, rotundum, & cras-
sore constat calamo, carnosioreq; Tertius est iun-
cus, qui vocatur oloschoenos, prioribus carnosior,
asperiorq; is similem supradicto fructum in ca-
sumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diluto
vino potum, sistit aluum, & rubra foeminarum
profluvia: urinam cit, capitisque dolores facit.

Qua proxima sunt radici folia tenera, cōuenienter illuminantur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen. CAP. XLIII.

Officinū Hepatica. **L**ichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adheret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & lingua defluxiones inhibet.

Paronychia. CAP. XLIIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome. CAP. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborū, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum aequante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacuq; nascitur. Radix excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluae, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. CAP. XLVI.

Chrysogonum dense fruticat, querni folijs: flore coronarij verbasci: radix ut rapum exuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quae tri-

a cum aceto, atque imposita, muris aranei morfi
bus auxiliatur.

Elichrysum.

CAP. XLVII.

Ally Helios

ELichryson quidam chrysanthemon, nonnulli chryson.
& id amaranton vocant, quo deorum simus Officinis
lacra coronant: ramulum habet candidum, virens Stachas
tem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatys citrina,
angusta, abrotono similia: comam aurea lucis in
orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis de-
pendentibus, radice tenui: nascitur in asperis, &
torrentium alueis. Contra serpentium ictus, co-
xædicum dolores, vrinae stillicidia, rupta q; coma e
vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem con-
cretum ventris ac vesicæ absomit, pota cum mulo-
so: ieiunus, trium obolorum pondere, sistit destilla-
tiones, data in vino albo diluto: vestibus inseritur,
vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum.

CAP. XLVIII.

CHrysanthemon aut caltha, nonnullis bu-
phthalmos: herba est tenera, fruticosa, laeues
proferens caules, & multifida folia: flores supra mo-
dum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde
buphthalmi nomen traxit: propter oppida na-
scitur. Cuius caules oleris vice manduntur. Flores
cum cerato triti, steatomata discutere produntur:
regio morbo correptis, colorem breui reddunt, si se-
quente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum.

CAP. XLIX.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longi-
tud

itudine assurgens, simplex, humilis, origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti seruēs: huius vsta nidor urinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca.

CAP. L.

Peristerion, siue verbenaca nascitur in aquis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columba circa hanc perquam libenter versari soleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adolescit. folia è caule prodeunt incisa, & subaltida: ea singulari ramo, radicēque sola, constare saepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

CAP. LI.

Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisurus in ambitu, colore aliquatenus caesio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitæve, aduersus serpentes pollent: eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores & inflam

Inflammationes mitigant sordida vlcera purgant.
 ta in vino decocta, tonsillarum crustas abrum=
 oris nomas gargarizatu cohibet. Aut, si aqua
 gurgatur trichinium, qua maduerit, letiores con=
 ctus fieri. Datur potandum in tertiana febr=
 is, tertium à terra geniculum, cum folijs circun=
 antibus, quartanus, quartum. Sacram vocant her=
 um, quoniam multum ad amuleta, expiationesq;
 commendetur.

Astragalus.

CAP. LII.

Astragalus, paruus à terra frutex, folijs &
 ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo:
 udice rotunda, raphani modo grandi, quæ adna=
 is appendices firmas habet, nigras, præduras,
 eluti cornua inter se implicatas, gustu adstrin=
 gentes. nascitur in vêtosis, opacis, & in niualibus.
 o Memphis Arcadiæ scatet. Alium sistit radix in
 vino pota: vrinam mouet: vetustus vlceribus, sicca
 efficaciter inspargitur: sanguinem supprimit: æ=
 rè propter duritiam tunditur.

Hyacinthus.

CAP. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem
 caulem, leuē, minimo digito tenuiorē, her=
 acei coloris: comam procumbentem, florum pur=
 pureorum plenam, incuruam: radicē quoque bul=
 aceam. Quæ, ut creditur, pueris cum vino albo
 illita, pubertatem coërcet, & non patitur erum=
 bere: sistit alium pota, & vrinam impellit, pha=
 langiorumq; morsibus auxiliatur. Semen adstrin=
 gentius

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat cum vino potum.

Papauer erraticum. CAP. LIIII.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Gra-

* Locū de= cos accepit. * Folia erucæ, aut origani, aut cichoræ, aut thymi, aut thymo similia spectantur: sed longiora, se manifeste diuisa, scabra: iunceus ei caulis, reclus, cubitalis, stè apparet. asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum sunt enim albus: oblongum caput, sed quàm anemones mi= herba quas nus: semen rufum: radix longa, subalbida, mino= hic comme ris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita morat Dio= quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad dimi= scorides, di= dias decocta, potui dabis, quibus somnus accera uersa planè sendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua facie, ut vini mulsa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præ eidemq; re= standum mellitis placentulis, & dulciarijs libis èlè compa= admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflamma rari nequa tiones sanant: eorundem fotu & perfusione somnus quam pos= allicitur.

sint: quo= Papauer satium. CAP. LV.

modo autē **E** Satini papaueris genere, quod hortense est, instauran= semen in panem densatur, qui sanis in vsu dus, peritio sit: eo etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylaci= ribus cogi= tin vocant. Capitulum habet longum, & semen cantandum re= didum. Sylvestre verò, caput insidens demissumq;, linquimus. & nigrum semen, quod pithitis nominatur: non= nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius sca

capolacteus succus emanat. Tertium magis syl-
 vestre, & ad medicinas valentius, multò his lon-
 gius, productiore capitulo. Omnium in commu-
 ne natura refrigeratrix: quare si capita ipsa &
 folia decoquantur in aqua, somnum fotu concilia-
 bunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Caly-
 ces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti,
 ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tum-
 untur quoque virides, & digeruntur in pastillos,
 qui siccati ad vsum reconduntur. Capita quoque
 per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; ad-
 iecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lento-
 rem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxioni-
 bus, & celiacorum affectu, doloris leuamentum
 præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypo-
 cistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen
 tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, &
 foeminarum profluuia: in peruiigijs fronti tem-
 poribusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis
 refrigerat, inspissat, siccaturq;: sumptum erit ma-
 gnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum
 allicit: tussi, atque celiacorum valetudini auxilia-
 tur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum le-
 thargicos efficiens interimat. Ad dolores capi-
 tis cum rosaceo persusum efficax est: aurium do-
 lori, cum amygdalino, myrrha, & croco instil-
 latur: inflammationibus oculorum cum torrefa-
 cto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
 cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-
 co:

co: somnū accersit, subditū sedi pro balano. Opti-
 Opiū quod mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 optimum. odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, le-
 ue; cauidum, neque asperum, neque grumosum,
 quod inter colandum non ut cera coeat, & in so-
 le diffundatur: dein admotum lucernis, non atra
 luceat flamma: extinctū deniq; odoris vim confer-
 uet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris la-
 Eius adul- etuca succo, adulterant. Verū glaucio fucatum,
 teratio. in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo suc-
 co fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur:
 gummi vitiatum, splendet, & infirmum est.
 Nec desunt, qui eò dementiæ deuenerint, ut adia-
 pem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculo-
 rum medicamenta, dum mollius, atque rufius
 appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est,
 vsum eius damnauit, oculorum lippitudinibus &
 aurium vitis infundi vetans, quoniam visus
 aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit
 Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adu-
 leretur. Mnesidemus vsum duntaxat olfactan-
 di probauit, quoniam ad conciliandum somnum
 conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicat. Quæ
 commentitia esse, experimentoprehenduntur:
 siquidem effectus, virium huiusce medicamen-
 ti fidem faciunt. quare non alienum fuerit scri-
 ptis mandare, quoniam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & præ-
 lo exprimunt, terentesque in mortario, digerunt

in

in pastillos: id meconium vocatur, multum opio-
gnatius. Porro opij faciendi ratio hac est: Cum Opij colli-
ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne gendiratio.
venitus adigatur, ex obliquo in rectum summam
cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem,
digito in concham abstergere: nec multo post re-
dire, ut concreta inueniatur: etenim quatum, aut
postero die etiam offenditur, in vetere pila teri
debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur,
retrocedendum est, ne vestibus succus dera-
datur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia Vulgò pa-
habe. candida, hirsuta, v. rbasco similia, in am papuer cor-
bitu syluestris papaueris more serrata: caule non nudum.
dissimili: flore pallido: calyculo fœnigraci, in corni-
culorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: se-
mine papaueris, pusillo, nigroq;: radice per sum-
ma cespitum nigra, crassa: nascitur in mariti-
mis & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua de-
cocta ad dimidiis, coxendi cum & iocineris affe-
ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quadam,
aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium le-
niter purgat semen, acetabulo in aqua misu poto.
Cruſtas emarginat, illita ex oleo folia floresq; &
argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abs-
terguunt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris gen. re-
ſactitari exiſtimarunt, falſi quadam foliorum co-
gnatione.

Spumeum papauer. CAP. LVII.

Aliud papaueri genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule do-
 * Struthio. drantali: folijs admodum paruis, * radicle simili-
 bus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est,

* Sic ex & spumea tota: * radice in summo caespite. Legitur
 Theophrastus = ætate semen, cum integrè adoleuit, deciditq; exic-
 sto. Videtur catum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsæ,
 enim locus vomitionis expurgat priuatim huiusmodi purgatio,
 in Græco comitialibus prodest.

Dioscoridis

Hypecoum.

CAP. LVIII.

codice cor-
 ruptus.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur
 in segetibus aruisq; folijs ruta, exilibus rae-
 mis. Natura eadem, quæ papaueri succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus.

CAP. LIX.

Nunc Inf-
 quiamus.

Hioscyamus, frutex est caules emittens cras-
 sos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta:
 flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam pic-
 nicorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut pa-
 paueris. Tres eius differentiæ: Una semine nigro, flo-
 ribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini prædu-
 ris, & spinosis. Alterius semen sublauium, ut irio-
 nis: flores lutei: folia, & siliquæ simplices. Am-
 bo insaniam gignunt & soporem, ideo in commu-
 ni usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitis-
 simum esset, medici receperunt: pingue, lanuginos-
 sum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis
 rudcribusq; nascens. Cuius occasio si non adsit,

ru

rusum vsurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-
probat. Recenti semine, caulibus folijsq; tussis, suc-
cus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus
ad annum vsque prorogatur: nam facile corruptio-
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine sepa-
ratim in aqua calida tuso, & expresso. Liguamen-
tum autem succo lacteo praestantius est, & magis
dolores finit. Contusa herba recens, addita trime-
stri farina, digeritur in pastillos, & reconditur.
Liquamentum primum, & quod à sicco semine
exemptum est, collyrijs, quae doloris sensum aufe-
runt, commodissime inferi solent: contra acutas ca-
lidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vuluema-
la, prosunt: cum farina autem aut polenta, oculo-
rum, pedum, ceterarumq; partium inflammatio-
nes placant. Semen eadem praebe: tussi, destilla-
tionibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax:
contra mensium abundantiam, & rumpentem
aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaueris se-
mine, & aqua mulsæ, bibitur: podagris subuenit: te-
stibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tri-
tum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatu,
quae doloris leuamentum praestant, admisceri solet.
Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus,
per sese, & ex polenta, vtilissime impinguntur: re-
centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinun-
tur: cum vino terna, quaternave pota, sanant al-
gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum
modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si, colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium. CAP. LX.

P Syllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fœni modo, in totum herbula ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicem simili: unde & nomen. in aruis & incultis nascitur. Us ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcerà, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense folanum. CAP. LXI.

Hodie sola **H**ortense solanum, frutex cibus idoneus, pu-
trum corru- fillus, multis concavus alis: folio nigro, ma-
pté. iore quam ocymi, & latiore: fructu rotundo, viri-
di.

di, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline poleniæ illinuntur: ægylopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstuantis stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera, quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad ægylopos cum pane: infantium a lustrioni, quam syriasim vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum corticium fimo subactus, & luteo appositus, ægylopijs presentaneo est remedio. Est & aliud solinum, Arabum quod peculiari nomine halieacabon aut phrysalis exemplo. da, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine intus fuluo, rotundo, leui, acinorum vuae effigie: quo coronarij vtuntur, corollis intorquentes. Vinumq; hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expeditur. Regium morbum purgat, semine poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatu in umbra, reconditur, ad eadem valens.

Officinis

Alkekengi

Arabum

exemplo.

Solanum somniferum. CAP. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabon appellant, fruticat multus ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæq; mali similitum plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocatis: radice gradi, sub rubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ ponderis potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. CAP. LXIII.

Solanum manicon, aliqui perison, alij thryon appellant. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satius acantho, quem paderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adollescentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed ut platani pilulæ hirsutius, verum maius, latiusq;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, ut vna mollibus: radice firmatur candida, crassa, cana, cubitali: gignitur in mont

montibus, vento perflatus, & platanetis. Radix drachma unius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non inuicundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad treis vsque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium. CAP. LXIII.

Dorycnion Cratenas halicacabon, aut caeleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmiter, præter modum scabris: flore candido: siliquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui erant magnitudine, læuib; firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere, qui dicarent, semen in amatoria expeti.

Mandragoras. CAP. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij circaeam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ femina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactucæ, viridis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhaeret bene ma-

gnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris for-
 ris, intus albis, crasso cortice vestitus, caule vi-
 dus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnul-
 * Alj mo- lus* norion vocitatus: huius folia magna, alba, læ-
 rion. ta, leuia vt betæ: mala quàm alterius duplo maio-
 ra, colore in crocum inclinante, iucunde cum gra-
 uitate quadam olentia: quorum pomorum cibo, ali-
 quantum opiliones soporantur. radix, alterius si-
 milis, maior & candidior, orbata & hæc caule.
 Succus fit è cortice recentis radice tuso, & præli-
 subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, fictili re-
 conditur. Malis quoque succus depromitur, sed ali-
 quantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus
 lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices
 in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius ser-
 uant: cyathosq; vno vtuntur, in peruiigijs, & do-
 loribus, & ante sectiones vstionesq; ne sentian-
 tur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt vera-
 trum, per vomitiones bilem atram pituitamque
 extrahit: verum potu largiore, vita admittitur.
 medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores fi-
 niunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: se-
 mioboli pondere inditus, per se menses & partus
 expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est.
 Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum
 eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere
 optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia re-
 centia conuenienter oculorum inflammationibus,
 & collectionibus, quas vlceris citant, cum po-
 lent

lenta illuminantur: duritias omnes, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisve diebus, sensim perficiuntur. Folia servantur in muris, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atque tubercula, cum aqua dissipat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit contra coctionem vinum è cortice radice, ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ŷs, qui secari aut amburi debent, vt antè dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veteris quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositumque cum sulphure ignem nō experto, rubra foeminarum profluvia sistit. Scarificata punctusq; multifariam aperta radice, erupens lacryma, cauo vase recipitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opaco iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine aquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniore,

drachmæ pondere deuoratam, vsum rationis in-
tercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo
comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternis-
ve, ex quo data est, horis. Hac medici vtiuntur, cum
scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse
volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. CAP. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cammo-
ron, alij thelyphonon, alij myoclonon, alij
theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut
* Ita Plin. cucumeris, tria aut quatuor, minora & * subhir-
Græcus suta: caulem palmo altum: radix scorpij caudã
μοργα æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt,
ἕλκω, id est, vt fama est, scorpiones admota radice, stupentq;
subaspera. qui rursus hellebori contactu excitantur. Ocu-
vira autẽ lorum medicamentis leuandi doloris gratia adycci
lectio po- tur. Enecat pantheras, sues, lupos & feras o-
tior, herba, mneis in carnibus obiectum. Est & alterum aco-
fi quãdo se- nitum, quod aliqui cynoclonon, alij lycoclonon ap-
se obtulerit pellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo vtun-
aspectus in tur venatores: alia duo in vsum suum vertere me-
dicabit. dici, è quibus tertium, quod Pöticum nominatur,
plurimum in Italia, montibus Iustinus exilit: à
priori distans, quoniam folia faciat effigie plata-
ni, crebriore diuisura, longiora, & multo nigrio-
ra: caulem filicis pediculo similem, nudum, cubita-
li altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ob-
longis recondit: radices in modum squille marinae
cirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem lu-
por

orum vtitur: inserta siquidem crudi carnibus,
& deuorata, lupos enecant.

Cicuta. CAP. LXVII.

Cicuta caulem edit geniculatum, vt feniculus. Plinius
li, grandem, * folia ferulae, angustiora, gra- lib. 25. cap.
u odoratu: rami, mox umbellae in summo pro- 13. Corian-
leunt: flores quoque albicantes: & semen aniso- dro assimi-
candidius: radice non alta, concaua. Cicuta ele- lauit, cui
bale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. propius sa-
Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimi- ne, quam
tur contusis cacuminibus, priusquam semina & ferula, quae
coma siccescant: qui sole densatur in pastillos. feniculi co-
Multus ad medendi rationem vsus est aridi: como- stat folijs.
de miscetur collyrijs, quae leuandi doloris gratia Cicuta o-
temperantur: ignes sacros, & viscera quae serpunt, mnibus ho-
illu restinguit. Herba cum coma trita, & testi- die coperta.
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, videtur ac-
compefcit: sed genitale resolu: lac puerperarum cedere.
mammis apposita extinguit: in virginitate mam-
mas coerces, & increfcere non patitur: pueris pra-
stat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, in-
tabescant. Efficacissima vis Cretica, Megarensi,
mox Attica, & in Chio & Cilicia nascenti.

Taxum. CAP. LXVIII.

SMilax a Graecis, taxus a Latinis appellatur,
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispania
contermina nascens. Aviculae quae Italica ta-
xi

xi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripiuntur. Narbona tam praesens est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, ledantur, & saepenumero moriantur: quare de taxo haec traduntur, ut ab ea caueamus.

Apocynum. CAP. LXX.

Apocynum, siue cynocrabe, brassica canina, frutex est longus viticulus constans, male olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutius, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibum data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

CAP. LXX.

Nerion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocant. frutex est vulgaris notius, longioribus quam amygdala folijs, crassioribusque: fructu in rosam conformato: fructu* nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salis nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimus venena sunt: hominibus verò c

a serpentium morsus praesidia, è vino pota: eo
 magis ruta addita: imbecillæ etiam animantes, ut
 pecus & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea
 caduerint, moriuntur.

Fungi. CAP. LXXI.

Fungorum differentia duplex: aut enim man-
 duntur, aut perniciales sunt. Multis de causis
 enenosi gignuntur, ubi videlicet clauus ferreus,
 in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut
 iuxta serpentis cauernam, arborësve, quæ pri-
 atim pariunt noxios fructus, erumpant. Continēt
 qui tales sunt, nescio quod strigmentū cōcretamq;
 ituitam, terrāq; eruti, quā celerrimè cōputre-
 ſcunt, atque marcore vitiātur. Sed qui veneno im-
 uti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent:
 argius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti
 strangulant, aut choleram morbum citant. Remē-
 dio est nitri potus, aut lixiuium cum acida mu-
 cia, aut feruesfactæ saturiæ, aut origani iusculū:
 ebellantur etiam gallinacei fimi potus ex aceto,
 ut eiusdē delinctu cū melle multo. Corpus alit,
 sed agrè dissoluiuntur, cū magna ex parte inte-
 ri ipsi, cum recrementis alui reyciantur.

Colchicum. CAP. LXXII.

Colchicon, aliqui ephemeron, sunt qui agre = Censetur
 stem bulbum vocant, autumnū exitu florem Hermoda =
 dit croci, candicantem, ab eo tempore, folia bul- = Etylus officina-
 ri, sed pinguiora caulem palmo altum, ferētem ru narum.
 semem: radicem foris è nigra rufescentem,
 quæ

quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lactes succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbis eius mediam habet rimam, fissuramq; , qua flos erumpit: plurimum in Messenia, & Colchia nascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fungus: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum.

CAP. LXXIII.

Fortè no = **E**phemeron, aliqui syluestrem irin appellant
strum Li = **E**folia habet lili, sed tenuiora: caulem parem
lium cōual florem candidum, amarum: semen molle: radice
lium. **u**nam, digitali crassitudine longam, adstringen
tem, odoratam: nascitur in syluis & opacus. Huius
radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia
in vino cocta, discutiunt tumores, & tubercula,
qua nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba.

CAP. LXXIIII.

Officinis

Parietaria

Helixine nascitur in præietinis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubetes, & circa eos veluti semina aspera, adherentia vestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, qua ex causis sanant illius sacros ignes, adusta, condylomatibus panos incipientes, tumores, inflammationesq; .

us eius cum cerussa, ignibus sacris, & ulceribus
que serpunt, commodè illinitur, imponiturq; poda-
gris cum hircino adipe aut cerato cyprino: veterē
ussim emēdat instar cyathi haustus: tonsillis in-
flammationem sentientibus utiliter & gargari-
zatur, & oblitur: aurium dolorem cum rosaceo
instillatus leuat.

Alfine.

CAP. LXXV.

Alsinen, aliqui amhyllion, nonnulli myos ota Vulgò mor-
vocant, quoniam masculorum aures folia suis gallina-
mitantur. Lucis opacisque gaudet, vnde alsine di-
cta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humi-
lior esset, & folijs minoribus, * nec hirsuta. cum * Ex Plinio
eritur odorem cucumis reddit.] Vim refrigeran-
ti adstringendique obtinet: oculorum inflāmati-
onibus cum polenta illinitur. Succus aurium dolori-
bus infunditur: quin & emendat omnia quæ hel-
xine, id est, muralis herba.

Lens palustris.

CAP. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluen-
te, muscus lenticula similis, refrigeratoriæ lenticulae
naturæ. Propter quod cōuenienter collectionibus, aquæ,
igni sacro, & podagris, illinitur per se, & cum po-
lenta: glutinat & prociđētia puerorū interanea.

Semperuium, seu sedum.

CAP. LXXVII.

Semperuium magnum ideo nominatur, quo-
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-
biti altitudinem implent, interdum excedunt, pin-
gues,

gues, crassitudine pollicari, virentes, characiaci-
 *Vox addi thymali modo infecti. folia pingua, *carnosa,]
 ta ex Plin. magnitudine pollicari, in cacumine lingua simi-
 nio. lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia
 inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi:
 nascitur in montibus, & testaceis: supra domi-
 cilia etiam seritur. Eius vis refrigerare, & ad-
 stringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus
 quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambu-
 stis igni, podagris per se, & cum polenta illita fo-
 lia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut
 rosaceo perfunditur: datur in potu contra pha-
 langiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia:
 teretes tineas potus in vino excutit: subditus in
 vellere, mulierum abundantiam sistit: succus ocu-
 lorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptus,
 Vulgò vera inungitur. Semperuium paruum in petris, parie-
 micularis. tinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nasci-
 tur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre-
 bro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus,
 mucronatis: caule à medio emicante, palmum al-
 to: umbellam herbidosq; flores, & tenues gerente.
 Folia eisdem cum priore viribus prædita sunt.
 Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui
 andrachnen agriam, aut telephon vocauerunt,
 Romani illecebram, pusillus, crassioribusque folijs,
 hirsutus, portulacæ proximus: nascitur in saxis. Vis
 ei excafactoria, acris, exulcerans: illita cum axū-
 gia strumæ discutit.

Vmb

Vmbilicus Veneris. CAP. LXXVIII.

COyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formā tornato, in eundem concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, instillatusve, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernio= nibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrige= rat. Folia cum radice comesa, calculos frangunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Est & alterum genus eius= dem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, la= tioribus, ligularum modo densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in ma= iore semperuino, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuium.

Vrtica. CAP. LXXIX.

DVo vrticæ genera: syluestris, asperior, la= tioribus, nigrioribusque folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto se= mine. Folia vtriusque illita, canis morsibus, addi= to sale, medentur: gangrænas, carcinomata, sor= dida vlcera, & quæ cacæthe vocantur, item lu= xata, panos, tubercula, parotidas, suppuratio= nesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: fa= ciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidentes vuluas, recen=

Z

ria contactu resilire cogunt. Semen potum ex passio, venerem stimulat, vuluæ ora patefacit: cum melle delinctum, orthopnoæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchyliis folia, alium emolliunt, urinas mouent, inflammationes discutunt: decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrha medico pota. Inflammationem turgentem tuam gargarizatus succus reprimat.

Galiopsis.

CAP. LXXX.

Galiopsis frutex in totum caulem, & folia habet urtica, leuiores, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpurascens, tenui: nascitur circa sepes, edificiorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusque, duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentiam, gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion.

CAP. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in con-
trahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliumque habet aparinæ simillimum, retum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum vsquedum albescat.

laß

lasitudines reficit. Radix venerem concitat. Nas-
citur in palustribus.

Senecio. CAP. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, folijs
continuis, erucæ modo per extremitates diui-
sis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui cele-
riter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò si-
bi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve-
re canescant. radice supernacua: nascitur maxi-
mè in macerijs, & circum oppida. Folia cum flo-
ribus refrigerant: quare illita cum vini modico,
vel per sese, testium & sedis inflammationes sa-
nant: quin & ex manna, thuris medentur, cum re-
liquis vulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt.
Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præ-
stant: verum recentes epoti, strangulant. Totus cau-
lis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores
à bili contractos, persanat.

Thaliætrum. CAP. LXXXIII.

Thaliætron folia coriandri habet, pinguiora
paulò: cauliculò rutæ crassitudine, in quo fo-
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem
perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus. CAP. LXXXIIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testa-
ceisq; haud procul à mari, gracilis, capil-
laceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, &
collectiones cohibendi, & podagras, quas refrige-
rare opus sit.

Phycus marinus. CAP. LXXXV.

Phyci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagra modò, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem verum ijs uti humidus conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucò quidam putant mulieres suum calorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXVI.

Potamogeton, filium betæ simile, hirsutum paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum vlcerum nomias. Nomen ex eo inditum est, quòd palustribus, & aquis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice vivit: unde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, in iumentis non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotes millefoliū. CAP. LXXXVIII.

Stratiotes millefolium exiguus frutex, palmi
Vulgatum millefoliū. Saliitudine, aut amplius assurgit: folijs aucu-
larum

larum pennas imitantibus, breui admodum disse-
ctoque foliorum exortu. Folia syluestre cuminum
simulant, præsertim breuitate atque scabritia, bre-
uiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surcu-
los in cacumine gerit, exiguos, & capitula in mo-
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus
ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sangui-
nem, & fistulas.

Verbasum. CAP. LXXXIX.

Verbasum differentias summas habet duas, Tapfus bar-
hoc nigrum, illud album: in quo mas & baius vul-
fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt gò.
brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candida:
caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus:
flores albi, aut subpallidi: semen nigrum: radix lon-
ga, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in
campestribus. Verbasum, qui mas appellatur,
oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori
caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi
nigriore latioreque constaret folio. Syluestre folia * Sic Plin.
fert saluæ, altas virgas, & * lignosas, & circa qui εὐαίω-
eas ramulos, quales marrubium flores luteos, auri d'is vide-
æmulus. Sunt & phlomides duæ, hirsutæ, rotun- tur legisse.
dis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur: Græcus co-
ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quater- dex d'is-
nis, vel paulò pluribus, hirsutus, crassis, pingui- δ'ρω d'is, id
búsque apta ad lucernarum lumina. Radix pri- est, arbore-
rum duarum adstringit: quare quod magnitudine scentes.

ludicrum talum aequet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquae tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcerata, ex vino & melle illuminantur: cum aceto quoque vulneribus medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxilio. Syluestri folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam foeminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

Aethiopis. CAP. XC.

Aethiopis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cassipate numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quae siccae nigrescunt duranturque, ut cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuritidis, arteriae scabritijs, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmatum vicem praebet.

Arction. CAP. XCI.

Arction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quod hirsutiora

ra, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulcique. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta per nionesque fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & Vulgò lap-
hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem al- pa maior,
bicantem, quanquam & interdum vidua caule re & Barda-
periat: radice grandi, intus candida, foris ni- na.
gra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis
nucibus, purulenta & cruenta extusisientibus au-
xiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum con-
tractos, illitus sedat. Folia vtiliter antiquis vlceri-
bus illinuntur.

Petasites. CAP. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine
pollicis, à quo prægrande folium, galeri mo-
do amplum, ceu fungus dependet. Contra phage-
denas, & vlcera, quæ cacoethe vocant, efficaciter
illinuntur.

Epipactis. CAP. XCIII.

Epipactus ab alijs helleborine, parua herba,
exiguus folijs. Iocineris vitæ vtilis, & con-
tra venena pota.

Capnos, seu fumaria. CAP. XCV. Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, præ tenera, co- sumus ter-
riandri similis: folijs candidioribus, vndique re-

numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemq; unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam urinam trahit.

Lotus urbana. CAP. XCVI.

Lotum urbanam alij trifolium vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caliginis discutit.

Sylvestris lotus. CAP. XCVII.

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine foenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum melle & semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui vesicam male habent.

Cytisus. CAP. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, sepe maiores in quibus folia foenigraci, aut loti trifoliae, minorum, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recensapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alluciat, prope aluearia serunt.

Lot

Lotus Aegyptia. CAP. XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumi-
ne inundatis prouenit, caule fabæ: flore par-
uo, candido, *lilio simili, quem tradunt occidente * κρίων,
sole comprimi occludique, ad ortum autem aperi- non κρίων.
ri: adduntque, caput ipsum vespere aquis condi, &
ad exortum Solis emergere. Caput quale papaue-
ris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ Ae-
gyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos
hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda co-
cta; manditur: decocta; lutei oui qualitatem
exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod pau-
lò ante stratiotem millefolium esse monui-
mus.

Millefolium. CAP. C.

MYriophyllon, siue millefolium, caulis est te-
ner, singularis, vnica nixus radice: pluri-
mis folijs, lauibus, feniculo similibus: vnde nomen
accepit. Caulis flauescit, varius, ac veluti ex indu-
stria delinatus nascitur in palustribus. Vulnere
recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride,
vel siccum ex aceto, oblinatur: præcipitatis in po-
tu cum aqua & sale datur.

Myrrhis. CAP. CI.

MYrrhis, simillima est cicutæ, caule fo-
lijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, odo-
rata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, pha-

longiorum morsibus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos: purgatque à puerperio fœminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis tēre die potam ex vino in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagrum. CAP. CII.

MYagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubia, pallidis, tri-
 * τήλιδι. pedanea: semen oleosum, * ξανόγραeco simile. Quod
 non τρα contusum igni torrent, perunctusq; virgus ad lucer-
 χύλω. narum lumina vtuntur: hoc pingui, scabritias cor-
 poris lenigari, atq; expoliri constat.

Onagra. CAP. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radice maduerit, in potu data feras mitigat, & cicures facit: illitu quoque tetra vlcera mulcet.

Cirsium. CAP. CIIII.

Censetur **C**IRSIUM, caulis est tener, duorum cubitorum, Buglossa of triangulo similis: ab imo foliola, rose speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla
 * Pli. mino= molles: folia buglossi similia, * maiora, sub-
 ra. candida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo purpurea, quæ sol-

nuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis.

CAP. CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, luteum re, per ambitum, anihemidis capituli modo diuisum, foliolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem circundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, prociua sedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florē, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum. CAP. CVI.

Isopyron aliqui phasolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminis, melanthii gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semen ex aqua malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vtile.

Viola purpurea. CAP. CVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus, sua

suauissimè olens, purpureus: opacus & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho & estuanti, & oculorum inflammationibus, sed & que pro-cidenti.

Cacalia.

CAP. CVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, re-ctus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cera- to illita, faciem erugant & cutem extendunt.

Bunium.

CAP. CIX.

Bunium caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, as- pio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Urinam ciet, excalfacit, secundas euocat: lieni, vesicæ, renibus vtile. Tam humidi quàm sicci, expres- siq; succi caulibus, folijs, radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunium palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri- gustu. Tormina, atque stranguriam, laterum- que dolores, sanant quaterni rami eius poti in a- qua: illiti quoq; cum sale & vino, tepentes, strumas discutunt.

Cha

Chamæcissus.

CAP. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longio Non est, re, ramulis à radice quinis senisve, dodran= quannus id talibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, sonet Græ= ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice te= canica di= nui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt con= etio, hederæ uenienti= simè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ terrestris cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus: eo= vulgò nomi= dem pota modo, senis aut septenis diebus, regium nata: quod morbum purgant.

eam paulò

Chamæleuce.

CAP. CXI.

studiosius

Chamæleuce lumborum doloribus propitia cum d. scri= est herba virens, incuruis folijs, surculisq: puone con= flore rosaceo.

ferens, liqui

Buglossum, seu lingua bubula.

dò cognos

CAP. CXII.

sces.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabu= Vulgaris losis. Iulio mense colligitur. Aiumt eam, quæ Borago. treis thyrsis emittit, cum semine & radice tritā, potamq: contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. her= bam abscessibus vitile esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bu= bulas imitans linguas. Quod in vinum detectum, animi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & pur= pureos flosculos edens, nō esse verum acle= gitimum, historia eius apertissimè indicat.

Cynog

Cynoglossum.

CAP. CXIII.

Cynoglosson folia latifoliae plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbae ex vino potum.

Phyteuma.

CAP. CXIIII.

Struthij. **P**hyteuma folia habet & radicle, minora: copiosum semen, perforatum, radicem parua, tenuem, per summa terrae nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium.

CAP. CXV.

Leontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumve digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri semine usque adeo spissalauagine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua cohaeret: quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum.

CAP. CXVI.

Hippoglosson frutex est folia habes rusciteae figura, & spinosam coriam, & in summo ceu linguas ex folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusque admiscetur.

Antirrhinum.

CAP. CXVII.

Antirrhinon, alij anarrhinon vocat, herbam

caus

caule & folijs anagallidi similem: flore albæ vio-
 æ purpureo, minore tamen, ideoq; sylueſtris ly-
 bnis nominata eſt: ſemine vituli narium ſimili.
 Tradunt perunclos ea, cum oleo lilino, venuſtiores
 fieri: nec vllō medicamento lædi poſſe, ſi quis ap-
 penſum geſtet.

Catantance.

CAP. CXVIII.

EX eo genere vna, folia coronopi habet, lon-
 ga, radicem iunci modo prætenuem: capitula
 ſema, ſeptenāve, in quibus erui ſemen ineſt. Are-
 ſcens in terram ſelectur, & ſe contrahit ad ſpe-
 ciem vnguium milui exanimati. Altera mali par-
 ui magnitudinem explet, radice exigua oliuæ ma-
 gnitudine: folijs quoque oliuæ colore, & figura,
 mollibus, diuiſis, humi inclinatis: ſemen, vt cicer,
 minutum, in virgulis dependet, punicei coloris, mul-
 tis foraminibus pertuſum. Vtranq; narrant in a-
 matoria expeti. Theſſalicæ mulieres his vti tra-
 duntur.

Tripolion.

CAP. CXIX.

TRipolion in marinis naſcitur locis, quæ alli-
 dit vnda, recedensq; dimittit, neque in ma-
 ri, neque in ſicco: folio glaſti craſſiore: palmeo cau-
 le, in mucrone diuiſo. Eius, vt tradunt, flores colo-
 rem ter die mutant, mane candidi, meridie purpa-
 rei, ſero punicei conſpiciuntur. Radice alba, odo-
 rata, calidi guſtus. Quæ drachmis duabus in vino
 pota, aquam, vrinamq; per aluum extrahit. In me-
 dicamenta digeritur, quæ venena arcent.

ANN

Officinarum Capillus Veneris. Est enim earum Adiantū, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxj. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiātum, comparatum, album potius, quàm nigrum, appareat.

Adiantum.

CAP. CXX.

Adianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbæ potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vri-
næ difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet, & mēstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecras densat, strumas discutit furfures, & manantia capitis vlcera, ex lixiuo emendat: defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq; Decoctū eius cum lixiuo & vino infusum, idem præstat: coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorū additū. Seritur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Vmbrosis, &
pal

alustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Trichomanes. CAP. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus Officinis adianton filici simile, sed exilius: folijs lenti = polytrichonula, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, ad quod idem uersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore tamen cum splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare Adianto. posse constat.

Xanthium, siue Lappa. CAP. CXXII.

Xanthium nascitur lato & pingui solo, & la = Vulgò lappa cubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pin = pa minor. rui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu vestibus adhærescit. Is autè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro autè perfrictum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumori bus imponitur.

Aegilops, siue festuca. CAP. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternæve, rubra, quibus aristæ quasi capillacæ exeunt. Illita cū farina herba ægilops medetur, duntias Marcello discutit. Succus farinæ admixtus, siccatur, & suppositus eorundem gratia reponitur. * Bromus herba ægilops.

A

lopi similis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adycitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux. CAP. CXXIII.

Glaux cytiso aut lenticulae folijs similis, quae superne virent, auersaeque candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamen: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad renocandam extincti lactis vbertatem.

Polygala. CAP. CXXV.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulae, gustu adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. CAP. CXXVI.

Censetur
Linaria
vulgò ap=
pellata.

Osyris, frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his folia, quaternaria, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuvat arquatos.

Aspera smilax. CAP. CXXVII.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri

acu

aculeata: arborescendit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nascentur in palustribus & asperis: radice dura, crassaque. Folia & acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

Lævis smilax. CAP. CXXVIII.

Lævis smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuora, tenuiora: huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circunquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tenetoria contra æstus molestiam faciuntur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio pito, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. CAP. CXXIX.

Syluestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut Officinis myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: fr. Bruscus. lium fert myrti, latius, informam lanceæ mucronatum: bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis

simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in vino pota & urinam cient, menses pellunt, vesicae calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitibus locus enascitur. Decoctum radice in vino potum, eosdem praebeat effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXXX.

Laurus Alexandrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, * Rusco dodrantales, interdum longiores: radice * sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice posita sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio urinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXXXI.

Vulgò Lau-
reola.

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus: caput inanit commanducatum, sternutamenta mouet. Bacca quindecim pota aluum resoluit.

Cha

Chamædaphne. CAP. CXXXII.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, laues: folia lauri similitudine, leuiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idem facit pessa appositus.

Veratrum album. CAP. CXXXIII.

Helleborum album, Latini veratrum album vocant, fert folia plantaginis aut betæ syluestri similia, sed breuiora, & nigriora, *rube- *Plin. cana scentia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conlium dorso uolutum, quas abdicat cum arefcere incipit: radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite caparum modo exeuntibus: nascitur in montibus & asperis. Radices mēfibz colligendæ. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extensum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodum feruens, neque saluam subinde ciens, (huiusmodi autem strangulat.) Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiant. Partus impositum necat, menses pellit, ster-

nutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactum, absument carnes si coquatur una. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut plisane succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Præparatio corporum, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime à Philomede Siculo Ennensi, cui nunc assentimur: quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pulvis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitus non intempestive medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. CAP. CXXXIII.

Helleborum nigrum, appellatur melampodium, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus, furens in se Proctidas, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cruci, quod in Anticyra sesamoides vocant:

cant: quo deiectiones moliuntur: radicibus cohæ-
ret nigris, tenuibus, à capitulo capæ simili confi-
bratis. quarum est vsus: in collibus, asperis, & si-
tientibus locis enascitur. Optimum est, quod ex
huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum
inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corporu-
lentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre
gustū, feruensq;: cuiusmodi est in Helicone, Par-
naso, & Aetolia natum: attamen Heliconium
præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, de-
trahit bilem pituitasq;: datum per se, aut cum
scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis:
decoquitur vel cum lente & in sculis, quæ purga-
tionis causa sumptitantur. Prodest morbis comi-
cialibus, melancholicis, insanientibus, articula-
rijs doloribus, & resolutis. Menses indutum trahit,
partus necat, purgat fistulas impositum, & ter-
tia die detractum. Item contra grauitatem audi-
tus in aurem demittitur, ibique in alterum aut
etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat,
illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino
oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto
medetur: dentium dolorem collutione mitigat: ero-
dentibus medicamentis commiscetur: hydropicos
rum ventri vtilissimè imponitur factum ex eo, fa-
rina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum
proximè radices vitium, vinum purgandi faculta-
te donat. Huius resparsu domos expiari arbitran-
tur: quare inter fediendum stantes, Apollinem

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquilæ volatus: aduolare enim non sine periculo tradunt: namq; si aus effossionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effoditur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. CAP. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longior folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq;: semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Sylvestris cucumer. CAP. CXXXVI.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmentis

menta satini refert: radice candida, magna nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totū amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitiliginem absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, praesertim in hydropicis: (deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet) radice selibra, in vini praesertim Libyci hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triduum, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum, quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: post die impoſito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simulque carnosum quod haesit cribro, quò facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam peluim demittitur. Coacervata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pres-

sa abijciuntur. Humor in pelui agitatur, & linteopertus Soli exponitur: dūmque steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc verò identidem fieri solet, donec existens aqua lique scat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccātūque in pila, ut dictum est, conerunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionē, mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui cinerūq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo amyli immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chalci duo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam vtriusque parte extrahit. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deiectionē moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea
cyat

cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeatur: ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè penna oblinito: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resolutio, somnum inhibeto. Porro his qui eximiè vacuantur, continuè vinum, & oleum dari conuenit: etenim vomendo restituntur. Quòd si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, pomi, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pessa subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosq;: fert florem glastii, & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsæ dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent: prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniã pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumat

matissimum gingivarū sistit: vlcera oris manālia,
sū melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

THapsia nomen ideo accepit, quòd in Tha-
pso eiusdem nominis Insula primum inuen-
ta sit. Tota verò natura ferulæ similis est: graci-
liore caule: folijs fœniculi: umbella anethi in cacu-
mine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: se-
men quale ferulæ, latiusculum, sed aliquantò mi-
nus: radix foris nigra, intus candida, longa, a-
cris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ra-
tio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inci-
duntur: aut radix in fornicis speciem in se exca-
uata, cooperitur, quòd merus succus confluat: oportet
illuc sequenti die se conferre, & congestum suc-
cum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, &
succus organo per quallum expressus fictili cras-
so insolatur. Aliqui folium vnà terunt: sed ina-
validior huiusmodi succus. Hoc autem interest,
quoniam qui ab radice manauit, grauius olet,
& humidus permanet: è folijs autem extractus,
exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui
succum colligit, stare debet non obuersus vento:
aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet:
quoniam ob halitus acrimoniam facies vehemen-
ter intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ:
ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas
partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cor-
tex radice, quàm succus, purgandi vim habent,

&

& lacteus succus in aqua mulsa potus: nã vtrinque
 hilem extrahunt. Radicis modus, quaterni obo-
 li, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, ter-
 ti oboli: lactis, obolus vnus: quod eo amplius assu-
 mitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio con-
 uenit suspiciosi, & diuturnis laterum doloribus,
 reiectionibusque, datur in cibis aut obsonio, qui-
 bus difficile sit vomere. Tam radix, quàm succus
 omnium maximè, quæ pares cum eis vires adepta
 sunt, vim habent extractoriam ex alto, vbi ex-
 imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas
 aliò transferenda est: vnde succus illitione, aut ra-
 dix recens affrictu, alopecias explent. Radix suc-
 cusque cum æquis ceræ thurisque portionibus, su-
 gillata liuoresque tollunt: sed non plus binis horis
 dimittantur: locus deinde aqua maris calida fo-
 ueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle il-
 litus succus: lepras tollit: tubercula discutit, per-
 unctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, la-
 terum, pedum, articularumque valetudinibus vti-
 liter illinitur. Valet ad integendam colis glandē,
 is qui natura, non circumcissione, curti sunt: tumo-
 rem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus,
 præputij iacturam resarsit.

ANNO TATIO.

* Sine foliis, Spartium, vt in agro Monf-
 pessulano eius feracissimo sæpe obseruaui
 (a G. Rondelletio eius loci clarissimo Me-
 dico primùm admonitus) cùm primū erum-
 pit,

pit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tempore visum Dioscoridi) exultur, adeo ut ramuli eius iuncea deinde appareant. Est tamen hoc diuersum plane ab eo, cuius Plinius lib. xix. cap. xi. meminit. Ceterum an spartiū hoc loco depictum, sit idē cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quam eorū iudicio subscribere, qui diuersi generis plātas esse contendunt: & pro genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cum lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostentant.

Spartium.

CAP. CXXXIX.

Spartion frutex est, longas ferens virgas, * si ne folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vires vincuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albæ violæ, luteum. Purgant per superna vehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidā marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

SIL

Silybum.

CAP. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamaleon-
nis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur.
Radiciſ succus drachmæ pondere potus, vomitio-
nes ciet.

Glans vnguentaria.

CAP. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myria-
cæ similis, magnitudine auellanæ nucus, cu-
ius nucleus græcarum nucum more tritus, humo-
rem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vti-
tur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, &
Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, res-
cens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ
pondere pota, lienem absumit: cum loliæ farina, &
aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras lepræque
decocta in aceto, vitilignes & nigras cicatrices
cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos
& papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomi-
tiones mouet, & aluum cum hydromelite resol-
uit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimi-
tur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstrin-
git: verum tussæ & expressæ succus abstergenti-
bus medicamentis adycitur, quæ aduersus pruri-
tias & scabritias idonea sunt.

Narcissus.

CAP. CXLII.

Narcissum sunt qui vt lilium, liriū appella-
larint, folia porro similia, tenuia, multo mi-
nora, & angustiora: caulis vacuus, & sine for-
lyis, supra dodranem attollitur: flos albus, intus

croc

croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus, suavi odore: ceteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, vomitoria est: ambustus igni prodest, cum exiguo melle trita: praecisis nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: vitia cutis in facie, vitiliginisque cum semine vrticae, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit concoctio: ni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum bolij farina, & melle.

Hippophaes. CAP. CXLIII.

Hippophaes, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, surculaceo frutice, undique denso & largo, folijs oleae, longioribus, mollioribusque: inter quae candicantes spinae emicant, siccae, angulosae, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsiae, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicib

dicibus siccatus tunditur, & cum aqua mulsa dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, uti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIII.

Hippophæston, id, quod aliqui hippophaes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaes, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitasque detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitijs, & orthopnoeæ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

Cici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor provenit parua siue taputia maior: altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & niuioriore: ramis, caudicibusque cauis, in arundinis morem: semine in vuis asperis, quod corticibus exitum, ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibus foedum, lucernis emplastrisque utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt: vomitionesque mouent, sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosque expurgat.

B

Folia cum polenta trita, inflammationes oculorū,
tumoresque leniunt: rigentes mammas cohibent.
eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali. CAP. CXLVI.

Tithymali genera septem, quorum masculus,
characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter, myrtites, qui foemina existimatur,
eumque myrsiniten aut caryiten vocant: tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: folijs olea circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat: trahit pituitam bilemque, binis obolis in posca sumptis: & cum aqua mulsa, vomitiones mouet. Appetente vindemiarum tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasve guttas instillant, ut cum his inarescant: quas ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quò ventus aspiret, stare quenquam, neque

man

manus oculis admouere conuenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collum, scro-
tumque genitalis, adipe aut oleo cum vino perun-
gere. Fauces autem exasperat: quapropter cata-
bolia, cera aut decocto melle oblini par est, & hoc
modo dari: binas tamen ternasve ficos, purgatio-
nis gratia, sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo,
berunctos in sole capillos euellit, renascentesque
flauos, & exiles efficit: denique omnes perimit.
Dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed ce-
ra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & lin-
guam vitiet. Tollit illius impetigines, formican-
tes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem re-
presentant. Valet aduersus pterygia, carbuncu-
los, phagedænis ulcerum, gangrænas, fistu-
lasque. Legitur semen autumnis, & siccatum sole
leuiter tunditur, feruefactumque loco mundo repo-
nitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei
succus effectum præbent, dimidio acetabulo pota.
Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio,
& caseo contuso. Radix drachmæ pondere in hy-
dromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum
aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten voca-
runt, similis suapte natura daphnoidi: folijs myr-
ti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, &
pungentibus: ramulos ab radice u. titit dodran-
tales: fructum fert alternis annis, nuci similem,
mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Suc-

cus, radix, semen, folia, consimilem antedicto fortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones invalidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellant. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque senisve à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, parvis, oblongis, in versis quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. Helioscopi nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Coligitur succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamen usque adeo validæ.

Ciparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem piceam æmulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet, cui eadem vis quæ superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus: folijs myrti tenuioris: fructu
char

characia. Eiusdem effectus, cuius superiores, simili-
 que modo reconditur. Platyphyllos, verbasco simi-
 lis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt
 aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ inspersus. Re-
 liqua tithymalorum genera, quæ suprâ scribuntur,
 idem efficiunt.

Pityusa. CAP. CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat,
 etsi tithymalorum generi assignetur. caulis
 supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: fo-
 lys piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut pur-
 pureo: semine instar lenticulæ, lato: radice cras-
 sa, candida, succo referta. quibusdam in locis fru-
 tex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per al-
 uum radix, drachmis duabus data in aqua mul-
 sa: item seminis drachma: succi cum farina sub-
 acti cochlearium, in catapotio datur: modus fo-
 liorum drachmæ tres.

Lathyrus. CAP. CXLVIII.

Lathyrus, quam aliqui tithymalum appel-
 lant, eamque tithymalorum numero adscri-
 bunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digita-
 i crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine
 alæ, & folia in caule oblonga, amygdalini pro-
 xima, latiora, & leuiora: quæ autem in summis
 ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolo-
 chis, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine
 fructum summus surculus gerit, triplici loculamen-
 to insignem, rotundum, ceu capparin, in quo gra-

Officinis
 Cataputia
 minor.

na intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, erius maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquantur ad eisdem effectus.

Peplus.

CAP. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. unicam radicem habet, supernuacua, ex qua fruticat: nascitur inter viætes, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus insus & feruesfactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho potio: obsonijs inspersa conturbat aluum: muria conditur.

Peplis.

CAP. CL.

Peplus, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, inferuè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo.

peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamaesyce. CAP. CLI.

Chamaesyce aliqui sycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepium planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant, in pessa appositi, tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo, alius resoluitur. Succus simili effectû prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum vtilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosiq; nascitur.

Scammonia. CAP. CLII.

Scāmonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præseferant: folijs helxine, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangularis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graecolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit vt in canum confluat succus, qui conchis demum ex-

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis inglandium folijs, profun-
 dunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur au-
 tem scammonium laeve, nitidum, rarum, & colore
 quam simillimum taurino glutini, fungosum, te-
 nuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae de-
 portatur. Nec attendere solum par est, si linguae
 tactu albescat (hoc enim evenit adulterato, quod
 admisto fit tithymali lacte) sed longè magis an-
 tea narratis. Item si non vehementer linguam ex-
 urat, id quod misti tithymali argumentum est.
 Natione autem Syriacum & Iudaicum deterri-
 ma habentur, grauia, densa, erui farina & tithy-
 malo vitata. Succus drachmae unius aut quater-
 num obolorum pondere haustus, ex aqua pura vel
 mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad
 resoluendam alium binos obolos cum sesama, aliòve
 semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-
 gationis causa, succi tres oboli, cum duobus vera-
 tri nigri & aloes drachma una. Fiunt purgatori-
 sales, drachmus viginti succi scammoniae, in senos
 salis cyathos adiectus. Horum modus proportionem
 virium: integer quidem, tria cochlearia: medius,
 duo: minimus, unum. Radicis drachma una aut
 altera purgat, cum ijs quae retulimus. Nonnulli de-
 coctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum
 hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadi-
 cis utili. Partus enecat succus, vulvae in lana sub-
 ditus: tubercula discutit cum melle aut oleo illi-

tus:

tus: decocto in aceto peruncta lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Chamælea. CAP. CLIII.

Chamælea surculosa fruticat, ramis dodran- Officinis talibus: folia oleæ similitudinem habent, te- Mezereon, nuiora & amara, quæ gustata linguam mordent: Arabum mo- & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, re. folijs præsertim in catapotio deuoratis: namque duæ absynthy partes, adiecta chamæleæ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in ventre non liquescunt: siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. CAP. CLIIII.

Thymelæa est, qua granum gnidium, quod Granum est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo- Gnidium. linum vocant, quoniam satini lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas edit perpulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitudine: folijs chamæleæ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque, si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur: verum fauces adurit. Itaque cum farina aut polëta, aut in ruæ acino dari debet, aut melle cocto obductum deuor-

rari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini potione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina vna acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui coccongnidium fructum esse chamæleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Sambucus.

CAP. CLV.

S Ambuci duo genera: vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, ternaria, quaternaria, ex interuallis circa ramos exeunt, grauius odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculusq; circinatæ umbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus, chamæactæ vocatur, Romanis ebulum, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq;, graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci flore & acino eiusdem: radicibus

dice

dice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem
 vtriusque vis, & vsus exiccans, alio detrahens
 aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more co-
 quuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Cau-
 les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix
 in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiu-
 uat: prodest viperarum morsibus, eodem pota mo-
 do: vulvas emollit insidentium decocto, patefacit
 earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino
 poti eodem funguntur munere: denigrant capillos
 illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex polenta illi-
 nantur, inflammationem mitigant: ambustis &
 canis morsibus illitu profunt: vlcera quæ dehiscunt
 in fistulam, agglutinant: ijs, qui podagra ten-
 tantur, cum seuo taurino aut hircino profunt il-
 lita folia.

Pygnoconomum. CAP. CLVI.

PYgnoconomon constat eruce folijs, acrioribus,
 scabris & crassis, caule quadrangulo: flore
 ocymi: semine marrubij: radice nigra, aut palli-
 da, rotunda, exigui mali figura, terram redolente:
 inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia, &
 tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tumores
 discutit, illitum cum polenta, & spicula, adauctosque
 corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula,
 panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsâ duum
 drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem ex-
 trahit.

Apios,

Apios.

CAP. CLVII.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice * hastulæ regie, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda: intus habet corpus cæcidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilē pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota vtrunque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat penna selectum, exiccatur. Purgat vtraque parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis.

CAP. CLVIII.

Coloquintida officinus.

Colocynthis sarmenta foliaq; satini cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cæperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus admotæ enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto & nitro infernescat, hoc

hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua mul-
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo
refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta
alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur:
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymum.

CAP. CLIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, satureiæ Aliud à no-
simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in stro Epithy-
eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cū mel-
le detrahit pituitam bilem q; atram, per inferna.
Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, ace-
tabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle,
sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia &
Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

Alypon surculosa herba est, subrubra: graci-
libus ramulis: tenuibus folijs, flore molli,
eui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acri suc-
co, semine epithymi: gignitur in maritimis, maxi-
mè Libyæ, quàm largissima: quanquā alibi quoq;
plurima prouenit. Semen atram bilem deicit, sē
mensura epithymo pari cum sale & aceto suma-
tur: verū interanea leniter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP. CLXI.

Empetron aliqui * phacoides vocant, nasci * Galenus
tur in montibus, & maritimis, salso gustu, prasoides.
sed quò propius terreno fuerit, amarius sentitur.

Tra

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris.

CAP. CLXII.

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo praelongae mittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensis solam, longioribus ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis vuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hydropicis datur. Vuae eius, vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viticulae, cibi gratia, sale condiuntur.

Vitis alba.

CAP. CLXIII.

Officinis
Bryonia.

Vitis albam aliqui bryoniam vocant. Folijs, viticulis, papinisque, satiuam vite imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur fructus rubens in vua dependet, quo coria pilis spoliuntur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur: itaque vlcerum phagedenis, gangraenis, chironijs, putrentium tibi arum tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & facinoraco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usque dum lique scat: sugillata tollit, & reducias

com

Committit inflammationes discutit illita ex vino:
 suppuraciones rumpit: medicamento aptè immi-
 scetur, quod carnem exest: infracla ossa extrahit,
 trita & imposita. Datur comitialibus in potu dra-
 chmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest attoni-
 tis, & vertigine laborantibus, consimiliter assum-
 pta. Contra viperarū ictus pota drachmis duabus,
 auxiliatur: partus necat, mentem interdum sub-
 turbat: foeminarum locis apposita, partus secun-
 dasq; morātes trahit: cit urina pota. Eclegma ex
 ea fit cum melle, difficilè spirantibus, strangulatis
 oppressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterum do-
 loribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, trigin-
 ta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico.
 Ad muliebres infessus decoquitur: siquidem vulvas
 purgat, sed abortū facit. Succus è radice vere ex-
 primitur, qui trahit pituitam, cum aqua mulsa po-
 tus. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illini-
 tur. Lactis abundantia facit succus eius, si cum tri-
 fico decocto sorbeatur.

Vitis nigra.

CAP. CLXIIII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam
 vocant, folia fert hederæ, smilaceis proxi-
 ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
 minus arbores, quasi adminicula, comprehendit:
 uetus racematim coherent, qui inter principia
 virent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-
 lis nigra, intus buxæ colore. Viticulae, quæ pri-
 mo germinum partu erumpunt, in olera recipiun-
 tur:

tur. menses pellunt, urinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadē, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

CAP. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa cæspitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subadstringente gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix latus lineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammoniæ aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potus & illitus cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contrà, evanescens abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix scemina folijs est filicis, furculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent: aliquæ etiamnum rubræ inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: potus cum vino, drachmis tribus,

ter

eretes tineas eiciunt: dat & fœminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortû, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus & cicatrici reputantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus melitur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur ut ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, balmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui berinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida & farina aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatus efficaçiter illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos sunt.

Dryopteris. CAP. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multò minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilotrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorẽ euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

C

Cnicus.

CAP. CLXVIII.

Officinis, **C**nicus folijs constat oblongis, per ambitum di-
 Cartamus. Cuisis, asperis, spinosis: caule sesqui pedali: capi-
 tulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine
 candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore
 in obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi succus
 cum aqua mulsa, vel iure gallinacei alui purgat,
 sed stomacho aduersatur. Ex eo autem sunt offula,
 quæ placentulas vocant, adiectis succo amygdalis,
 nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt.
 Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis in-
 glandis magnitudinem impleant: è quibus ante
 cenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio tem-
 perandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amyg-
 dalorum tostorum & delibratorum cyathi tres,
 anisi sextarius unus, aphronitri drachma una,
 cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus
 lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui faculta-
 te donat.

Mercurialis.

CAP. CLXIX.

LYNOXOSTIS, aliqui parthenion, alij hermubota-
 nion appellant: folijs constat ocyni, helxine
 cognatis, sed minoribus: ramulis duplici genicu-
 lorum nodo cinctis, alarum cauis multus: fructus
 foemine, copioso, quandam racemorum speciem
 præbente: mari, è foliorum sinu dependente, par-
 uo, rotundo, ceu binis testiculis una coherentibus:
 frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleri-
 bus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua,
 epo

epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat vt ma-
res gignantur, hunc facere: vt facmina, illam, si à
purgatione bibantur, & trita folia genitalibus
admoneantur.

Cynocrambe. CAP. CLXX.

CYnia aut cynocrambe, cauliculum binum do-
drantum altitudine emittit, mollem, subalbi-
dum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis in-
terstitiis subalbida: semen folijs adhæret, paruum,
rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient:
oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam
& bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium. CAP. CLXXI.

HELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis
caudæ, vnde scorpuro ei nomen: & quo-
niam folia cum sole circumagat, heliotropion dici-
tur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, &
maiora ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe
quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumi-
ne candidus, aut subfultus incuruatur vt scorpio-
nis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in
arboribus. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus
potu pituitam bilemq; per aluum extrahit:
scorpionum ictus ex vino potum, & illi-
um, prodest: ad alligatur ad conceptus arcendos.
Aiunt per horam vnā ante accessiones, seminis
grana quatuor cum vino quartanas finire: tria
verò, tertianas. Illud semen fornicantes vex-
rucas pensilesq; & thymos, & epimychidas exic-

cat. Folia infantium de stillationibus, quas syria-
 seis vocant, podagris, luxatisq; vtilissimè illinun-
 tur: menses cient: partus trita & imposita pellunt.
 Heliotropion paruum nascitur in palustribus,
 iuxta lacus, folijs, antedicto proximis, rotundiori-
 bus: semine, acrochordonum verrucarum modo,
 pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota,
 adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, la-
 tas tineas teretisque excutit. Pensiles verrucas,
 quæ acrochordones vocantur, cum sale illi-
 ta tollit. Scorpioides herbula est, folijs
 paucis, semine caudæ scorpionis
 effigie. Illita scorpionum
 ictibus præsentat
 neo est au-
 xilio.

QVARTI LIBRI
 FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

Liber V.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



Superioribus quatuor libris, amicis-
sime Aree, tradidimus de aromati-
bus, oleis, vnguentis, & earundem
lacrymis ac fructibus, itē animali-
bus, melle, lacte, adipe, cerealibus,
oleribus, necnon de omni radicum, herbarum, suc-
corum, seminūque ratione. In hoc autem totius
operis quinto differemus de vinis & metallicis, &
vite nostram commentationem auspici.

Vitis vinifera.

CAP. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolo-
res illitus mitigant, & inflammationem sto-
machi ardorēque, cum polenta: folia etiam per-
se, ut quæ refrigerent & adstringant, imponi so-
lent. Potus eorum succus dysentericis, sanguinem
excreantibus, stomachicis, & grauidarum mala-
cia medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua
capreoli & poti. Lacryma vitium, quæ veluti gum-
mi in caudicibus concrescit, ex vino pota calculos

C 3

pellit : illita lichenas & psoras leprâsque nitro prius persictas sanat : eadem cum oleo sepius pilis illitis, psilothri effectum habet : maximeq; sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt : qua & peruncta verrucarum infor- micationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractus in sede condylomatis, & thymys, illitus ex aceto medetur : prodest luxa- tis & viperarum morsibus : contra lienis inflam- mationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorum generum est : alterius vua non maturescit, sed flore tenuis cenanthen nomina- tam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & claviculae, quibus repunt, vim habent cultae viti si- milem.

Vua.

CAP. II.

Vva recentes aluum turbant, & stomachum inflant : innocentiores, quae decerptae diu pependere, (ideo quod in eis copia humoris exicca- tur) utilisque sunt stomacho, agrisque, atque cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatae, ori & stomacho gratæ sunt : aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excre- antibus conveniunt. Similesque, quae in musto fue- re. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis in- festant. At quae solem prius passæ in aqua coele- sti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ar- dentibus & longis febribus salubres. Reconditæ

vin

vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, celiacos, & fœminas fluxione vuluæ laborantes iuuat infusa: ad defeciones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent, stomacho vtiles sunt: inspargitur farina tostorum, plentæ modo, dysentericis, & celiacis, & solutus stomacho. Vua passa alba adstringentior est: prodest esitata caro earum iussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleus: & decocta in patinis cum melle, admissa milij ac hordei farina & ouo, valet ad purgandum caput: eiusdemque gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fanos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles ringues illita, celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. III.

OEnanthe vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet sicili non picato, collectaque substrato linteo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac cum de vrinæ vitilis: aluum sistit, ac sanguinis excretiones: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus tam viri

dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agylopos, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat, pessus miscetur, ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ & vino illinitur. Cinis crematæ in testâ, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduvias & pterygia, abscedentes gingivas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium.

CAP. IIII.

Omphacion, succus est acerbæ ruæ, nondum maturefcentis, è Thasia vite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur, semperque quod cervicis vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: nocturne à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concreescere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, ruam, ulcera oris, humida gingivarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vulvæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum convenit.

Bib

Bibitur ad recentē sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & ac quatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura. CAP. V.

VIno vetere nerui leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare ca uendum ijs, qui intestinae alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouū inflat, aegrē coquitur, insomnia parit graua, & vrinam ciet. Aetate medium, vtraque vitia fugit: quare ad victus sanorum aegrorūq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod medium est, medias inter vtrunque vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distāt: siquidem dulce crassius partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt mustum, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per vrinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusq; vrinam expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner-

C S

uos infestat, alio aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod vis sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion, aut protropion: & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion aut hepsema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsythia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pharicon, toxica & concretum ingrumos lac: item contra remum, ac vesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflant tamen, & stomacho aduersantur. Prunatim, prodest melampsythium, si venter rheumatismum sentiat. Album, magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum nervus officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra venena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta vocant, ut quæ admistam sapam recipiunt, caput implent: temulentiam gi-gnunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit, stomacho utile: sed vesicæ nocet, atque ijs, qui visus

visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
minimè idoneum. Albana crassioribus constant
partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem
emolliunt (sed concoctionem non aequè adiuvant,) &
& nervosa minus infestant: vetustate, eadem
austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum
sit dulce, est & Albano crassius: corpus & co-
lorem alit: ægrè tamen coquitur. Surerninum,
valde austerum est: quare intestinorum & sto-
machi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, ca-
put minus tentat: inueteratum suavius redditur,
& stomacho utile. Adrianum & Mamertinum
in Sicilia aequè crassæ partibus gignuntur: mo-
dicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, mi-
nusque, ob suam tenuitatem, nervos tentant. Pa-
rætypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odo-
ratur ac tenuius est: quare liberaliter epotum
fallit. diu servat ebrietatem, & soporem adfert.
Istricum, Parætypiano simile est, sed urinam ve-
hementius pellit. Chium tamen antedictis mol-
lius, & aptum potui est: bene alit, & minus ine-
briat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis
utile. Lesbium facile membra subit, Chio leuius,
& aluo idoneum. Ephesium eandem vim habet,
quod Phygelites nominatur: verum Asianum è
Tmolo monte, Mesogites appellatum, capitis do-
lores ciet, & nervos ledit. Coum verò & Cla-
zomenium, quoniam multam sibi maris aquam
vendicant, facile corrumpuntur: flatus movent,
aluum

alium turbant, nervis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget: somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium morsus, & omnium ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesque præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, ventera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusque in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedenica, & fluxionibus obnoxia, comode perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Paratypia num ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Marmertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò & nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem

pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modicè cibos proluere, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: siquidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorque potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, utilis: namque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentia remedium adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acriua, paulò ante maturitatē decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malitiæ, & crudus: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini metr

metret & extracta fuerint calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius, qui remansit, binis salis sextariis, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum videndum: etenim celeriter exolescunt. Conuenit agris, quibus timemus noxam vini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, lora vires habens, hoc modo: Pares aquae, & musti mensura coquantur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Aly marinae, & coelestis aquae, mellis & musti pares miscentur portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri vna nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & ceteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites.

CAP. VI.

Melitites datur in longis febribus, quae stomachum infirmarunt: namq; alium leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitis, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, melis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quae
magis

magis ad effervesendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumque effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsū. CAP. VII.

Mulsū ē vetere vino austerōque, & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus corpus alit: media ætate, alio prodest, urinam pellit: à summo cibo sumptum nocet: & inter iniuria potum, implet: dein appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsū duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruētis, vnum mellis adiiciunt: & ubi ferbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsā. CAP. VIII.

Aqua mulsā easdem quas mulsū vires possidet. Cruda vitimur, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: ut ijs, qui venena hausserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illò dixere microsphyctos, tuſſentibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiuumque, quod aliqui hydromelis propriè vocant, mediā ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus, respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inmetenati tamen
usus

usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluuie aquae veteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydromeli appellant, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius conferi conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

CAP. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, coelum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps, & quae ne minimo quidem tempore in praecordiis commoratur: ad haec, quae & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fetus adhibeatur, elicit & discutit: nervorum vitij, & pernionibus, ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmati. Ad mouendas deiectiones tepescit infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes

tes, foueri vtile est: liuores fottu discutit: ad venenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpiorum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, neruisque, balnea ex ea vtilis: hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aqua mistione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam praequant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinae aut piscium inscula, ad domandam morsus acrimoniam.

Thalassomeli.

CAP. X.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem aquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, & picato vase per Canis aestus insolatus. Alij ad binas marinae coctae singulas mellis adijciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

Acetum.

CAP. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiam excitat: erumpentem vndecunque sanguinem, potu in se sive sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimit

D

procidentia sedis, vuluæq; item abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phas-
gedenas vlcerum, nomasque fotu continuo cohi-
bet: podagricis calido fotu, cū sulphure auxiliatur.
sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, gra-
uitatem aurium, & sonitus, sibilosque feruentis va-
por proficit: instillatum quoque aurium vermes
necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta ace-
to spongia admoueat, & pruritus permulcet.
Contra venenatos serpentium ictus, qui refrige-
rando nocent, calidum commodè fouetur: & frigi-
dum, is, quæ exurens virus eiaculantur. Calidum
potum, atque vomitionibus redditum, aduersus
omnia venena efficax est, præsertim contra meco-
nium, & haustam cicutam, conglobatum in ven-
tre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, ta-
scumq; cum sale. Haustu voratas hirudines, si sor-
beatur, eicit: tussim veterem mitigat, & recen-
tem laceffit. In orthopncea calidum commodè sor-
betur, gutturus fluxiones gargariatum inhibet,
anginis & vnae procidenti conuenit: contra den-
tium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

Acetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,
salus

salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina. atque ubi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiâmve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fitu, putrida ulcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur, & prociuiam sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: furfures & manantia capitis ulcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

Thymoxalme veteres vtebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrôsq; trahit. Hoc modo faciliatur: Thymiri acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegii, polentæ, singulorum exiguae portiones in vas coniunguntur, aquæ terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

Scillinum acetum. CAP. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit : Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiecit. Etæque lino segmenta modicis intervallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus : mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenus diebus in sole madescit : post eum numerum dierum scilla eximitur, & expressa abicitur : defecatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multò magis humorum lentitias digerit : ginas humore prægnantes collutione stringit firmatque, & motos dentes stabilit : putredines oris, & graues halitus tollit : durat fauces sorbitione, & callosas facit : vocem expedit, & limpidam canorâque reddit. Datur stomachicis, agrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis, mente capitis : item vulvarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. Imbecillos admodum recreat : corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat : oculorum aciem exacuit : tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur quotidie ieiunijs sorbendum, inter initia exiguum, paulatim ad au

adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vt dictum est, scillam, & sole siccata contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in videnos sextarios musti recens ac boni demergito: vbi trimestri spatio maderit, elutriatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito. Licet quoque sic humida scilla vti: In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio: Scilla dissecta & repurgata tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defecatum & excolatum vinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item is, qui reuomunt cibum, & si pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquae inter cutem, regio morbo, difficili urinae, torminosis, inflationibus, resolutioni nervorum, horroribus longis, vertiginosis, & vulsis. Menses pellit, minimeque nervos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

Marina variè faciliuntur: Aliqui enim statim quum decerpta sunt vuae, aquam

maris admiscant. Alij in area vvas sole siccant: quibus calcatus, marinam adijciunt. Alij passas prius vvas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quae tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint: aluum subducunt: profunt purulenta extusisientibus, aut si dura aluus exerceat. Quae ex Aminaeis vvas sunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creat. Verum quò plenior habeatur historia, ijs, qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quòd frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quaedam ex ijs facilia, minoris curae ac impendij, quae cadunt in vsus: vti quae ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

CYdonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pōdo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defaecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, densi succi cotoneorum tusorum pressorumque adijcere, & ita recodere. Vinum hoc adstringit, prodest stomacho, dysenteria,

ria, hepaticu, renum vitis, & vrinae difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quibus plurimum mellis, quo penitus demersa contegatur, coniunguntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Praestat eadem, quae superior compositio.

Hydromelum. CAP. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquae coctae, & sub Canicula sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites. CAP. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerba vræ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi despumati singulae partes adijciuntur, & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: stomachicus celiacisque conuenit. Vsus post annum est.

Apiites. CAP. XXI.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apiites nomine sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, messilibus, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbata sunt, & adstringunt stomacho vitia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. CAP. XXII.

Fit è feraci vite syluestri, quod vocatur oenanthinum: Sicci flores minus duabus musti ca-

do macerati: post triginta dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, celiacos, & dysentericos.

Rhoetes.

CAP. XXIII.

FIt è puniceus malus maturus quod rhoeten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluvio exortam: stomacho utile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites.

CAP. XXIIII.

RHodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumque minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidus aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteriæ scabritus conuenit.

Myrtites.

CAP. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem excefferint, tuis, & organo expressis. Alii qui ad tertias coquunt. Alii baccas prius sole torrent, & quaternis sextariis contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re

re adstringit: stomacho utile, fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites. CAP. XXVI.

MYrsinites sic temperatur: Rami nigrae myrti cum suis bacculis & folijs tusi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

Lentiscinum similiter vt myrsinites temperatur: nec secus terebinthinum. Nanque bacculi eorū rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicae, & stomachi, & sanguinis profluvio: ulcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vulvae ac sedis in seissione cohibent.

Palmeum vinum. CAP. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydæas, in vrceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquae congijs infundito: quod si ipsum ita dulce esse non liceat, quinque congijs infudisse satis est: post de

D 5

cem dies detracto ab ariditate linteis assumito vini
crassum & dulce, & reponito. Suave illud quidem,
sed capiti noxium: contra fluxiones, propter adstri-
ctoriam vim, efficax: stomachicis, coeliacis. sangui-
nem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita a-
qua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, se-
xtio faciunt: quod tandem acore vitatur.

Catorchites.

CAP. XXIX.

Catorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cya-
pro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quo-
niam pro aqua tantundem humoris adijciunt, in
quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricae,
quae chelidoniae aut phoeniceae appellantur, praeser-
tim nigrae, macerantur, ut diximus, & post decem
dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem mo-
dus aquae, in qua vinacea maduerint, infunditur:
simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto
assumitur. De maceratarum liquor non secus acore
contrahit, & aceti usum praebet. Id tenue est: fla-
tus gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit:
aluo tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactus
ubertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & ele-
phantiasin adfert, ut potio, quam Zython appella-
mus. Aliqui sex amphoras, decem salis sextarios ad-
ijciunt. Alii muriæ amphoræ: quod non facile vitia-
tur, & aluo idoneum fore censent. Alii thymum & fœ-
niculum imo subijciunt, & caricæ superponunt:
& ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è
sycomoræ eodem modo vinum, sed in acetum acre
deg

degenerat: quoniam non ita praeualet vis eorum,
vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. CAP. XXX.

Resinatum vinum populatim facilius solet:
copiosum in Galatia: quoniam vinum illic
coacescat, vna non maturescit, ob calis algorem,
nisi picea resina temperetur. Resina autem cum
cortice tunditur, & amphorae dimidiata hemina
permiscetur. Aliqui, vbi efferbuit, excolant, sepa-
rantes resinam: alij relinquunt. Hac vina vetusta-
te dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & vertigi-
nes faciunt: concoctionem tamen adiuvant, & vri-
nam cienti: tussientibus, ac destillatione vexatis co-
ueniunt: item coeliacis, dysentericis, & hydropicis,
& foeminis fluxione vulvae laborantibus: alius ex
ulcerationibus infunditur. In hoc autem genere
nigricans magis albo constringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

Strobilites sit maceratis in musto nucibus pi-
neis, recentibus, fractisq; praebetq; resinati ef-
fectus. Si quis madefactas nuces pini musto deco-
quat: potum affatim conuenit is, qui tabitudine
conficiuntur.

Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegnum, simili ratione
fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt,
aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet,
vt consudent, congioq; vini minam vnā permi-
sce

scere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, insolare. Facilitiorum vinorum vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina in acorem corrumpantur. Medicata autem vina, recte valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoque ex fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra: diebus quadraginta insolari debet, & defecatum in vasa transferri.

Fit etiam vinum ex baccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tusi antiquae utile sine febre, pectoris laterumque doloribus, torminibus ventris, & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vulvae causarijs, hydropicisq;: facit aduersus ventris tineas & horrores: contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primum marina aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: congis octo musti, uncia picis una aut altera adijcitur: ubi efferbuerit, & constiterit, in vasa diffundit

ditur. Hoc genus vini exalfacit, concoquit, pur-
 rat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocine-
 ris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheu-
 matismo, exulcerationibus in altum recedentibus,
 ussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus,
 & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Absynthites. CAP. XXXIIII.

Absynthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui
 enim duodequingenta sextarijs Italica-
 rum amphorarum, admistam absynthij Pontici
 libram decoquunt ad tertias: & vbi infuderint
 sex aceti sextarios, & absynthij selibram, ac dili-
 genter permiscuerint, diffundunt in vas: dùmque
 conquieuerit, defæcant. Alij absynthij minam in
 amphoram demittunt, tussamq; & raro linteo de-
 ligatam, in cado musti macerant, binis mensi-
 bus. Alij absynthij quadrantem, alij trientem, &
 nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci
 odorati, calami, elatæ, palmarum singulos sextan-
 tes iniiciunt in metretam musti, & tundentes
 prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis, ternis-
 ve mensibus dimittunt: postea defæcatum vinum
 transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti ca-
 dum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, &
 absynthij drachmas quadraginta, linteo inuolu-
 tas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij
 in senos sextarios musti, absynthij libram, & sic-
 cæ pini resinæ sextantem immittunt, & post de-
 cem dies excolant, & recondunt. Vtile est stoma-
 cho:

cho: urinam cit: tardam concoctionem accelerat
hepaticis, regio morbo, & renū vitij auxiliatur
fastidia discutit: us prodest, quibus stomachus ne-
gotium exhibet: valet contra longam præcordia-
rum distentionem, & inflationes, teretesq; ventri-
tineas, & remoratos menses: contra hausta in-
venena quā plurimum potum, & vomitionibus
redditum, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

HYSSOPITES è Cilicio hyssopo maximè lauda-
tur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusoru-
libra in amphoram musti coniecta, linteolo ra-
cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, ut degre-
uatus ponduscilo fasciculus sidat: vinum post qu-
draginta dies defecatum elutriatur. Contra pec-
toris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim
& suspiria prodest: urinam cit, torminibus, & lu-
moribus februm circuitu repetentibus auxiliatur
menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP. XXXVI.

SIMILI modo chamædrites fieri solet. Excal-
facit, discutit: convulsis, regio morbo, vultu
inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aqua
inter cutem, subuenit. Inueterascens melius red-
ditur. Stæchadites non secus temperatur. Con-
gijs sex, stæchadis minam addere oportet. Cras-
sitiem, inflationes laterū, nervorumq; cruciatus
& perfrictiones discutit: comitialibus commodat

da

datur, cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetum è stœchade herba, vi paulò antè diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum è betonica, quam cestrion psychotrophon appellūt. Herbam semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutere ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi misturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illarum naturas norint, vt vrorum vires coniectura quadam consequi: verum tamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum è betonica acetum, ad eadem vitia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis lineolo colligatus, in quaternos musti sextarios coniectus, & post tertium mensem transfusus. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus. Enapis fit vinum, nomine bunies, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicus, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à artu subducit. Marrubij adulti folia tundi, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc vinum

vinum pectoris vitij, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tusi & cribrati uncias cetum linteum colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra agras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum & prae cordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo est salutare vinum fit, quod eadem quae thymites praestat. Sic quoque organites ex heracleotico organo conficitur cum supradicto. Facit eadem quae thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono vina fiunt eodem quo thymites modo, prosunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod urinam moveant. Fit item est conyzæ vinum, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

CAP. XXXVII.

Aromatites ita fit: Palmae, asspalathi, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi fece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, plu drachmae septem, costi drachmae duae, nardi Syriacae drachmae sex, cassiae uncia, croci drachmae quatuor, amomi drachmae quinque, asari drachmae quatuor: omnia simul trita & linteum colligata in cadum musti demerguntur, & postquam vinum deferbuerit, transfunditur.

Fac

Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrinae, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita & crassitiem extenuat: colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicae vitijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XXXVIII.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit: Myrrhae duae drachmae, piperis candidi drachma una, iridis drachmae sex, anisi drachmae tres: omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex vini sextarios coniunguntur: vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnus mensura. Fit quoque neclarites ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: urinam pellit. E Syriacacardo, & Celtica, malabathroq; vinum facitatur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquae. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos palor decolorat. Aly vnciam, aut sextantem acori, & Celticae nardi quadrantem, in musti ampho-

E

ram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vrinam ciet: hydropicus, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis syluestri nardi recentis & trita cribrataq; bessem, in congiuum musti conijcito, duos menses quiescere finito. Vitale est hepaticis, difficili vrinae, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX.

Radicis dauci contusa drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, praecordiorum, & vuluae menses pellit, ructus ciet, & vrinam: prodest tussi, ruptis, vulsisq;. Salvia vna etiam in musti amphoram, quod idem cum cera micio est, mittito. Valet contra renum, vesicae, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vursa, & suppressos menses. Panacis vna etiam in musti congiuum mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnoea: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquae inter cutem, & serpentium ichibus auxiliatur. Viana ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum uncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, &

vrinae

vrinam mouent. Seminis apij recentis, maturi &
 cribrati uncia nouem in linteis colligata in mu-
 sti amphoram demittantur. Appetitum excitat:
 stomachicus, & difficili vrina auxiliatur: faci-
 les spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & pe-
 troselino, vina eodem modo sunt, & ad eadem ef-
 ficacia. Fit & è flore salis vinum, multò ad pur-
 gandum efficacius, quàm vinum aqua mari-
 na temperatum. Fauces, vesicam, renes, & sto-
 machum infestat: quare neque in secunda, neque
 aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum
 quod phthorion vocant, quoniam partus necat,
 & abortus facit: veratro, aut scammonia, aut
 syluestri cucumere, iuxta radices vitium sato: si-
 quidem vites sibi illorum vires adsciscunt. Id vi-
 num partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ
 antè vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilu-
 tum. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu
 triginta drachmas mittito in congios tres musti,
 & leui igne coquito, donec congi duo supersint,
 defecatumque recondito. Aquosa purgat excre-
 menta, & lienem absomit. Chamælea dum flo-
 ret, cum folijs tusa & cribrata decem drachmarum
 pondere, in musti congium additur. Post duos men-
 ses vinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem,
 hepaticæ, & lassitudine confectis, efficax est:
 item mulieribus, quæ à partu egre purgantur.
 Chamæpitium simili modo fit, ad eadem
 conueniens: vrinam quoque ciet. Librum radicis

mandragoræ concidito, segmenta lino trañcito,
 quod selibram æquat in musti cadum demittito,
 ibiq; esse finito ad mensetres, deinde transfundi-
 to. Media potio, hemina dimidium: bibitur, passo
 in duplum addito. Aiunt heminam vini congio
 mistam, potu soporem adferre: cyathus vnus cum
 sextario vini potus, enecat: mediocris vsus eius,
 doloris sensum aufert: fluxiones incrassat: olfactu,
 potuque, & cum inditur, idem præstat. In com-
 gium musti aqua marina diluti, drachmas duode-
 cim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito:
 dumq; efferbuerit, in marinæ aquæ congios qua-
 tuordecim aut quindecim, vbi pleniusculè fregeris,
 inijcito: post aliquot dies colato, & vtitor. Dato
 cyathum vnum ex aqua balnei in potu, ad aluum
 soluendam, ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio:
 Veratri drachmas viginti, iunci odorati uncias
 duodecim, spicæ Syriacæ uncias tredecim, cri-
 bratas, & linteo colligatas in septem vini Coi
 sextarios diebus quadraginta macerandas indi-
 to, postmodum colato: dabis in potu sesquihemi-
 nam. Aliter: Decoctæ marinæ aquæ ex alto pe-
 titæ sextarios duodecim, veratri candidi libras
 sex, in musti amphora quadragesimo die, quàm
 madefeceris, colato, & vtitor. Alia ratio: Vera-
 tri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas,
 in senis musti sextarijs diebus quinisdenis mace-
 rato, mox colato: & semestri exacto, vtitor. Id vi-
 ni genus abortus facit, & partus necat. Aut vnas

in

in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinum mittito pondo drachmarum viginti, & biduo residere finito, conijcito veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu feminas: fœtus extrahit, contra strangulatus vuluæ efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammonia per menses effossæ, trita, & linteo colligata drachmas quinque in musti congiuum mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primùm Cadmia.

CAP. XL.

EX cadmia generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidis similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet,

terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychiitis, viles: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, excicare, corporis meatus insarcire, excrescentia in carne coërcere, crustas creare, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus camerisque fornacum inhaerente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, præsumma fastigia conuexæ & concameratæ, ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohereant, & inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus concrescunt, & modò genus vnum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide, cui pyritæ cognomen est: in quo etiam monte quedam quasi venæ chalcitis, misyos, soreos, melanteriæ, cœrulei, chrysocolle, atramenti sutorij, diphrygisq; inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione: qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullam suam vim ostendens. Li eo deprehenduntur, quòd sunt cadmia leniores, nullumque alienum mandentibus

sap

saporem exhibent : commanducatus item lapis, dentes offendit : cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia verò quiescens manet, fuliginemque luteo colore aut aereo splendens expuit, vario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multò fiet: sed cadmia nihil enariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda erariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguatur vino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psoriarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in vino, rursumque fictili crudo torrent, donec pumicosa videatur: iterumque tritam ex vino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens: hac spodij vice vtuntur. Lavatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

CAP. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-

E 4

runque ponderosior est, palearum pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab aëriarum officinarum pavimentis & fornacibus eueritur: pompholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: vnum ad aëris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiundo aëre, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatiùs insparserint. Nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygen coit. Cæterum pompholyx non ex aëris modò materia, & fabrili industria factitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè follibus proflata. Cuius faciunda ratio hæc est: In domo gemina contiguatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuque artificis fabricatum: domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis: idem negotium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adiicit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egesta
sufficit

suffitu tenuis pars, & leuis materia in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus, aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capessens, glomusculis vellerum simile redditur. Ponderosius autem in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pavimento coheret. Quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terra collegerit, & spurcitia in acervatione refertur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cæni horrido: & si fraudem non experta, flagranti carbone infuescit, æereum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Si quidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouilolo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet: Ligatam linteo mûdo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculû deferens, immergito: ita enim limosa pars eius ac utilis, effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens,

agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum inutetur: deinde luteo sancibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc idem idem faciunt, donec cinis merus & arenae expers inueniatur. Alij paulatim integrum in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire: pilos autem & paleas lenitate sua in sublime attolli. Ceterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, vt cadmiam, eluunt. Quinetiam lauaturo vino Chio marina aqua diluto, modis, quos supra diximus: & ita redditur adstringentior, quam aqua elota. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur, quae leniter crustas obducunt. Quod si spodion torrere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis lenibus

bus prunis, orbiculos continuo versabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodion: verum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodios sepe numero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, ut in spodii locum suffici possint, antispodia vocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur: iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoque fit è termitè sylvestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis osibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi folijs, vel è buxi coma, vel pseudocypero cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanæ asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodii vicem vsurpantur.

Aes vstum.

CAP. XLII.

AEs vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clavis solutarum nauium, fictili crudo compositus:
sub

subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos vrunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrecentia in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delictum, illitum ve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, sterces ve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eadem vim, sed imbecilliores, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma, quasi resegmentum aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, brevis, ponderosus, modicè splendens, atque cōstringens, qui delimitam æris scobem non recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentium illius

suo

dilatantur ramenta. Fit autem, cum es forma-
 ribus fusum, in receptacula delabitur, per cola fi-
 tularum ad ea pertinetium: tum huic negotio ad-
 dicti ministri, sordes expurgantes, aquam claris-
 simam infundunt, refrigerandi proposito: itaque
 repente concretu, ac addensatione, velut expui-
 ur, & erumpit antedictus flos. Adstringit & ex-
 rescentia coercet: offusam oculis caliginem emen-
 dat, sed magnopere mordet. Quaternum oboloru
 pondere datus, crassum humorem extrahit: carno-
 a narium & sedis vitia absomit: eruptiones papu-
 arum cum vino cohibet. Candidus contra diutur-
 as aurium grauitates tritus, in eas per fistulam
 latu impellitur: vuam, tonsillasq; reprimat, fari-
 na eius cum melle adnota.

Squamma æris. CAP. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypris officina-
 rum clauis, crassa quidem ipsa præstantior,
 quæ helitus, id est clauarus, nominatur. sed ex vi-
 ti promiscuoque ære, aut cædido, vitiosa intelli-
 gitur: quam utpote tenuem, & inualidam damna-
 nus, maxime approbantes crassam, rufam, præ-
 fertim si aceti respersa æruginem contrahat. Vim
 habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem,
 & erodentem: nomas coercet, vlcera ad cicatricem
 perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit.
 Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Addi-
 tur ad oculorum medicamenta, quod genarum sca-
 britiam absomit, & fluxiones exiccat. Lauatur
 hoc

hoc modo : Sicca æris squamma expurgata & felibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessum ierit : abicitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina coelestis imbris adicitur, & distenta manu, squamma quasi destrigenda sit, vehementer confricatur: dūque lentorem emittere coeperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo validè: squāma ad latus mortarij colligitur, ibique apprimitur : quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squammæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lenitiam excernat, & linteo apertum biduo conquiescere finitur, effusaque extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij vi cadmiā lauant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mucrombus decussæ, quam vocant stomoma, eademvis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moriendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis.

CAP. XLV.

Aerugo rasilis fit his modis : In cadum, aut aliud consimile vas acetiū quā acerrimum infunditur : superponitur inde inuersum æneum vas, præsertim concameratum : sin minus, planum: siq; obstructum, nullūque habeat spiramētum: exempto, quo doliolum obturaueris, operculo, decimum post diem insidens ærugo deraditur.

Aut

Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspens
 litur, ne ipsum attingat, & totidem post dies ras
 litur. Aut massula æris, aut lamina vna pluresve,
 vinaceis non recentibus, sed iam acescentibus cō
 luntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex
 lelimata æris scobe æruginem facere licet, necnon
 laminis, quibus bractea auri conclusæ malleo du
 untur: si quis eas aceto respargat, & ter aut
 quater verset, donec æruginem contrahant. Tra
 hunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidi
 bus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus
 erugo efflorescit: adduntque per Caniculæ æstus ē
 quodam specu manare: sed illam paucam & opti
 mam esse: hanc speluncæ effluentem, copiosam
 quidē, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides
 multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant:
 aliqui punice admixto, alij marmore, alij atra
 mento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut
 marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto,
 eruginis portiunculam altero atterimus: siquidem
 eam diffundi constat: marmoris autem pumicisq;
 partes cōeunt non dissipatæ, demūque tractatio
 ne crebra & humoris cōplexu dealbescunt. Quin
 & dentium appressu, si quidem sincera cedit,
 æris, & sine asperitate. Atramentum verò suto
 rium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamē
 tia, adulterata ærugine illinatur, & feruenti ci
 nere aut carbonibus incalescat alterutrum, mu
 tabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium
 acceperis

acceperit: quod id vstum suapte natura talem
 sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scole-
 ciam, duo sunt genera: quædam fossilis est, altera
 factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij æris
 dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cu-
 preo conterito, donec strigmenti crassitudinem
 imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam
 unam, cum salis fossilis, translucentis, aut marini
 quàm albißimi, solidiq; aut certè cum nitri pari
 pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sy-
 dus Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat,
 & cōcretu strigmetosum fiat: ubi autem se in ver-
 miculorum Rhodiæ sinulium speciem coegerit,
 recondito. Efficax & valde boni coloris redditur,
 si duas partes vrinae veteris cum una aceti adie-
 ceris, & alia, quæ dicta sunt, perageris. Sunt qui
 æruginem rasilem, quæ in apparatu non respon-
 dit, gummi misto digerant in formas, & ita ven-
 dant: quod genus, vt vitiosum, improbaturi. Fit
 & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &
 pistillo Cyprij æris, cum vrina pueris impubis,
 qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum ge-
 nera, vsto æri omnino respondent, sed magis effe-
 ctu valent. Sciendum fossilis scoleciam præstan-
 tissimam esse: derasam sequi: postremo loco facti-
 tiam. Mordacissima tamen est hæc, & magis
 adstringens. Aurificum autem ærugo rase respon-
 det. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,
 excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, la-
 crym

crymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum melle cocta: callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyry modo in eas adacta. Ad gingivarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illita: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina excepta, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quancunque velis, minutissime fracta comminui aque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam vrant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri.

CAP. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarum profluvia, admota, potuque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia: condylomatis prodest, gingivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in quacandens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoxiam vocant, eadē potest quæ rubigo, sed ineffica-

F

cus. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortariū plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aquam superfundens, quò facilius quicquid est resolutum incerni possit. Hoc iterum facito, vsquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi confederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quassitam, mortario pistilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alij elimata scobi modicā plumbaginem adiciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hemorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt: & in totum spody effectus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Syncerum plumbum affricctu, marini scorpionis draconisque plagis auxiliatur.

Plumbum vstū. CAP. XLVIII.

Vstetur plumbum sic: Super quàm tenuissimas

mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 inspargito, additisque alijs rursus laminis, interie-
 cto semper sulphure, usque dum vas expleueris, suc-
 cendito flagrante autem plumbo, ferrea rude ver-
 sato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilque
 è plumbo non vstum hæserit: tum demum, ob-
 structis naribus, eximito: alioquin halitus plum-
 bi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem
 in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili cru-
 do, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, &
 circumlinentes operculum, dato exili spiramento,
 vrunt. Alij pro sulphure cerussam aut hordeum
 inspargunt. Alij integras laminas imponentes,
 acri igne vtuntur, & rudicula ferrea continuè mo-
 uent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis hu-
 iusmodi vstio: & si vehementius vratur, contra-
 hit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis
 placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum la-
 uatur vt cadmia, & reconditur. Eosdem effectus
 habet, quos plumbum elotum, sed multò acriores.
 Recrementum plumbi, quod scoriam vocant, opti-
 mum est, densum, fractu contumax, cerussam pla-
 nè representans, nihil plumbosi habens, quod ad
 luteum calorem accedit, & vitri splendorem imi-
 tatur. Eadem, quæ plumbum exustum, potest,
 sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infu-
 sa aqua, & refusa summa aque parte, quæ lu-
 teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 tum absumatur. Dein vbi consederit crassamen-

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondens recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

CAP. XLIX.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitidularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod sibi appellant, atq; platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrecentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. Si sit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in uniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Privatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumque restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deslagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum sit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

Molybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Viti-
tiosa

tiola est, quæ aerem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quadam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur luaturque eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. CAP. LI.

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæne vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatque.

Spuma argenti. CAP. LII.

Spuma argenti quadam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: has sequitur quæ sit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argen-

to, calabritus. Vis autem adstringere, mollire, explorare caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem inglandium, prunæ superpositis: ita accensa follibus, ut conflagret: abstergitur insidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguentes, rursus vrunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Ut argyritidi nominatæ, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partem magnitudine fabarum confracta, chœnicis Atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulus vasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur: triticum abijcitur, spuma argenti vehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teritur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: mane colis excernitur, alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque in albuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccatur

siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat: mouetur quotidie mane & vespere, aqua que superinfunditur, priore nequaquã effusa. Hoc sit triginta diebus: nanque nisi moueatur, crassescit, usque in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum saluginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines con fractam, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquesceus contabescat, exemptamque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram vnã, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscent, lanæque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens: eadem tertio, quæ supra, facito: in summa,

tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper
transfundens in mortarium, ad singulas salis fos-
sitū libras, aducito octogenas spumæ argenti dra-
chmas Atticas, & terito: intermittensque, nitri
quàm albissimi cum aqua diluti drachmas qua-
draginta septem indito: iterum terito, donec satis
candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens
eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore
aqua, ubi confidere desierit, colato: tum novam su-
peradiiciens aquam, manibus probè versatam si-
nito ut confidat, ac rursus per colum trañcito. Al-
ternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisque
effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. Postre-
mò in fictile novum translata, colato sensim
omni humore, Soli quadraginta diebus sub Cani-
culæ sydus exponito, & siccata vitior. Elotam
autem constat ad oculorum collyria prodesse, &
ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas fa-
cies, & cicatricosas, laceratasque, & macularum
plenas.

Cerulea.

CAP. LIII.

Cerulea fit hoc modo: Infuso in vrceum oris la-
ti, aut fictile labellum quàm acerrimo aceto,
laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, sub-
iecta prius arundinea tegete, firmato: superie-
ctis que velaminibus, ne halitum expiret acetum,
ubi resoluta fuerit, defluensque deciderit, humore
purum ad summa delatum colato, crassamentumq;
transfundito: debet quoq; siccari in sole, mox tru-
sat

satili mola teri, aut alijs tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq; vicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt, qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & derafo censu imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos velit digere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supra dictum opus obeundum est: ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam imposito, & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vitior. Est & illud vrendi genus: Trita putinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à quibusdā dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo.

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, ex-
 tenuareq; insuper excrescentia leniter reprimere,
 & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, &
 emplastris, quæ liparæ vocantur. pastillisq; est au-
 tem lethalis eius potus.

Chrysocolle. CAP. LIIII.

Chrysocolle laudatissima Armeniaca, colo-
 rem porri quàm simillimè reddens. Secundū
 locum sibi vindicat Macedonica, & proximum
 Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur
 quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi
 hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa ma-
 nu ad pilam vehementer fricato, & statim quàm
 confederit, colato. Alteram infundens aquam, rur-
 sum terito: hæc vicissim prosequere, donec pura
 sinceraq; spectetur. Dein siccato in sole, & ad vsus
 recondito. Quod si vrere volueris, ex ea terēs quod
 satis esse videbitur, patinis supra carbones appo-
 nito, & alia facito, quæ suprâ diximus. Dos chry-
 socolle ad purgandis cicatrices: excrescentem car-
 nem coërcet: adstringit, purgat, excalfacit, & mo-
 dicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta
 intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem
 inferre possunt.

Lapis Armenius. CAP. LV.

Armenius lapis præfertur leuis, colore cœ-
 ruleo, perquàm æquabilis, calculo carens,
 & friabilis. Eadem quæ chrysocolle præstat, sed
 inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pilos in
 pal.

alpebris alendos.

Cœruleus. CAP. LVI.

Cœrulei origo ex ararijs metallis in Cyp^{ro}: copiosior ex arena litorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis, lauatur ut cadmia. Vim habet reprimen^{tem}, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. CAP. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum insectoria dant officina: & est spuma purpurea, innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & læue. Inter medicamēta est, quæ leniter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra. CAP. LVIII.

Ochram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, nō lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat: caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. CAP. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarin minio eandem

dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantem halitū eructat: itaque facies incolæ vesicis obvelant, ut per illas spectent, nec respirando noxiū aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aethiopia defertur, & magno constat: hætenus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustus igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum viuum. CAP. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusu siue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt: siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

iam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim
ernicalem habet: suo enim pondere interna ex-
st. Remedio est lac multum subinde potum, & vo-
nitionibus reiectum, aut vinum cum absynthio,
aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origa-
num, vel hyssopum cum vino, auri limata scobs, id
est, ramentum quam tenuissimum epotum mira-
bile est auxilio.

Rubrica Sinopica.

CAP. LXI.

Rubrica Sinopis maximè probatur grauis,
densa, ad iocineris imaginem vergens, cal-
culorum expers, concolor, cum diluitur, impendio
fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibus-
dam, expurgataq; defertur in Sinopem urbem, in
qua venditur, vnde cognomētum accepit. Vim ha-
bet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem,
& adstrictoriam: quapropter vulnerarijs empla-
stris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs cō-
misceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut cly-
stere infusa: datur iocineris vitio laborantibus.

Rubrica fabrilis.

CAP. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior
est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis,
lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia
quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & dege-
nerante in rubricam.

Lemnia terra.

CAP. LXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata &
Lemno insula, palustri loco defertur, inibi
ele

electa, & caprino sanguini permixta: quam incogunt in pastillos, & imagine caprae signant: unde & sphragida egos, hoc est, sigillum caprae, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa venena singularem, pota cum vino, & praesumpta euomi venena cogit. Contra iclus morsusq; animalium, quae exitiale virus ei aculantur, prodest. Antidotus familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vtantur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum sutorium. CAP. LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem vnum & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias tres habet. Vnum nanque humoribus stillatum in cuniculos quosdam colatus, concreuit: quare ab ijs, qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capessit, quod pecton, id est concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua madesactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestum, tesseraeque specie reddentes, quae racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est

est, ab alyslonchoton nominatū. Proximum, concretitium. Coctile verò ad insectus & denigratio-
nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad me-
dicinæ usum inualidius esse, experimenta docent.
Valet adstringere, calfacere, et crustas inducere:
latas ventris tineas necat, drachmæ pondere deno-
ratum, aut cum melle linctum: vomitus ciet: ad-
uersus hausta fungorum venena, ex aqua potum
auxiliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in vel-
lere naribus instillatum. Vritur, ut paulò post in
mentionem chalcitis ostendemus.

Chalcitis. CAP. LXV.

Chalcitis præfertur similis ari, friabilis, nec
lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus
oblongis venis, splendentibusque. Huic absterforia
vis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus
obducens: purgat quæ oculis & eorundem angulis
herent. In genere leuiter exedentium est. Ad
ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax
est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpen-
tem, cum succo porri sistit: gingivarum vitia, de-
pascencia ulcera, tonsillasque, eius farina compe-
scit. Vsta, & cum melle trita, oculorum medica-
mentis longè utilior redditur. Callum genarum,
& scabritiam absument, abstergeique. Fistulas tol-
lit, collyrii modo in eas adacta. Fit ex chalcite
medicamentum quod psoricon vocat, duabus eius
partibus, cum vna Cadmiæ additis, & ex aceto
trititis. Oportet autem in sicili obruere fimo, diebus
quad

quadraginta, per Caniculæ ardores: sic enim fit acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viniis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidoribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitiæ flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiam num per flatus carbonibus, vsquedum luteo colore pallescat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium aut cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur sed ad ocularia medicamenta. multò supradictis inferius.

Melanteria.

CAP. LXVII.

Melanteria geminæ est originis: quedam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concrevit. Alia verò in summa
fa

facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinettam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quadam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory.

CAP. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriam esse, Saberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verum soræi virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscentes, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & rstonem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ rstonem experta nō sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-

G

busta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

CAP. LIX.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quodam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositus sarmentis vritur. Diphryges ideo vocatum est, quod & à sole, & à sarmentis vritur, are scat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quasi subsidens fæx est: siquidem post frigida aquae offusionem, ut supra retulimus, cum de flore aeris differeremus, sublato aere, fornacis ima parte coherens id genus invenitur, & adstrictionem & gustum aeris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximientes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem aeris gignit, fieri: quando in dictis aeris assata, & in scrobes translata perurit. Tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilo minus invenitur. Præfertur quod saporem aeris reddit, æruginisque, adstringens, & vehementer exiccans linguam. quod sibi exusta ochra non vendicat: quæ cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adstringere, per purgare, extergere, siccare, ex crescentia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoëthe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes testebinthina aut cerato exceptum discutit.

Aur

Auripigmentum. CAP. LXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permistum, in squamulis fissile: quale in Mysia Hellepontina nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectus, assiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum vehementi vredine, & violento morfu excitat: reprimat quae excrescunt, & capillos euellit.

Sandaracha. CAP. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & vntio, quae auripigmento: explet alopecias, resinae excepta, & scabros ungues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusisientibus. Sufficitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nido re: vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen.

CAP. LXXII.

OMne aluminis genus fere in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiae, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimū, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulse aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confictum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atque validius adstringens, prætereà nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præseferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit limpidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculor

lorum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex-
 crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius
 intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debet.
 Putrescentia vlcera compescunt: sanguinis fluxio-
 nes inhihent: gingiuas humore pręgnantes com-
 primunt: motus dentium cum aceto & melle fir-
 mant. Profunt cum melle vlceribus oris, eruptio-
 nibus papularum, & fluxionibus aurium, cum san-
 guinalis herbę succo: lepris conueniunt cum brassi-
 cę folijs aut melle cocta: itē pruritui, & vnguium
 scabritijs, pterygjs, & pernionibus, aspersa cum
 aqua. Valent cum aceti facie, & galla, pari ponde-
 re cremata, ad phagedanas vlcerum, & cum salis
 duabus partibus, ad vitia quę pascunt: fursures
 cum eruo & pice illita abstergunt: ad lendes, pedi-
 culos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Con-
 tra tumores, & graue alarum inguinumque vi-
 rus, illinuntur. Ex Melo autem aduectum, mulieri-
 bus pręstat ne concipiant, ante coitum ori vuluę
 inditum: partus quoq; extrahit: gingiuus, si caro ex-
 creuit, vna ac tonsillis accommodantur: ori, auri-
 bus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur.

CAP. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur viuum, quod apy-
 ron vocant, nitedula modo splendidum, perlu-
 cens, minimē lapidosum. Probat in genere sul-
 phuris ignem experti, quod viret, ac prępingue spe-
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, discunt, & cele-

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-
lenta extuscentibus in ovo sumptum, aut suffitum:
præterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, liche-
nas, scabros vngues, cum resina terebinthina mi-
stum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras ef-
ficax est: vitilignes tollit: scorpionis ictibus, addita
resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini
scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore
erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium
morbum emendat, insparsum fronti cochlearis
mensura, aut in sorbili ovo sumptum. Facit ad gra-
uedinem, & destillationes: sudores quoque con-
spersum inhibet: podagricus, cum aqua & nitro il-
litum, conducit: gravitatem auditus, suffiti nidore
raptim per fistulam hausto, sanat: lethargicos suf-
fitu excitat: erumpentem undecunque sanguinem
sistit: contusis auribus, cum vino & melle illitum
medetur.

Pumex.

CAP. LXXIIII.

Pumicis probatio, ut magnopere levis, spon-
giosus, scissilis, nec arenosus, item teri faci-
lus, & candidus. Crematur flagrantissimus car-
bonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, vi-
no restinguitur odorato: iterumque incensus ex-
tinguitur: & tertia vstione exemplius, & per se
refrigeratus, ad usus conditur. Vus eius adstringe-
re, gingivas abstergere: purgat cum calfactione,
quæ caliginem pupillis offendunt: explet ulcera, &
ad cicatricem perducit: excrescentia cohibet. Fit ex
far

Farina eius dentifricium. Corpori crustam obdu-
cit: auellendus capillis aptus. Theophrastus author
est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumi-
cem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal. CAP. LXXV.

Salsifolius efficacior est, communiter, si est can-
didus, calculis vacans, & perspicuus, densus,
equali compage. Peculiariter Ammoniacus natio-
ne laudatur, si modo findi facile possit, & in recta
segmenta diduci. In marino sale eligendus est can-
didus, equalis, densus. Probatissimus in Cypro
fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia
& Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacu-
stris præfertur: sed multò validissimus est, Phry-
gius nomine tapæus, aut tritæus, aut gantæus. Sa-
lis natura in commune perquàm utilis est: adstrin-
git, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, exte-
nuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quòd
alius alio sit præstantior. Quin & à putredine
vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abster-
gentibus. Excrescentia in oculis reprimat, & pte-
rygia consumit, ceterasq; carnis extuberationes
tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines
ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores au-
xiatur, doloresque in saccis fotu mitigat, & pru-
ritus sedat, ex oleo & aceto infriëtus ad ignem,
donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. An-
ginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: ton-
sillis vnaq; cum melle tostus. Vlceribus in ore

manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedænis vlcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasen, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos cum ruta passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxilium tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita vt vinculus loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Liexatus imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt, cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline oblinunt, & carbonibus subijciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturque, donec iam non exiliat.

Spuma salis, spumosi maris lanugo sine ramentum

um est in exilibus petris inuentum, cui vis eadem
que sali.

Muria.

CAP. LXXVI.

MVria effectus salis præbet, abstergitq; dys-
sentericis infunditur, etiam si nome intesti-
na corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fotus,
aquæ marinæ vsum præstat.

Flos salis.

CAP. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus ta-
men quibusdam innatat. Assumendus qui
crocei coloris est, odore ingrato, ceugari. Inter-
dum longè magis virus olet, gustuq; mordacior,
& pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut
scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non
nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte,
etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad vlce-
ra, quæ cacoëthe vocantur, & phagedænas, geni-
talium nomas, & purulentas aureis, efficax est:
oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tol-
lit. Emplastris vnguentisque coloris causa, ut rosa-
ceo, miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in vino
aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Addi-
tur acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gra-
tia componitur: & in vniuersum acris est, & fer-
uentis naturæ, ut sal.

Nitrum.

CAP. LXXVIII.

Prefertur nitrum leue, roseo colore, aut cana-
dido, in foramina delihscens, perinde quasi

G S

Spongiosum quiddam, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens: qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Caria gignitur. Vim & vstionem salis habet, tam nitrum, quàm spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, vti ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut vino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat: sor-des expurgat, cum aceto instillatum. Canum mor-sibus ex asinino adipe aut suillo medetur: resina terebinthina admistum furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorde-rit, ex aqua: ys verò, qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio, usq; qui cibum nò sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisque iam remissio-bus, & luxatis, cum cerato: in resolutione lingue, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta car-bonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Fax

ELigenda fæx maxime à vino vetere, Italiæ
 co: fin minus, ab alio consimili. Fæx aceti
 viribus longè acrior est. Crematur vt alcyonium,
 intè diligenter siccata. Sunt qui noua testà igni
 largo vrant, vsque dum penitus incendatur. Alij
 viuis carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem
 opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ
 vstionis, vt aërio nitore inalbescat, linguamq; ta-
 ctu vrere videatur. Eadem vrendæ fæcis aceti ra-
 tio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vl-
 cera ad cicatricem perducit, adstringit, vehemen-
 ter exest, siccâtq;. Sed recenti vtendum est, quo-
 niam celeriter exanimatur: proinde nō nisi in re-
 conditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur,
 vt pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tu-
 mores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris
 stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri proflu-
 uium, imo ventri aut genitalibus imposita, miti-
 gat: panos discutit, nondum exulceratos, & tuber-
 cula: rigentes mammas, sui q; lactis impatientes,
 cum aceto peruncta extinguit. Cremata verò, vi-
 gues scabros cum resina aufert: addito lentiscino
 oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculo-
 rum medicamentis, vt spodos, adijcitur: cicatrices
 eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua. CAP. LXXX.

CAlx viua hoc modo fit: Marinorum bucci-
 norum testas igni condito, aut feruenti cli-
 bano

bano, nocte dimittito : postera die, si candidissima fuerint, extrahito : sin aliter, iterum vruto, usque dum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile novum conijcito, & exacte pannus operiens, noctem unam conquiescere finito : manè eam extrahens, ubi perfectò omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ ceteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens : quibusdam alijs immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat : vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum.

CAP. LXXXI.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi : sanguinis eruptiones sudoresque cohibet : sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet : cum Saxungia autem vel oleo illitus, fractus nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimat : serpentium canumque morsibus illitus ex aceto medetur : crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto, sale, & melle.

Alc

Alcyonium. CAP. LXXXIII.

Alcyony quinque esse genera compertum est: unum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulae oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in foeminarum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoque corpore. Tertium is, qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothræque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarc

Adarces.

CAP. LXXXIII.

FIt in cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore floris lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongia.

CAP. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrarius doctes habent. Vruntur eæ ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæve conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callôsque laxant: siccæ recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impositu siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crem

rematarum, profluentem sanguinem sistit. Cano-
lida cura fiunt, è mollissimis recentes, per aestus
infecta salis spuma, quæ petris coheret: insolantur
inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectan-
te, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æsti-
na serenitate ad lanam sternantur, persusæ salis
puma, aut maris aqua, maximum candorem re-
ferent.

Corallium. CAP. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appel-
larunt, marinum esse fruticem constat, qui
alto extractus, duratur statim atq; emergit, tan-
quam offuso aëre protinus concreseat. Plurimum
inuenitur ad Syracusas, in promotorio cui Pachy-
no nomen est. Laudatissimum, rubens, colore an-
therici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti sa-
bile cedens, æquabili vsquequaque cōcremento, rur-
sus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissi-
mum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod
autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, ina-
ne, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstrin-
git, & refrigerat mediocriter: excrescentiæ coër-
cet: oculorū cicatrices abstergit: ulcerum caua, &
cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones ma-
gnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur.
Quin & potius ex aqua lienem absorbit. Quod an-
tipathes vocat, corallium esse arbitrantur, specie
tantum distans. Est autem colore nigro, arboris
figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Rhr,

Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia
vuntur, à qua nomen accepit, nascitur in
Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modi-
cè grauis, non solida corporis compage, interce-
dentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vritur au-
tem vino optimo perfusus, viuísque carbonibus ob-
rutus, perflatur assidue follibus, donec mutato
colore rufescat: rursus extractus eodem vino re-
stinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus facien-
dum: attendendum tamen, ne minimim confringa-
tur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo vstóque
adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas qua-
dámtenus inducit, ambustis cum cerato medetur.
Lauatur vt cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

Asus lapis assumi debet pumicis colore, le-
uis, fungosus, item friabilis, scissiles venas
lutei coloris ad innum actas habens. Eius flos, sal-
sugo subflaua est, summo lapide insidens, compage
tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici si-
mili, ad luteum vergente: ad motus lingue ali-
quantum mordet. Vim habet vterque adstricto-
riam, & modicè erodentem, admixtus liquida
pici, aut terebinthina, tubercula discutit. Lon-
gè validior flos existimatur. De cætero siccatus
flos, vetera vlcera & cicatrici repugnãtia sanat:
excreſcentia cohibet, tetráque vlcera & fungus
similia, cū melle expurgat: vlcerum caua explet,

& expurgat cum melle, depascentiaque cum ce-
rato sistit. Fit cataplasma ex eo podagricus, misto
fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & uina calce.
Prodest flos ex melle phibisicis linctus. Podagrici
iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excavato
inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt,
& luxuriantem carnem, & corporum crassitiem
absument, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si
lauare libet, cadmia modo lauatur.

Pyrites. CAP. LXXXIX.

Pyrates lapidis genus est, à quo aes conflatur.
Eligi debet ævis similitudine, facile scintillas
edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna con-
tinuè flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos
carbones igni candentes, lapidem copioso melle per-
fusus deiiciunt, & ubi ad fuluum colorem verge-
re coeperit, extrahunt: efflatoque cinere, rursus ma-
de factum cremant, donec aquabiliter assiccatus,
friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa so-
lum vritur. Ita crematus, siccatusque, reconditur.
Si eloto opus sit, lauare debet ut cadmia. Tam cru-
di quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offu-
sam oculis caliginem expurgare, duritias concoque-
re, & concoctas discutere. Resina exceptus excre-
scencia in carne cohibet, sed calorem quendam &
adstrictionem parit. Ita vstum nonnulli diphry-
ges appellant.

Hæmatites. CAP. XC.

Hæmatites optimus habetur friabilis, satum

H

rato colore niger, durus & suapte ingenio aqua-
lis, nulla sorde admista, nulloq; xonarum discursu.
Vim habet adstringentem, & excalfactoriam ali-
quantum extenuantemq; : oculorum cicatrices &
scabritia cum melle purgat: cum lacte autem mu-
liebri, lippitudini, fractus, & oculis cruore suffusis
conuenit: bibitur contra difficultatem vrinae, &
fluxiones mulierum in vino: & ab ijs qui sangui-
nem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex
eo coticule & collyria oculorum vitis apta. Vri-
tur vt Phrygius, sine vino dumtaxat. Modus vstio-
nis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdā in-
tumescaat. Sunt qui hematiten ita adulterant: Den-
sam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi
sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini
operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt,
pincæque interiecta mora eximunt, experiunturq;
si trita ad cotem hematitæ colorem reddat: quod
si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum ob-
ruunt, & subinde conspicientes, periculum fa-
ciunt: siquidem in cinere diu demissus, colore mu-
tato diffunditur. Coarguitur malè confectus, pri-
mum scissilibus venis: quippe in rectos venarum
discursus refringitur. At hematites longè secus se
in colore habet: nanque hic floridum reddit: he-
matites verò saturatiorem, atque cinnabarin imi-
tantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è
magnete lapide, vehementer ambusto. In Aegy-
pto sponte natura cum metallis enascitur.

Sch

Schistus lapis.

CAP. XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatur maximè qui croci colorem amulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarum discursu, petulinum modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & cana repiet muliebri lacte perfusus: ad proci-
lentia, rupta, item genarum crassitiem, & ruas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates.

CAP. XCII.

In gagatarum lapidum genere præferendus, qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger est plerunque, & squallidus, crustosus, perquam levis. Vis ei molliendi, & discutiendi:prehendit fonticum morbum suffitus, recreatq; puluæ strangulationes: fugat serpentes nidore: po-
agricis medicaminibus, & acopis additur. In Cicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Locatur autem & locus & amnis Gagus, in cuius faucibus ij lapides inveniuntur.

Alii plures lapides. CAP. XCIII.

Aps thracicus dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis i gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo re-
tingui: quod in bitumine accidit. Magnes la-
is optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad æruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hematite vendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus humorum rholdas exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones & ulcera conuenienter ilinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei obheret. Melittites omnia galactite similis: hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochithus lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, ut pote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis vestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, coeliacis, & vesicae doloribus, cum aqua potus: itidem fluxionibus vulvae, impositus velleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera quae sunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit. Alabastrites vocatus onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias dissentit: stomachi dolores cum cerato lenat, & gingiuas comprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit.

Vcl

Vehementer mordet : tenebras , quæ pupillis ob=
 uersantur , expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa
 nascitur , glandis effigie , candidus , scita admodum
 configuratione , lineis æqualiter inter se distanti=
 bus , quasi industria detornatis : solutus nullā qua=
 litatem manifestam gustui repræsentat. Potest ci=
 ceris magnitudine tritus ad cotem , ut collyrium ,
 cum calidæ aquæ cyathis tribus , potu difficultati
 vrinæ auxiliari , & calculos in vesica comminue=
 re. Amiantus lapis in Cypro nascitur , scisso alu=
 mini similis : quo , ut pote flexili , telas & vela tan=
 tūm spectaculi gratia texunt , quæ ignibus iniecta
 ardent quidem , sed flammis inuicta splendidiore
 exeunt. Sapphirus lapis , percussus à scorpione po=
 tu prodesse existimatur. Contra intestinus exul=
 cerationes bibitur. Excrescientia in oculis , vudisque
 & pustulas inlibet , & ruptas membranas co=
 git. Memphites in Aegypto iuxta Memphin in=
 uenitur , calculorum magnitudine , pinguis , ver=
 sicolor. Tradunt trito & illito , quæ vrenda aut
 secanda sunt , sine periculo obstupefcere , ut ut non
 sentiant cruciatum. Selenites lapis , quem aliqui
 aphroselenon appellarunt , quoniam noctu inueni=
 tur lunæ imaginem reddere , qui cum ea quidem
 augetur & decrefcit. Nascitur in Arabia , candi=
 dus , translucēs , leuis. Huius ramenta comitialibus
 in potu dari iubent. Eo cen gestamine ad amuleta
 mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem fru=
 gifera redduntur Iaspidum quedam smarag=

dum imitatur, alia crystallum, colore similis pi-
 tuitæ: alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aeri-
 Zusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias
 ex argumento vocatur: quedam lineis albis &
 resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata:
 alia terebinthina similis, quæ terebinthi Zusa di-
 citur: alia colore callida gemmam æmulatur.
 Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare
 partum femoribus appensæ. Aetites lapis est velu-
 ti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante.
 Gravidis continet partus, cum lubricæ sunt vul-
 væ & parum tenaces, sinistro brachio adalliga-
 tus: sed parturientibus è brachio amoveatur, &
 feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Fu-
 rem deprehendit, si quis in pane conditum offe-
 rat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quin-
 etiam concoctus, furem coarguit: quippe decoctus
 cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerate
 exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalsa-
 ciente, comitiales magnificè inuat. Ophitea genera
 multa: quidam ponderosus & niger: alter cinereus
 colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis
 quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati
 contra capitis dolores, & serpentium ictus pro-
 sunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & ca-
 pitis doloribus auxiliari. Lapides in spongys in-
 ueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vine
 poti. Lithocolle glutinum, quo lapides coniun-
 guntur: conflatur autem ex marmore, lapide Pa-
 rio

rio, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostrea cutes testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtuntur. Menses drachmæ pondere potus ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilicet pōdere, foeminus præstat ne concipiant. Cum melle autem impisus, mammae rum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgant, ad erodendum & vrendum utilis: gingius, quas humor vexat, prodest: dentifricio commendatur. Arena è litoribus sole feruescēta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus, in ea obruantur. Torreri solet ad aridos fatus, pro milio aut sale. E cote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit: virginum mammae cohibet, nec incrementum patitur: potum ex aceto, lienē absūmit, & comitialibus prodest. Geodes lapis, adstringit, siccāt, caligines oculorum discutit. Illius autem ex aqua, testium mammae marūque inflammationes sedat.

Terra. CAP. XCIII.

OMnis terra ad medendi vsum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatūque obducendi, occludendique: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinerem co-

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per æra-
 menta tractim ducatur, lineam violaceam refert.
 Lauatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur
 seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, hu-
 mor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum te-
 ritur interdum, adiecta aqua, ut vespere consadat:
 antelucanis colo excernitur, & demum in sole tri-
 ta si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si to-
 sta desideratur, pastilli magnitudine cicernis in si-
 ctile perforatum coniunguntur, oræque vasis diligen-
 ter obturato, supra carbones candentes continen-
 ter follibus perflantur: ubi verò cinis in fauillas se-
 conuerlit, aut aereum colorem contraxit, exempti
 reconduntur. Vim habet adstringentem, & refri-
 geratoriam, leuiter mollientem: caua explet, &
 sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur can-
 dida, leuis, tangenti lingue glutinis modo adhære-
 scens, mollis succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam
 aliqui collyrion vocant. Duæ enim species eius:
 vnâ, antediximus: altera aster appellatur, cru-
 stacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac laua-
 tur ut eretria, vimq; consimilem habet: sangui-
 nis reiectiones sistit, & fixminis fluxione vuluæ
 laborantibus, cum flore syluestris punice datur.
 Testium & mammarum inflammationes, illita
 ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcet: con-
 tra serpentium morsus & venena, pota ex aqua
 auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inueni-
 tur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut res
 splen

blendeat. Probaturn candore & durtia. Vis ei ad-
trictoria, & refrigerans: prodest stomachicis po-
us: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum
& vlcera, cum lacte efficax est partus, vt tradūt,
dligatus accelerat, & conceptus foeminarum cu-
todit. Chia eligi debet candida, vergens ad cine-
eum, Samia similis: est autem crustosa, albaq; sed
Chiijs formis differēs. Vis eadem quæ & Samia:
xtendit faciem, & erugat, atq; splendidā reddit:
colorem in facie & corpore toto cōmendat: in bal-
neis pro nitro deterget. Eadem præstat Selinusia:
maximè laudatur, quæ vehementer resplēdet, can-
dida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimo-
lia duo genera, candida & ad purpureum incli-
ans. Optima existimatur, quæ immatā habet pin-
itudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque ace-
do diluta, parotidas, & alia tubercula disciuit: am-
usta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas
non sentient: testium duritias, & totius corporis
collecciones cohibet, igni sacro imponitur. In sum-
ma, vtraq; multum in medicina commendatur, si
incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ
nigritu dicitur, colore ferè eretria similis est, gran-
uloribus tantum glebis manum si quis adinqueat,
refrigerabit tactu linguae, vsque adeo glutinosa, vt
ensilis hereat. Cui effectus idem qui cimolia, pau-
tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretria de ven-
unt. Fornace æ testæ vehementer testæ, crustas
lceribus obducunt: quare prurigini & papulas

rum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutiunt, cerato exceptæ. Fornacū terra quæ retorrída fuluescit, eiusdē cum testā effectus. Melia colore cineream cretiam imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, dera si pumicis modo crepiat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicē linguā siccāt: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat, vitilignes, & lepras abstergit. Pictoribus vsū præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humore attigerit, faciliē resoluatur. Ex ampelide terra, quæ phar macitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, picea longos carbonēs referēs, modicē assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosū censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad callibelephara additur, tingendis capillis idonea. Vsus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus, utpote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

Fuligo qua pictores vtuntur, ex vitrariis officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuntur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax: fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Attā

Atramentum librarium. CAP. XCVI.

Atramentum, quo scribimus, fuligine è tedis
coacta colligitur. In singulas libras gummi
terne fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam è re-
sinarum & pictoria fuligine, de qua paulò antè
diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gum-
mi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti suto-
rij, singulorum sescuncia. Adlatur conuenienter
erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua
commodè crassius illinitur, sed non antè solua-
tur, quàm cicatricem induxerit: sanatus si-
quidem vlceribus, sua sponte decedit.

Ceterum habes, amiceffime

Aree, ferè quæ tradēda

duximus pro ope

ris modo, quæ

destina-

ue-

ramus, & materia auxilio

liorumq; medicina-

lum copia.

QVINTI LIBRI

FINIS

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

venenis, quoq; modo arce-
antur, vitenturq;

Liber VI.



UPERIORIBVS, amicis-
sime Aree, libris tradidimus de
aromatibus, oleis, unguentis, ar-
boribus, & earundem fructibus,
lacrymisque: item animalibus,
melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radi-
cibus, liquamentis, vinis, metallisq; In hoc verò to-
tius operis ultimo, facultates medicamentorum re-
censebimus, quæ prodesse nobis, aut officere pos-
sunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus in-
stitutum prosequamur. Huiusmodi autem tra-
ctatus, cum bifariam distributus sit: in partem
venena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes,
aut si quando per imprudentiam dentur, ut tum
quoque innoxia fiant, irritaque: & in ratio-
nem ipsi succurrendi, qui iam noxiam sentiunt: pri-
mum differam de præcauendi modo, quem esse dif-
ficillimum plerique maiorum arbitrantur, quod
dantes clam venena, ita insidias temperant, ut pe-
rit

ritissimum quenque decipiant. Siquidem venena
sua amaritudine, permixtis dulcibus, spoliant, &
grauis odoris virus mixtura odoramentorum exi-
munt: aut medicamenta immiscent, quæ tuenda sani-
tatis gratia dari putantur: & præsertim in vales-
tudine, ut absinthium, tragoriganum, satureiam,
aut hyssipum, quinetiam thymum, irim, origanum,
abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis
purgatorijs cognatam habere qualitatem videat-
tur. Aut potionibus inserunt: ut vinis asperis, in-
ribus, passis, mulsæ aquæ, musto succis, ut in crea-
more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs
quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Qua-
re qui in ea suspicione sunt, conditos cibos vitare
debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salso-
rum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affa-
tim bibere, aut esurientes voraciter comesse, sem-
perq; ad saporem horum diligenter attendere, præ-
sertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satia-
to enim appetitu, qualitates ægerrimè postea
concoquuntur. In ægris quidem facile cauemus
potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offe-
runt improbi veneficiorum artifices: itaque ob id
laborantes morbo non perinde audentium iniurijs
patent. Et hæc quidem ne facile incanti seductiq;
homines capiatur dolis veneficorum, ratio est, &
facultas. Sed alia superest expeditior, ut suspi-
ciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires he-
betent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

car

caricæ sunt cum iuglandium nucibus mauduca-
ta, & quæ cedromela vocant, id est citria, semi-
nusq; napi drachma cum vino. Item folia calamin-
tha, aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur, pō-
dere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis iu-
glandis nucleum: aut caricæ duas, & salis cal-
lum ieiuni sumant, & nullo veneni genere leden-
tur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum
præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithri-
datium, & quod scinco, & quod sanguine tem-
peratur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculia-
res quidam corporum affectus certo quodam mo-
do constitutorum cum quadam cibi potûsque qua-
litate, tum vini copia ita temperatorum, ut cum
venenis dissentiam: siquidem ingestæ veneni vires
frangunt, atque iam priore alimento factus præ-
clusisq; meatibus, obstant ne membratim per di-
gestionem insinuetur. Verum enimvero quoniam
fortune necessitas interdum similia discrimina
peregrè agentibus affert, absque ullis insidijs ho-
minum, nonnihil differendum mihi de hac re ne-
cessarium dico. Iam primum igitur culinam ap-
parare loco subdiali convenit, cibosq; & potus in
huiusmodi loco struere. Si id fieri commodè ne-
quit, secunda erit conditio hæc, apparandi appre-
hendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia
animaduertenda: frequenter enim à superioribus
contabulamentis animalia decidunt, exigua qui-
dem, sed quæ non modicam perniciem implantur,

ut

et phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia.
Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet:
namque reptilia odore vini illiciuntur, quæ inter-
lum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum
verò delapsa immersaq; expirarunt, & exitu cau-
as haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus di-
ta sint, ne cauti & providi insidijs pateant. Quod
i qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sum-
serunt, auxiliari primo quoque tempore oportet
est: siquidem dum comites singulorum venenorum
notæ expectantur, immedicabile sit venenum, &
cavalisser neglectum, medicamentis agrè cedit.
Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse in-
telligant, & fateantur, aut eorum, qui aderant,
testimonio constet, protinus ad idonea remedia
transseantes, facile peculiari nativæq; constitu-
tioni restituemus. Neque enim is assentimur, qui
proorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi
contendunt. Quo enim modo morbi, quorum cau-
sæ cæcæ latentæque corporibus insident, medici-
nam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt ve-
nena, medendi rationem aspernantur? Aequè ve-
rò omnes morbi pro causarum ingruentium ma-
gnitudine, proque antecedentibus affectionibus
qualitatibusque, quibus sit opportunum corpus,
vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamen-
tis. Quod si qui forsitan obmutescentes, aut tenu-
es, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nul-
lam volis eius cognitionem præbeant, tum pro-
tinus

tinus accedendum ad ea, quæ communiter epist
 quibuscunque venenis opitulari consueverunt. At
 qui nullum magis in omnia valens auxilium da
 ri potest, quàm ut proximo loco virus foras exha
 riatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, co
 lidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut vomitare co
 gantur, dari conuenit. Aut si oleum natura lo
 negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, as
 lini semine, aut trago, vrtica, fenogreco, aut ha
 lica decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim no
 modò vomitionibus exigent ut illa sua laxatrice
 aut nauseam crente, sed aluum quoque subducen
 & corporum inanitione ita aduersabuntur,
 acrimonias venenorum hebetent. Id quod euident
 huiusmodi argumento deprehendere licet: Est
 ut quisquam viua calce vel fece, aut cantharidi
 bus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statu
 rit, ut si ipsum oleo leniter illinat, exulceratione
 non accipiet. Atqui neque vehementer adstring
 corpus, neque refrigerari poterit, si antea perun
 gatur. Quinetiam vomitus non ob id modò quò
 vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamen
 tum adfert; sed quòd assumptum virus nunquam
 odore, coagulatis grumis aut colore, prodatur: qui
 pe cum odore & amaritudine, meconium: colo
 re, cerussam, gypsūve: grumis, lac aut sangu
 nem animalis recens iugulati ostendat. Na
 grauis odor regestorum, leporis marini, aut ri
 betæ veneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab

re

præstandi auxilij ita se habet. Cæterum ab ijs quæ
 consueuerunt euenire, communia remedia sumpti-
 tari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm
 plurimorum, in affectus consimiles corpus tan-
 dem redigunt. Quam ob causam plerisque com-
 munia conducunt auxilia: varia etenim sunt vene-
 norum genera, communes tamen nec multi iisdem
 affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes con-
 currentesque casus, quæ symptomata vocant,
 vnum venenum sequantur. Alioquin superuacanea
 fuisset venenorum singulorum traditio cum suis
 remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in
 vno eodémque promptum est inuenire, ut quis sto-
 machi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesti-
 cæ dolore vehementer crucietur, ut singuliat, ero-
 datur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, con-
 uellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat,
 veterino prematur, vertigo obuersetur, caligent
 sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre
 conflictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,
 crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat,
 liuore sugilletur, palleascit, desipiat, stertat, viribus
 deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturq: sin-
 gula enim in generales affectus deducta, pauca
 numero, & communia ea demonstrant, quæ eue-
 nire consueverunt. Quare in singulis, quæ supra
 diximus, non facile fuerit deuotum virus cogno-
 scere. Nam oris & lingue erosio, stomachi, ven-
 tris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vri-

a difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus,
 incinatio, & in plurimis partibus quidam adu-
 sionis sensus, non in cantharidibus modò potius re-
 eruntur, sed in erucis quoque p̄norum, & bu-
 reſte, & salamandra. Porro non modò eos, qui
 reconum hauserunt, veterno aut sopore premi,
 ertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupe-
 ere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari
 onſtat, sed eos etiam qui mandragoram aut cicu-
 am deuorarunt. Delirium non hyoscyamus tan-
 um infert, verumetiam quæ toxica appellantur:
 idem aconitum, & mel quod in Heraclea Ponti-
 a gignitur. Strangulatio non minus in fungis,
 uam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa,
 ypſo conſpicitur. In summa, difficile vnum vni
 veneno proprium inuenire signum, quod hau-
 tum, guſtatũque virus prodere possit: maxi-
 nè, quòd hæc caterorum etiam vitiorum, quæ in
 corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæ-
 erum in his quæ celeriter enecant, noxam signis
 orſitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ
 imus dicturi. Sed in iis, qui ad longas ægritudi-
 nes spectant, nihil ad medendi rationem difficile,
 luntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, ut pote
 um venena statim atque præſentaneam vim il-
 am perdiderunt, transmutata in longos affe-
 ctus, communia reliquorum vitiorum remedia,
 compositionesq; flagitent, cum venefica proprie-
 tas non amplius insit. Si verò longa sit affectio,

in aliquod diuturniorum morborum genus reci-
det, à quibus facile fuerit medendi rationem as-
sumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, ha-
Etenus. Consequenter quæ priuatim singulis pro-
sunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim
exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitia-
lem aut maleficam vim sortiuntur, ut medicinæ
studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salu-
tis scripta inueniuntur: quòd nonnulla eorum, qui-
bus vtuntur, venenis sint commista. Incuria enim
magnas adfert noxas, & sæpe continuo vsu eo-
rum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia
quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharide,
buprestis, salamandra, pinorum erucæ, lepus ma-
rinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorat
hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum,
cicuta, gith, psyllion. Liquamenta: meconium, opo-
carpason, thapsiæ succus, elaterium, mandrago-
ras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum,
thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephed-
merum, quod aliqui Colchicum vocant, quòd i
Colchide nascitur. Herbae oleræque: smilax, quam
aliqui tithymalum appellant, Romanitaxum, so-
lanum manicum, quod & dorycnium dicitur: san-
dunia herba, quæ ranunculi genus est, cornicula-
tum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestri-
fungi. Ab animalibus: taurinus sanguis recens
coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum.
Metalla: gypsum, cerussa, calx, auripigmentum.

uo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, lumbum, & quod argentum viuum dicitur. liquoribus domesticis: vinum abundè post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

CAP. I.

Quius datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quiddam cedriæ respiciunt, dextra præcordia inflammantur: urinam agrè reddunt, & ubinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmen- a non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fistidia urgent: animo linquuntur, obortæque ver- igine concidunt: postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nomhil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox ubi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut ory- xæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum mal- uæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, cly- stere infundatur. Præterea nitrum eisdem dan- dum, ex hydromelite, vt quæ stomacho adhuc aut intestinis adhærent, eluendo excernantur, ac de- scendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. De- tur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nu- clei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo li-

quefactus. Inflammata autem partes, hordei farina cum mulsâ decoctâ perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, ut pote quæ dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lavare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inherunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus insigatur, & stabilitatem capeffat. Gallinaceis carnibus & hœdinus, aut suillis catulis, maximè pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem alium cient, atque venenorum acrimonias hebeant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum ruta decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsâ, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ.

CAP. II.

Is, qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, lingue ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire videantur:

tur:

ur: corpus totum exaestuatur: fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs, quae deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis.

CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisque: vehemens dolor insequitur: tam venter, quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem quae potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post vomitus & vacuationes, quas clysteribus molimur, aridae siccus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

CAP. IIII.

Si salamandram hauserunt, linguae inflammatio consequitur, mens & sermo praepeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullae corporis liuoribus circumquaque sugillantur: saepeque diutius immorante veneno putrescentes, defluunt. Quibus praestabimus cuncta, quae potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum.

ex melle linctum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei
pinei conterantur: vrticæ quoque folia, cum lilij
& oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis ma-
rinæ aut terrestris, cocta: item ranarum ius, cum
quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

CAP. V.

SUmpito ephemero, quod aliqui Colchicon, aut
syluestrem bulbum appellant, pruritus in to-
to corpore excitatur, non secus atque ijs qui vr-
tica aut scilla laceffuntur: interna rofionem sen-
tiunt: stomachus cum ingenti grauitate exæstuat.
Ceterum inualefcente morbo, cruor strigmentus
admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs
qui salamandram hauserunt, vomitione aut cly-
steribus auxiliari conueniet: sed antea quam ve-
nenum inualefcat, dandum est decoctum fron-
dium quercus, aut glandium, aut malicory: lac
bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item
succum sanguinalis herbæ, aut ramorum vitis,
aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myr-
ti cum vino. Bacca autem myrti tusæ tritæq;
& aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem
ferunt. Media castanearum tunicula, similem
effectum præbet, si cruda in aliquo supradicto-
rum succo sumptitetur: origanum quoque cum li-
xiuo. epotum: eximiè iuuantur asinum lactis aut
bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita
ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desi-
deretur.

Dor

Dorycnium. CAP. VI.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum
appellarunt, epotum, lactis saporem in gu-
tu refert: continentes singultus ciet, humor lin-
guam vexat: sanguis confertim reicitur: muco-
sa quaedam perinde quasi dysentericis, aluo ege-
runtur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat,
auxilio sunt antedicta, vomitus, clyster, & qua-
cunque potum venenū expellere possunt. Priuatim
ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asi-
ninum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bi-
batur, amygdalæ amaræ, gallinaceæ pectora deco-
cta. Quinetiam conchylia omnia, ita cruda quàm
tosta esse, salutare est. Conueniunt & locustæ ma-
rine, & gammari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum. CAP. VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum,
cum adstrictione quadam dulcescit: & sub-
inde, potissimū cum exurgere conatur, vertigines
offundit: lacrymas ciet: grauitatē pectori, & præ-
cordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur.
Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per-
aliū egeri opus est. Utimur inter propinandum,
origano, ruta, marrubio, vel absynthij decocto,
cum vino absynthite, vel semperuuo, vel abroto-
no, vel chamaelea, aut aiuga. Prodest etiamnum
opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum
castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex vi-
no. Coagulum hædi, leporis, aut hinnuli cū aceto.

ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum
ferrū, argentūve candens restinguatur, potum
lexiviaque cum gallina & vino decocta, aut ca-
rium bubularum præpinguium iura, cū vino sum-
pta. Fertur & aīuga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia.

CAP. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, vbi aconitum giga-
solet, inuenitur: quod qui edunt bibunt
non secus affliantur, quā qui aconitum ebibe-
runt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt: ac-
iuantur in primis continuo vini mulsi potu, cu-
ruta folia sint adiecta.

Coriandrum.

CAP. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest
epotum autem vocem exasperat, insaniam
adfert, à temulentis non abhorrentem. Qui sum-
pserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corpo-
ris odore, venenum fatentur. Quibus post vomit-
tionem irino oleo concitatam, vti retulimus, me-
rum & per sese, & ex absinthio potum auxilia-
tur. Item oleum, nec secus oua in eodem exinan-
ta, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota
muria, & ius salsum ex gallina & anserē: passum
quoque cum lexivia sumptum.

Psyllium.

CAP. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torpo-
rem cum exolutione & macrore quodam ad-
fert: ita vt animus despondeant. Cui omnia, quæ
exhausto coriano auxiliantur.

Cic

Cicuta.

CAP. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita vt minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteria spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodum deiectione moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per intervalla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potui datū, aut absynthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amoni, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

CAP. XII.

Smilax, à quibusdam luthymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori, stragulat, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicuta conueniunt.

Carpaci succus.

CAP. XIII.

Epotus carpaci succus soporem, citamque stragulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonia herba.

CAP. XIII.

Sardonia ranunculi herbae generi assignatur, quæ rescentibus mentem adimit, & quædam

dam nervorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infuisset omne manavit. Post vomitum peculiariter convenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus exalfaciuntibus: in calidam aquam oleumq; descendant, sed tum multum perfricare & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ convulsioni nervorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

CAP. XV.

HYOSCYAMUM potum aut comestum, similem ebrijs ab alienatione movet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininum: si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passio sumptum, & vinum salsum cum adipe suilla recentis, passioq; itidem vrtice semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora.

CAP. XVI.

MANDRAGORA si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulsa
prod

proderit: postea nitrum & absynthiū ex vino dulci aut passo sumatur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, castorū, & rutæ tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quod si agere reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

Meconium.

CAP. XVII.

E Poto papaueris succo, quem meconion vocat, consequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehemente, ita ut sepe inualefcente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitionē, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosacco calido: merum cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum satureiæ aut origani decocto, cum vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrū prodest iurium pinguium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

Quod corniculatū papauer appellant, & potus, & cibo eadem inferre cōsuevit, quæ papaueris

pauers succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

Quod pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum cōuulsione & delirio.

Oportet autem post vacuationes vinum absynthii temperari dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: de rasumque caput illinire hordeacea farina cum acetato, & trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguae inflammatione torquentur: incoercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicina locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim ijs conuenit, quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malaque colonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

Ixiā.

Ixia. CAP. XXI.

IXia, quæ vlophonon appellatur, inter potandâ
 aliquid ocymo simile gustu & odore redolet:
 ebementem linguæ inflammationē excitat: men-
 tem mouet: omnes excrementorum exitus suppri-
 nit: strepitum cum animi deliquio ciet, usq; in-
 estina latrant, nec egeritur quicquam. Post ro-
 nitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat
 aqua, in qua absynthium maduerit, ex vino lar-
 riore, aut aceto mulso pota: rutaq; syluestris semē,
 aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum
 aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina tere-
 binthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio,
 quorum singuli oboli cōueniunt. Quin & nuces in
 glandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta tri-
 ta, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem
 chamaeleæ aut thapsiæ aut absynthij succi sicilicet
 cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

Cerulea. CAP. XXII.

Cerulea suo colore proditur: sumpta enim,
 mox palatum, gingivæ, lingua, & commis-
 suræ dentium, candore quodam inficiuntur: sin-
 gultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: os
 extrema frigescent, mens labat, membra torpe-
 scunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut
 ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut
 sesamam ex vino tritam, vel lixiuiā ex sarmentis
 factam, amaricinum oleum aut irinum, persico-
 rum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum
 thure

thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi
quod ulmus ploravit, aut humor, quem ulmea f
lia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoq
vomant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut sca
monia, cum aqua mulsa potus.

Fungi.

CAP. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt:
mnestamen strangulatus suspendio simili
concitant. Quibus confestim succurrendum: con
muniter ex oleo vomere cogendi: mirificè iuu
lixinia ex sarmentis aut pyrastris furculis, epo
cum sale, posca & nitro. Fructus, aut folia py
rastris cum fungis decocta, strangulantem illa
vim auferunt, esiat aq̃ue eisdem auxiliantur. A
uersus fungos gallinacea oua cum posca proj
ciunt, adiecta aristolochiæ drachma: item abs
thium cum vino melleq̃; sumptum, & ex aqua p
tum: apiastrum ex nitro, panacis radix & sem
in vino, sex vini cremata cum aqua, atramentu
sutorium ex aceto, radix, vel sinapis, aut nastu
rium esu profunt.

Gypsum.

CAP. XXIIII.

Lapidescens gypsum strangulationem crea
quare eadem proferenda sunt, quæ man
fungus, auxilia, & ad hæc maluæ decoctum, qu
etiam olei vicem pensat: utpote cum pingue sit, e
mendo lubricas vias & faciles reddit, de radiq̃
corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapiden
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua
n

nulsa, aut sicorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hique decocto malua proluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatūque concitat: faucium tonsillarūque meatus cum neruorū distentione praecludit, lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quaedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attracti illo in sublime relati, magis gula inculcantur. Dari ergo opus est quae concretum sanguinem discutiant & aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentibus ex posca, & mirum per sese, auxiliantur: nec secus coagulum onine cum aceto & laserpitiy radice, aut lasere: itidem & brassica semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Iis qui seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum aluūque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Laccoagulatum. CAP. XXVI.

Eos, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere saepius cogimus. Damus & calamini hæ folia ari-

K

da, item succum, aut laserpitij radicem, aut laser
cum posca: thymumque ex vino, & cum luto suo li-
xiuiam. Sed nulla falsilago obiciatur, quoniam ma-
gis lac coiret, & in casum densaretur. Neque illos
vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in
gula angustis insinuans, strangulat.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inte-
stinae grauitatem cum magnis torminibus
adfert, & nonnunquam pondere suo intestina vul-
nerat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plum-
beamque deformitatem concipit. Quibus subuenit
secundum vomitionem, potum syluestris homini
semen, myrrhae drachma octo, absinthium, hyssop-
um, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vi-
no: aridum palumbis finum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum, eadem quae spuma
argenti infert, eisdemque vtendum auxilijs.
Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea
euomant, qui hauserunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

CAP. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, po-
ta aluum & intestina cum vehementi ero-
sione excruciant. Praebenda cuncta quae suo admi-
nistu illorum acrimoniam hebetat, ac soluit, & fa-
cilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci
& maluae succus est: natura enim utriusque perlu-
bric

frica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen
ragi herbae, vel oryzae lacq; cum aqua mulsa co-
niosum, iura pinguia, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium vi-
rus olent: procedente tempore, aluus dolo-
re afficitur, & vrina sistitur: & si
quando eam reddere contingat, purpureum colo-
rem referet. Omne piscis genus auersantur, &
radio habent: foetido ac graui sudore manant: bi-
liosus vomitus, interdum sanguini promiscuus,
subsequitur. His dandum lac asininum, vel pas-
sum continuè, aut radicis maluae foliorumq; deco-
ctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut ve-
ratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum
aqua mulsa, puniciq; mali acinus. Cedria cum vi-
no efficax est: auferinus sanguis, vi tepebit, po-
tus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernemurq;
solis fluminalibus cancris vesci possunt, bibuntq;
eos admisto vino, adiutisque ab his percoquunt.
Cumq; appetere & comesse pisce coeperint, suae sa-
lutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumo-
res ciet: pallor corpus vehementer decolo-
rat, ut planè buxei spectetur: spirandi difficultas
torquet, & grauis halitus oris, singuliisque & in-
uita interdum genitura profusio consequitur. Ad-

inuuantur secundum vomitionem multo meri potus
& arūdinis radice binis drachmis, aut cyperi tot-
idem. Breuiter, cogendi sunt vt vehementiambu-
lationi & cursui se credant, ob torporem quo cor-
ripiuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo. CAP. XXXII.

DEuorat & cum aqua hirudines, si ori ventri-
culi adherent, tractione partium, nonnul-
lam suctionis imaginem præbent: eo enim argu-
mento hausta hirudo deprehenditur. Has muria
forbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut laser-
pitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis gle-
bula, cum posca. Nitrum ex aqua gargariætur,
aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si fau-
cibus hæreant, iniecta lupinorum farina, aqua fri-
gida ore contineatur, & ad eam hirudines exi-
liant. Prouidendum etiam ijs, quæ etsi ferendi auxi-
lij gratia tradantur, non minora tamen cæteris ve-
nenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album
veratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum:
siquidem ea stre-
gulatus concitant, aut immodi-
cas deiectiones mouent. Quibus ea medentur, quæ
in fungorum mentione & similibus retulimus.
Nimios autem deiectionum impetus, medicamen-
tis, quæ excrementa supprimunt, coercebimus. Ne-
que negligenda quæ parū quidem nocere videtur:
interim verò vitā in discrimina agunt. Quo in nu-
mero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi
recentes: flores autem sunt eius spina, quæ cactos di-
citur.

titur. Eos, qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminenti solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus vimur, quale Mithridatum est, præsertim & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verùm quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione supersedemus.

Venenata. CAP. XXXIII.

DE bestijs, quæ virus ei aculantur, & exitia libus venenis, ideò scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicū perducatur: siquidem pars hæc non minus quàm cetera aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuentibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ

sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum
quæ nonnihil auxilij ferunt. Omnia autẽ in prom-
ptu, & ad manum habere artificem oportet, pro-
pter vrgẽtem sæpenumero necessitatem: siquidem
pauci è venenis & virulentis animantibus, tarda
& grassantia sensim pericula cient, ita vt dilatio-
nem admittant: pleraque verò præsentaneam per-
niciem afferunt. Hominum autem partim male-
alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficiũ ita
temperant, vt spatium curanti liberum non relin-
quant: partim sceleris admissi conscientia, aut
tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ve-
neno, mortem sibi consciscere conantur. Qui post-
ea deprehensi, aut resipientes, & vitæ cupidi,
præsentaneam opem poscunt. Non desunt, qui ho-
stiles sagittas illinentes, aut fontes aquasque pu-
teanas hac labe polluentes, certam & inuitabi-
lem aduersarijs perniciem moliuntur. In quibus
ipsis etsi maleficiũ non subito, sed aliquantò
post grassari natura sua comparatum est, tamen
nisi primo quòq; tempore coerceatur, & remedijs
subinde excipiat, frustra tandem succurritur,
occupatus iam corporibus exitiali vi veneni. Pro-
inde non vulgari industria diligentiaque in ea re
utendum est, vt quod in alijs incommodis ars con-
suevit, in his quoque salutem mortalibus præbeat.
Quin & apud priscos genus hoc vnum existima-
batur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat:
sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes
præ

præcautionem, & modum præcauentem, salubrem
 sanantisque medium statuentes, parua & leui su-
 pra modum persuasione decepti. Siquidem tres in
 humanis corporibus constitutiones esse contem-
 dunt: vnā, qua sani degimus: alterā, qua sini-
 stra valetudine corpora laborant: tertiam, quæ
 medium inter vtrasque locū sibi vendicat. In qua
 positi, sanitatem specie mentiuntur, facileq; in mor-
 bos & pericula concidunt, ob vim corruptricem,
 quæ corporibus nostris incumbit: quemadmo-
 dum in ijs videre licet, quos excandescens rabie
 canis momorderit, necdum tamen aquam hor-
 rent. In ijs quoque qui cantharidas hauserunt, sed
 nondum vrinae tormento cruciantur. Tripartitio
 igitur artem digerere, triplicique corporis consti-
 tutioni merito respondere trahunt. Salubrem par-
 tem esse volunt, quæ sanitatem tuetur: præca-
 uentem, eandemque prohibentem, quæ obstat quò-
 minus in morbos incidant: & sanantem, qua vi-
 tia discutiuntur. Quibus ita responderi potest,
 quòd primum ex ista ratiocinatione nō tres cor-
 poris tantum, sed quatuor haberi constitutiones
 fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui necdum
 morbo laborant, morbo tamen maximè ob impen-
 dentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
 priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ va-
 letudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à mor-
 bo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
 riū recreationē & robur desiderant. Sed quem-

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijcere par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, vstioni-
bus, amputatione, derodētibus epithematu, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enimvero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellēt, quæ morbos arceāt. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliare remediariamque vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conflictentur. Neque id silentio prætereundum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à vitul

ruentis animalibus venenisq; contrahuntur, voca-
ri cacos, id est, quorum ratio minimè iniri po-
test. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli
pariter sunt addicta causæ: quapropter quæ-
stionibus observatoriæ artis, & eius, quæ ratio-
ne fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus
verum deprehenditur, affectus huiusmodi cacos
esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in
quibusdam necessarijs vsum exhibet, haud facili
coniectura colligi potest: etsi naturæ proprie-
tate prorsus cacos eos affectus concedimus, qui
ab exitiis venenis, & animantibus, quæ viru-
lento morsu sæviunt, contrahuntur. Nam quod ad
opus nonnullum vsum præbet, datque medendi oc-
casionem, neque imperceptibile, neque cæcum,
nulli re causæ obnoxium reputatur: se magis ab
ipso quis impulsus, demonstrationem se habere,
& opinionem de abditorum cognitione confirma-
re poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut
sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis
inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in
eo commentario quem Plistarcho dicauit, satis mo-
dos perstrinxit, ad verbum ita scribēs: Nosse quis
hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis,
& scorpionibus, & reliquis id genus, secum ani-
mo reputans, ut quamvis exiguo sint corpore,
vixq; conspectui subiiciantur, magnorum tamen
discriminum ac dolorum causas inferunt: quo-
rum nihil præter quandam corporis exiguitatem,

vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporum est, quæ à scorpij iclu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morsu conficiunt, attingitur: quorum aliqua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Aut quantum est quod à phalangij morsu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole constent. Ergo quod hæc affectus referantur, constituit inter omnes. Verum quod exactè deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus mortaliæ, quæ exoriuntur, nobis causâ sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur vsque adeo contentions studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quam à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat, quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ, quæ propriis inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, insciatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de causis scrip

scripsit commentario apertissime prodidit, candido
 signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit,
 qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpen-
 tium icibus, & ceteris id genus trita medendi
 ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi
 obseruationem eam, quæ à causarum comprehen-
 sione separata est. Primum enim genere compre-
 hendi facile possunt. Quod autem sit letifera vis,
 corporaq; permixta, ita ut perimat, ex his, quæ
 per genus, non per speciem vagantur, curatio-
 nem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expu-
 gnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dul-
 cem, & potui idoneam venit quis, & ante obser-
 uationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem,
 ad demorse partis suclum, cucurbitulas adfixit,
 partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ
 vim eadem adipiscuntur admouit, postremò par-
 tem amputauit: secū reputauit medicamina, quæ
 per summam cutim ferre, & applicari solita, im-
 missa ad intima perniciæ repugnarent. Hæc ita-
 que, quæ disseruit Erasistratus, veritati consen-
 tanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos
 demirari licet, qui mortiferam vim corporibus
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini atten-
 dunt. Nam apud ipsos palàm immissa vis φθορο-
 τοῖος, id est mortifera, nominatur: φθороτοῖος
 autem nullius officij alius esse potest, quàm cau-
 sa. Aiunt hæc nomina, μαρσιππός, & αἰα-
 καλὴ

καὶ ὅτι ἐν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quemadmodum in his vocibus μαρμαρίν, πῦρ, & ἀνὰ καὶ ὅτι ἐν, partes neque certos, neque principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιεῖν partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus presentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuantur: & cum desinunt, quædem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit: quemadmodum accidit is, qui à rabioso cane sinit demorfi. Quod si neque evidens causa, neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod aut

utem asserunt, vocabula quædam in se non ha-
 bere partes rerum significatrices, sed nuda, &
 implici pronuntiatione ficta esse, sateri necesse
 est. Verum non omnia, sed per pauca talem nane-
 sci conditionem existimandum est: neque enim
 τοῖσι in hoc nomine φθοροπαθῶν perinde atque
 assumptitia profertur, sed longè principem obti-
 net significationem. Quemadmodum enim φθο-
 ρᾶς, id est corruptionis nomen mutationem in pe-
 ius significat, sic hoc verbum τοῖσι sumi debet,
 ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem φθo-
 ρᾶ secum habeat, declaret: neq; prorsus id signi-
 ficat, quod omnes palim audiunt, & huic simile
 redditur, τῷ αὐτῷ ἐκείνῳ δ' ἰψῷ. Si dant à corru-
 ptione sanus fieri morbum, concedunt utique vim
 in huiusmodi verbo τοῖσι subesse, siquidem
 aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne au-
 tem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas
 causas, quæ corporibus subiciuntur, idq; tam in
 lethalibus venenis, quàm in ijs, quæ corporibus
 ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causarum
 differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, non
 exactam diuisionem assumentes. Qui verò se do-
 gmaticos profitentur, causam esse partim præpa-
 rantem, partim continentem asserant: ut inguinis
 vlcus, & inguinariâ febrim, & quæ affectui tum
 assistat, tum etiam separetur, ut à fractis præci-
 pitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natu-
 ra causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur,
 vit

vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ
idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœo
causa sit, nomen ipsum argumento est, & in
quæ contingunt apertius ostenditur. Quid alii
causæ arbitrantur esse post impressum à serpen-
tibus ictum, quàm ex animante vim, & illapsu
in corpora virum? Neque enim frigus, neque æstus
neque sectionem corporis, neque cruditatem, ne
aliud quicquam simile causari possunt. Verum
quoniam causarum differentiis gaudent, & al-
quas continentes, alias evidentes appellant: ip-
dicendum, utroque istorum modorum evidente
quidem causam esse, quod effectum præcedit, &
quod corporis substantiam præoccupat continen-
tem verò, quod morbis præsentibus adest, quas
parata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed
his hætenus. Statuendum itaque mortiferam vim
intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsam
principem facere scopum oportet. Et antequam
ad ima decumbant morbi, variis modis est cer-
tandū, donec vis tota corporibus excutiat. Mo-
dò enim reuocari debet ea parte, qua pestis in-
trauerit: modò aliqua alia, præsertim principa-
tum non obtinente, antè coërceatur, quam altius
irrepens viscera tangat: aut eius pernicies elua-
tur, retundaturq; cum iam membratim peruaga-
tura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris re-
mitionibus: si morsu impressa, scarificatione, a-
fixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscrip-
tione.

ne, nonnunquam amputatione extremæ partis,
vocantur. Retinentur verò infusione, & imposi-
tione medicamentorū acrium cohibentur. Hæc simul
etque arcere virus, & eluere possunt. Restin-
guuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo
nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quæ acri-
toma sint prædita. Postremò deiectio alui, evo-
catus sudor, & alia quedam in commune, quæ
membratim demonstrabimus, auxiliantur. Ve-
rumenimvero nō lethiferam modò materiam, sed
& magnitudinē, & tempus, pro scopo considera-
re oportet. Etenim ab ijs remedia quæ plurimum
discrimen capeffunt. A magnitudine quidem,
cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus
pericula minantur: alia putredines altas aut ex-
teriores excitant alia vehemētissimos dolores aut
cacoscient: alia vix medicamentis cedunt, & ma-
gis minùsve molestias excitant. Oportet autem
ea, quæ pericula ferunt. perniciosioribus auxilijs
expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe
absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus me-
dicamentis homines in discrimen adducere in mi-
noribus verò, vehemētium auxiliorū iniuria cor-
pus lacescere. Finitio à temporibus in promptu
est. hoc enim subito in pericula, & presentes mo-
lestias adducit: illud verò sensim, & dilatas in
diem longam aut breuiorem producit. Itaque in
acutis quidem confestim multa simul auxilia re-
presentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc qua-
dam

dam artis formula breuiter desinita sint. Iam mem-
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum
ab eo. CAP. XXXV.

DE rabiosi canis morsu sermonem alijs pra-
posuimus, quod id animal domesticum a
frequens esse consuevit, & in rabiem saepius agi-
tur, ac perit, ab eoque cauere difficile: inde peri-
culum inuitabile hominem manet, nisi multi-
utatur auxilijs. Canis plerunque flagrantissimi-
as tribus in rabiem efferatur: interdum quoti-
frigora inceserunt. Rabiosus autem potum, &
escam auersatur largam spumantemque pituita-
naribus, & ore proycit: toruere & solito tristitia
intuetur: in omnes passim sine latratu irrumpit, &
aque feras hominesque, tam familiares, quam igno-
tos mordet: nec protinus infestum quicquam in-
fligit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille
qui ab aquae metu hydrophobicus Graia est voc-
appellatus, contrahitur. Euenit autem cum diste-
tione nervorum, totiusque corporis rubore, pra-
serim faciei, cum sudore, & languore quodam.
Aliqui aurae splendorem fugiunt: alij sine ulli
doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam, qui
canum more latratu edant, & obuiam facti
morsu adoriuntur, ac mordendo simili vitio labi-
faciant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium senserin-
neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex his-
toria vnu aut alterum euasisse audiamus: siqu-
de

em Eudemus superasse quendam affirmat. The-
nisonem aliqui demorsum in hunc furorem inci-
isse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico
quam expauescenti morem gereret, & officium
exhiberet, quadam naturarum concordia similem
contraxisse affectum: sed post multos tandem cru-
ciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque
genus morbi, à quo multos, antequam ipsam expe-
rentur, vindicauimus: & complures ab alijs me-
dicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

CAP. XXXVI.

Ratio medendi duplex: vna communis, qua
utendum in omnes morsus, quos virulenta
animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq;
eorum duntaxat, quos rabiosi canes momorderint:
vnde nonnullis quidem summam opem ferre consue-
rit: alijs vero inutilis, maximè qui ex multo iam
tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc perti-
nent, primum exponemus, deinde cursim perstrin-
emus, quæ ad communem medendi rationem per-
tinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarnientis al-
be vitis cremare oportet, & cinerem eorum quàm
minutissimè tritum habere reconditum: itidem
gentianæ radicem tusam cribratamque reponere.
Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in
quaternos cyathos meraci vini, bina cineris can-
eorum cochlearia, vnumq; gentianæ cōiiciantur:
hec in polentæ dilutioris modum subacta, quatri-

L

duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu bini terni dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxiliū, quod & plerisque vnum satisfecit, eoque cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilium contra inenitabile periculum muniamur, nil ceteris vti prohibet. Satius autem multo fuerit etiam si in vanum recidat, medicamentorum in humanos tolerare cruciatus, quàm per inertia ac desidia in discrimen adduci. Nec ita in demeritis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, & vlcusculus cutis similia: quippe maiori vulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest non nihil virulenti liquoris exhauriri, quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acies scelli circumscribere, & prehensam hamulo aut scella carnem amputare oportet. In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratum insinuetur. Cucurbitula cum melle flamma agglutinata id iuuamenti præstant, vt venenum vis extrahatur. Contra virulentos ictus vltio expeditissimum est auxilium, vt pote cum ignis cetera viribus præstet, simul quod virus commet, & ferri penitus non patiatur: simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fune

mentum curationi futura præbeat, manente diu-
tius exulceratione. Animaduertendum ex eo tem-
pore cum crusta decident, ne vlceris ora coale-
cant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad-
multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes
& sordidas adhuc & inflammationem minantes,
prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamen-
tum optimè præstabit, & syluestre allium detri-
tum: item cape, succusq; præsertim Cyrenaicus,
aut qui Medicus, aut Parilicus appellatur. Tritici
strana tam mansa, quam non mansa imponantur:
si quidem subacta p:stave à perfusione vulnera di-
atant. Sumi qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid
disciscere arbitrentur, quod suapte natura resi-
stat: verum id certum non est. Cæterum tempe-
stius eorum vsus minimè est contemnendus. Si
verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos ci-
catrices coirent, committerenturque, manum po-
tulabunt: nanque eas diducere, carnemque scal-
pello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi
verò propositum tempus præterit, vlceris ad cicatri-
cem ducendum, & emplastro, quod è salibus confi-
gitur, locus comprehendendus: nec multò post sina-
pismo vtendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

CAP. XXXVII.

Qua ad partem istam pertinent præsidia,
ita se habent. Cæterum victus rationem
ex ijs quæ veneno aduersantur, comie

L 2

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet resinguatque, simul ut arceat, quominus ad intima perniciēs illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum utrumque præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorum, porrorum, ceparumque cibus: quod ea difficulter conficiantur, vixque aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quod tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui remedium antidotorum usus accommodatur, & theriaces Mithridatij, & eius, quod eupatorio temperatur. Denique omnium, quæ magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs egrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nolle conuenit, pauorem aquæ non statò definito tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum usque diem neglectis differri consuevit. Post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. Quæ nobis vis comperta fuisse. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse têtatos. Inter principia demorsorum à cane rabiosa curandi ratio talis est. Vnum enim uero si ea, quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem

circinare, nec vstionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed in cassum corpora doloribus sternuntur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectione magnum præbet iuuamentum, ut pote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Ceterum sudores ante cibos, & post etiam cieniendi. Dropacismi sinapisque alternatim per corpus totum adiiciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quocum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam, qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio tentatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus scire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxi-

lū pręstare possunt. Postremò subneclentur etiam
venenata, quę nullis cedunt remedijs.

Notę eorum, qui à venenatis demorsū
sunt. CAP. XXXVIII.

DEmorsis à phalangijs locus quidem ipse,
quasi ab impacto aculeo rubet, non intume-
scens, nec per ambitum calidus est, sed mediocri-
ter humescit: ubi verò contrariorum occursum re-
fixit, consequitur corpore toto tremor, distentio-
nes poplitum & inguinum, convulsionibus non dis-
similes. In lumbis collectio exoritur, & perpetua
urinę libido laceffit, multaque reddendis excre-
mentis colluctatio. Uniuersa cute frigidus sudor
emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis ca-
ligant. Si scolopendra aut dicta ophioclene, mor-
sum intulit, locus per ambitum liuore sugilla-
tur, & computrescit: interdumque, licet raro,
saculentus atque ruber cernitur. A morsu ipso
exulcerari locus incipit, vlcusque id negotium ex-
hibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto cor-
pore prurigo sentitur. Scorpionis morsu inflam-
mari statim incipit locus, & indurefcit, ac in-
tensus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modò
si quidem exæstuat, modò frigore occupatur. La-
bor repentiè fatigat, & aliquando meliusculè ha-
bet, aliquando verò recrudescit. Consequitur su-
dor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corpo-
ris partes refrigescunt, inguina extolluntur, per
sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor mem-
bra

ra decolorat & dolor, tanquam ex pungente
cu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina
astinaca percussit, protinus accidunt molesti
dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & im=
becillitas. Mens percussus labat, postea obmute=
cunt: oculi caligant. Percussus autem locus in
ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita
b=stupescit, vt tangentem non sentiat. Hunc si
quis premat, atra sanies, crassa & malè olens ex=
eruitur. A mure araneo percussis, circa mor=
um in orbem inflammatio exoritur, nigraque pu=
tula, diluta sanie turgens, exurgit: proxima par=
es liuent. Rupta pustula, depiscens vlcus, non
i dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum
quoque tormina, difficultas vrinae, & frigida asper=
inis offusio consequuntur. Si vipera momora=
lit, corpus iniurmet, vehementer arescit, subal=
idumque colorem concipit. Sanies à vulnere pro=
iunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pu=
tulae adustis similes erumpunt: & antea depa=
rens vlcus, quod in proxima repens, non summa
nodò corporis, sed intima quoque corripit: gingi=
ae ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa
ecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequun=
ur. Sopor, tremor, & vrinae difficultas accedit,
& frigidus sudor offunditur. Consimilia eue=
niunt ijs, qui à cecilia nomine, aut amphibiaena
lemor si sunt, eademq; ferè auxiliantur: quare hoc
venenū priuatam descriptionem sortitum non est.

neque visum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustula molestique dolores incidunt, praesertim quae diluta saniei emissarium subest: quinetiam erosio, torminaque consequuntur. Ab haemorrhoidis ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit: & quacunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta exciuntur, profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem extusunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos dysipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque usque eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla intercapidine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & dysipsas, & causon, aut dysipsas appellatur. Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & liuidum ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & maledolens, non secus atque iis, quae serpunt vlcerebus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperini ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Canes antea, ut in aqua inter cutem, praetumidi defluunt. Leihargo corripuntur, & veterano pressisomnos captant. Erasistratus eos iocinere, in iustino ieiunio, coloque conflictari author est. Quip

dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. A cerasæ percussus locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur: mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspide ictus vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit absque labore, virès atque discolor. Mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quem de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco scitè ita refert, Cū basiliscus morderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Transseuntes utique ad mendendi rationem, primùm, ut fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. CAP. XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis ictum. Quod venenum vibrat, oris succio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ci-

L 5

bum sumpſiſſe, & vino os abluiſſe: poſtea exi-
 guum olei in ore continens plagam exugat. Lo-
 cus ipſe ſpongia fouendus, deinde ſcarificandus:
 ſed vlcuſcula altius imprimere expedit, quo viro-
 ſa materies profundo euocetur. Circinatio autem
 carnis, & ſectio, ſcarificatione longè potentius
 opitulantur: nanque ab iſ duo peculiaria præ-
 ſidia ſunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Al-
 terum, quod eius venem pars, quæ ad interiora
 graſſatur, cum multo copioſo que ſanguine excer-
 nitur. Quòd ſi locus ſectionem non admittat, cu-
 turbitulæ cum largiori flamma adfigendæ ſunt.
 Sed iam deſtione ſuprà in rabioſorum morſu diſ-
 ſeruiſimus. Si verò icta pars, ut pote extrema, eam
 ſectionem commodè non reſpuat, præſertim in
 omnibus ſerpentium ictibus, ut aſpidis, ceraſtæ,
 ſimilitumq; proculdubio amputanda eſt. Conuenien-
 tiora ſuprà dictis auxilia ſunt, quæ epithemata vo-
 cant. Imponatur ſarmentitius cinis, aut ficulnus,
 cum lixiui ſtillatio ſubactus, garo, & acris ſala-
 ſamento: porri, capæ, & allia modò minutiffimè
 cōtrita illinuntur, modò cremata vulneribus inji-
 ciuntur. Quinetiam diſſecti gallinarum pulli, cum
 maximè tepent, percuſſo loco applicentur. Nec
 deſunt qui hiſce tanquam diſcordia quadam natu-
 rali pugnatibus viantur: verum huius rationem
 inire facillimū fuerit. Gallinæ enim calida natura
 prædita ſunt, argumento, quod deuoratum inſigne
 virus conſciunt, & aridiſſima quæq; ſemina con-
 ſumunt.

sumant, item nonnunquam arenas lapillosq; inglu-
nie sua deuoratos, dissoluunt. Itaque animantis ad-
moti calore adiutus spiritus, ab icta parte impe-
tum capeffens exiliensq; secum venenum exigit.
Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum
spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam ha-
bent, & appensam fasciam: tunc enim maximè ser-
pentium iniurias expauescunt, tum propter spici-
legij tempus, tum quòd opacis simul abdita spelun-
cis & cauernis, densoque aruorum cespite deli-
tescunt. Molestissima enim animalia & virus
eructantia, Aegyptus in campis ferre consuevit.
Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, mor-
sum intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis
conijciunt, & semel aut iterum brachium aut
crus paulum supra vulnus obligant, & archissi-
mè duo è presentibus dstringunt, locumq; secun-
tes, qua circumactus est laqueus, picem instil-
lant. Cumque satis vulnus excepisse videtur, la-
queum resoluunt, & capis alijsq; supra memora-
tis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito
& feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugi-
ter innouetur. Conuenit & cedria, & sinum ca-
prarum ex vino decoctum. Locum aceto calido,
salamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria
decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt
emplastra vehementissima, & calidissima, quæ
venenum elicere, expugnare, & discutere possunt.
Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &
cachu

cachrye componuntur: de quibus consequente
erit tractandum. Erasistratus autē non iniuste
reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hū
vsum facultates conscripserunt, ut elephanti fel
crocodilive sanguinem, ouāque testudinis, & con
similia. Nam cum iuuantia quadam literis tradi
disse videntur, planē in hęc sola incidentibus
imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cū
difficilē, nisi regia facultate, peruestigari pos
sint: neque, quō nostra fides ijs obstringatur, fre
quenti obseruatione, sufficiens experimentū prae
stiterint. Quae autem ad communem omniū vsum
pertinent, quaeq; faciliē suppeditari, & omnibus
serpente percussus auxilium ferre queunt, subiun
genda videntur. Antubus itaq; Erica, & astragalus,
cum aceto pota, contra omnes serpentium
morsus auxiliantur. Item bitumen, & virētes pl
tani pilula in vino diluto cocta, & paliuri deco
ctum: radix aristolochiae, & eryngy: decoct
etiam lauri baccae & deuorata, pipérque largi
esitatum, ruta, anethum, & cyclaminus: com
porrorum priuatim ex pane, aut allium, aut ca
pe, salsamentaq; quā acerrima: origani deco
ctum cum vino potum, fœniculi, pulegi, cala
minthae, porrorūmq; succus cum melle desorptus.
Hęc quidem à plantis conquiruntur. Ab animan
tibus verò quadam vtiliter peti solent, gallina
ceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum
cum vino, itidem castorij sextans: testes mari

et testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliaria medicinalia est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua bis drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, haftenus. Percussus in serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiose reddita. Sunt & compositæ quæ ad abortiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicet cum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem sylvestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum eruce succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex his terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia virulentorum
ictuum. CAP. XL.

Inter ferientium venenatorum notus nihil de uestris & apibus articulatim digestimus, quod conspicue omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus vitrarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-
neum

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua solus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissime tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinenda. La uacris perpetim vtendum, & propinandum ab- rotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylue- stre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, pla- tani corticem, & trifoliae herbae semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina conuenit. Item myrica fructus & chamaepityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis can- cri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semi- ne, confestim molestus liberare prodant. Si scolo- pendra morsum infixit, sal quā leuissimè tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muriā fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpyll- lum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, praesenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse, qui ictum vi- brauit, tritus, & percusso loco impositus, suae pla- gae remedium est, ob cecam quandam natura- rum (vt constat) discordiam, quae antipathia ap- pellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & alibea, scorpium conuenit. Sulphur ignem

ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulnere inieclū opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendū, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gentiana, & pulegium decoctū, & bacca lauri pauco numero trita, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac, laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est potus trifoliij, & ocymij semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, & diluta vini portiones. Ei, qui marina pastinaca icitur, omnia quæ de viperarum morsu paulò post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, quibz molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitant. Quibus absynthij, saluæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuisa & vulnere imposita, sui ictus medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano spleniū, per se vulnere exterius impositum, vt medicamento modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse
qui

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui veneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pue-
nici decocti, & illui. Item porri, & allia contri-
ta, necnon aquæ calidæ fots: sed hæc ad locum
pertinent. Prodest pitum abrotoni decoctum, ma-
ximè si in vino detur. Præterea serpyllum, & gal-
banum, & eruca vino madefacta, recētes cupres-
si pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mul-
so, & pyrethrus cum vino, & chamæleonis herba
radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tra-
diderunt, tritum murem araneum contra suo-
ictus commodè bibi. Quam historiam apud alio
inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ an-
notaretur. Alij asseuerant demorsum non aliâ
exulcerari, nisi prægnâs mus araneus fuerit: tum
sanè auxiliari ferunt. Si vipera morsum im-
presbit, finum caprinum cum vino, studiose im-
positum opitulatur. Item laurus, & abrotonum.
& galbanum splenij loco superiectum, & origa-
num viride inditum. Pulli gallinarum discerpti
& confestim admoti: erui farina vino subacta
radicis cortex usque eò tusus, ut in puluerem so-
lutus abeat, & scilla tostata: detritum chamæme-
lum hordeaceæ farine cataplasma in aceto mulso
preparatum: sed locus antè eo calido foveatur.
Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-
bus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-
lio constantem auxiliari produnt. Leporini coag-
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi
hen

hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, &
ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum
frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, &
porri recentes, ſalsamenta acerrima, & opipara.
Simplicia hæc ſunt. Percuſſus à vipera præclare
auxiliatur medicamentum, quod myrrha, piperis,
caſtory, floris portulacæ ſeminisque, dimidio aceta
bulo conſtat: hæc omnia in Cretico paſſo teruntur,
aut in alio probato. Eraſiſtratus in eo libro, qui
τοπι δυνάμειος, id eſt de viribus, inſcribitur, ple
raque alia tradidit, quæ iſtus ab vipera auxilium
ferre poſſunt: inter quæ talia maximè laudantur,
Gallinacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ
braſſicæ tritum, & acetabuli menſura cum vino
potum. Quinetiam bonū eſt digitum in liquidam
bicem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit
elutus, bibere. Hæc ſunt, quæ contra vipera iſtus
auxilantur. De amphybena mentionem hoc loco
fecimus, quoniam ferè remedijs ad viperas ſcriptis,
percuſſi ab ea adiuuari ſoleant. A dryino iſtus con
uenit ariſtolochia cum vino pota, trifolium herba,
radix haſtulæ regiæ ſimiliter aſſumpta, & fru
ctus ex omni quercus genere, & iuſe ilicis radi
ces, & illitæ parti iſtæ auxiliantur. Hæmorrhoi
dipsadiſque morſus velut immedicabiles à pleriſq;
maiorum deplorati relinquebantur: quare ſi pecu
liaribus contra dipsadem remedijs egeamus, com
munia experiri operæ pretium erit. Protinus au
tem ſcarificatione vi, vſtionem facere, & ſilocus

M

patiat, extremorum amputatione opus erit: con-
 sequenter quàm acerrima cataplasmata admove-
 re, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit,
 acres cibos, maximè à salsamentis, vitiles esse. Me-
 racæ potiones & lauacra prosunt, quæ subinde in-
 teriecto breui spatio assumenda sunt, priusquam
 morbi genus emergerit: quo semel erumpente, opè
 ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmor-
 rhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune op-
 tulentur, vt scarificationes, vstiones, acres cibi,
 meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiui-
 mus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle
 trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum
 tritum & aqua subactum, lixiua cum oleo indita,
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minu-
 tim contrita, & hordei farina cum aqua & melle
 colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ dra-
 chmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps
 marrubij succus, vel decoctum alterius cum vi-
 no. Fauus recens datur in aceto. Morsis à cenchri-
 dio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine il-
 litus, & satureia trita, & syluestris ruta, & ser-
 pyllum cum duabus hastulæ regiæ drachmis, &
 tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item
 cardimomum & gentiana. Si cerasites percusse-
 rit, cita partis amputatio suffragatur: quare sine
 mora ictam partem amputare, aut scalpro confe-
 stim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet.
 Vrentia insuper reliquis admoenda, siquidem
 viris

virus hoc veneno basilisci simile est. In, qui ab
aspide feriuntur, quæ de ceraſte ſcripta ſunt auxi-
lia dari debent. Nam venenum hoc, quemadmo-
dum basilisci, aut ſanguis bubulus, celerrimè in
arterijs ſanguinem cogit. Ad basilisci mor-
ſum, ut Eraſiſtratus author eſt, auxi-
liatur caſtorij drachma in vino
potata: item papaueris ſuc-
cus. Ictuum remedia
ita ſe habent.

SEXTI ET VLTIMI
LIBRI FINIS.

NOTHA ET DIOSCORIDI FALSA
adscripta, quæ ut facile, si quis ita uel
suis singula locis applicentur, numeri
notantur: quorum primus Dioscori
paginam, secundus uersum signat.

6.12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs the-
de, ab alijs vrania, à nonnullis cathæron aut the-
mastos, à Romanis marica radix, à quibusdam
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecatrix
Aegyptijs nar appellatur.

8.2. Aliquæ choron aphrodisias, Romani
neream, aut radicem nauticam, Galli piper apia
vocant.

9.6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13.23. Magi sanguinem Martis, Latini per-
sam, alij bacchar, Osthænes thesam, Aegyptijs
rea, alij nardum rusticum, Galli bacchar, Hæ-
sci succinum: odorata herba est, qua in coronam
tis utuntur.

15.8. Quibus odor inest cinnamomo proximè
asperum siccumque solum amat. Eius radix,
ptis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficul-
tate, & si vrina agrè redditur, opifera est: men-
ciet, contra serpentium ictus, eam in vino bibi
salutare est. Folia, ut quæ adstringant, illita ca-
tis doloribus, oculorum inflammationibus, incipit

tibus ag ylopys, mammis tumentibus à partu, igni-
bus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crate-
nas herbarius de eo ita scriptum reliquit: Asarū.

24.17. Alij sphagnon, alij phasganon, Syri dia-
xylon vocant.

27.5. Ab aliquibus castor, ab alijs cynomorphos,
à Magis Herculis sanguis appellatur.

28.23. Symphyton aliqui vocant, alij persicam,
alij medicā, alij orestinū, alij nectariō, alij cleoniā:
alij idæabaton, aut phlomū idæum, Latini termi-
narium, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

68.29. Iuniperum paruum Græci arceuthi-
da, aliqui mnesitheum, alij acatalidem, Aphri
Zuorinsipet, Aegyptij libyū, Galli iupicellum,
Romani iuniperum vocant.

69.15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus ma-
gna, quam aliqui sylvestrem cupressum appel-
lant, alij mnesitheum, alij acateram, Romani iu-
niperum, vulgò cognita est, cupresso assimilis: aspe-
ris maritimisque locis plerunque nascitur, easdem
quas supradicta vires habens.

69.17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Ro-
manis herba Sabina appellatur.

76.7. Rhamnum alij persephonion vocant, alij
leucacantham, Romani spinam albam, aut cerua-
lem spinam, Aphri atadim.

76.21. Halimum alij damasonium vocant, alij
erymon, alij britanicā, alij rhabdion, alij basilion,
Magi Mercurij basim, aut Osiridis diadema, alij

DIOSCORIDIS

elystephanon, aut sacrum caule, Pythagoras anth
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascalur
alij asariphen, Latini albucium aut ampelucian

85.6. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant
alij amictomienon, alij tridaetylon, Magi semnon
alij hamaideos, Aegyptij sum, Romani salicem n
rinam, alij piper agreste, alij lecristicum.

122.20. Eorum venter sale conditus, & in vn
bra siccatus, contra eximias vaenationes medic
mentororum, trium drachmarum pondere, prafen
est auxilio: quandoquidem protinus deiectiones c
hibet. Teri autem debet in farinam, & aqua su
actus dari.

138.18. Telin, alij carpon, alij buceron, alij eg
ceron, alij ceraitiden, Latini fenumgracum app
lant, Aegyptij itasin.

159.5. Aliqui linocalamin vocant, alij anno
alij linon agrion, Romani linum, Pæni xeraphoe

164.15. Thermon, Romani lupinum, Aegypt
brechon vocant.

165.10. Gongylen satiuam, alij gongylida, a
golgosium, Romani rapum vocant.

166.10. Aly polyides eryngiū, Aphri thorpha

167.5. Syluestris raphanus, quam Roma
armoraciam vocant, alij montanum raphanum
alij apium, alij ischada, alij chamaebalanum. R
mani etiam radicem syluestrem: ramulos tenu
iunceos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs ru
syluestris, oblongioribus, & angustioribus: semi

paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, py-
ri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet.
Pars radice superior vomitione bilem pituitamq;
extrahit, inferior per aluum, tota susque deq; pur-
gationes mouet. Quod si tibi in animo est succum
extrahere, radix in fictili mergitur, & qui
supernatat succus pinna eximitur. Is se squi obolo
potus, utraque parte purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotripam appellant, aliq;
riplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anthema vocauit, Zoroa-
stres diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem
caprae, aut muris vrinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Ae-
gyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocant.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris
portulaca, quam aliqui aiZon syluestre vocant,
aliq; telephon, Romani illecebram, aliqui portula-
cam, Aphri mæmoen, Daci lax, Aegyptij mo-
chmutim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus,
hirsutis, latioribus: nascitur in petrosis, non-
nunquam in hortis, folia olea habet, minora mul-
tò, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex vna ra-
dice multos, in terra sessiles, qui manducati bo-
num succum pariunt, viscosi, & aliquantum sal-
si. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discutit

DIOSCORIDIS

strumas, cum axungia illita.

173.3. Aliqui petraen, alij myacanthan, alij myon vocant.

173.27. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probation, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneuro, Magi eurechinemona, Aegyptij asonthe, Romani plantaginem, Hispani thesaricam, Poeni atyrcon.

175.10. Syri ius plantaginis, & calaminthe cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

175.12. Aliqui aquatilem anagallida, alij dareon, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

175.21. Alij Veneris coronam, Romani veneriam, aut eusteralem.

176.24. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Poeni atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

177.2. Söchon asperum alij cichorium vocant, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

177.26. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Romani intubum.

180.9. Thridaca hemeron, Romani lactucam sativam, Aegyptij embrosi dicunt.

180.21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrum, Romani lactucam sylvestrem appellant.

181.8. Romani bisacutum, Aegyptij dorisatrum, Syri

Syri adorium, Aphri tiriēta appellant.

181.16. Romani herbam scanariam, aut acnē
lam nominant.

181.21. Alij caucum, alij myitin, Democritus
brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem pul
li, Aegyptij seselin vocant.

181.28. EuXomon Romani Erucam vocant, Ae
gyptij ethrericem, Pæni asuric.

182.27. Alij cynomorion appellant, à similitu
dine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrfinē,
communiter lycon.

185.27. Crommyon aliqui polyidos vocant, Ma
gi calabotim, Romani cepam.

186.26. Græci scorodon, alij geboscon, alij ela
phoboscon vocant.

188.9. Romani sinape vocant.

186.9. Cardamon alijs cynocardamon, alijs ibe
ris, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis
nasturtium dicitur.

189.25. Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicū,
alij myiten, alij sylvestre synapi, alij dasmophon,
alij myopteron, alij bitron, Aegyptij suitepsum,
Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedē gal
linaceum vocant.

190.20. Aliqui chamæplion, Magi Hercules al
phita, Aegyptij erethmon.

194.4. Ab aliquibus cerdon, ab alijs cathar
sis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamæ
rhyton, à Magis callirrhayton, ab Aegyptijs æno, à

DIOSCORIDIS

Pœnis syris, à Latinis lanaria herba, aut radice
la appellatur.

194.18. A quibusdam cissamhemon, ab alijs
cissophyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyothe
ron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites, ab
Osthane aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce,
à Romanis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab
alijs arcar vocatur.

160.14. Dracunculus. Cap. Draguntium ma-
gnum aliqui aron, alijs isaron, alijs iaron, alijs hiera
cium, alijs biaron, alijs armiagrion, alijs ciperida vo-
cant: in umbrosis sepibus gignitur. Caulem habet
rectum, laevè, duum cubitorum, baculi crassitudine,
versicoloribus draconum maculis, purpureis tamẽ
eiuscentibus: folia rumicis, inflexa: fructum sum-
mo caule facit, racemosum, coloris primum cine-
racei, mox per maturitatem in crocum & purpu-
ram vergentis: radicem prægrandem, rotundam,
candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, &
dum maturescit, succus exprimitur, siccaturq; in
umbra. Radix quoque messibus effoditur, elotaq;
particulatim conciditur, & funiculo transfixa
siccatur in umbra. Cum diluta potione, crudam
coctamve, cum melle delingi prodest, contra ore
thopnœas, rupta, convulsa, tuſſim, & destillatio-
nes: pota cum vino venerem stimulat: ulcera quæ
cacoethe vocantur atque phagedenica, expurgat,
præsertim cum vite alba: ex ea & melle collyria
ad fistulas & partus evocandos componuntur: ad
vi

vitiliginēs cum melle, efficaciter illinitur: polypōs
 & carcinomata absumit. Succus ad oculorū me-
 licamenta, item contra nubeculas, caliginem, al-
 buginesq; effectum prabet: herbae radicisq; odor,
 teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta
 grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-
 cum cum oleo aurium doloribus insudare: quin-
 etiā folia, utpote quae adstringant, vulneribus re-
 centibus imposuere, & cocta in vino permionibus.
 Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exes-
 merit, posse à vipera feriri inficiantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracon-
 tiam, Cyprij colocasion dicunt.

198.13. Graeci asphodelon, alij narthecion, Roma-
 ni albucum vocant.

199.11. Floret mēsis albuū. Quare equi-
 noctio verno, antequam semen adoleuerit, deme-
 rendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita-
 tem inhibere, quod herbarius Crateuas asseuerat:
 addiditq; sanare podagra dolores, si drachmae pon-
 dere bibatur.

200.7. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe im-
 positi, tumores ac tubercula velocissimè ad suppu-
 rationem perducunt, & rumpunt.

202.4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij
 corui malum, alij ophioscorodon, alij phyllost-
 phylon, quidam thalliam, aut petræam, alij olo-
 phyton, alij ionitē, nonnulli oligochloron, aut acon-
 tion, aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-
 tera;

DIOSCORIDIS

tera, alij petheron, aut cor lupi, alij alofchorodon,
alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi
aut inturim, Aphri herbiaathon.

203.16. Ranunculum aliqui sylvestre apium vo-
cant.

204.8. Anemonen, alij ugriam, aut nigram vo-
cant, alij anemonen phœnicam, alij enemion, nō-
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen,
aut barbylam, Osthanes berilion, item ornios cera-
nion, Pythagoras atractilida, Magi cnicū agriam,
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

205.16. Aliquibus ænone vocatur, alijs an-
themis, alijs homonœa, aliquibus flos campestris,
Romanis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia,
Gallis corona.

205.22. Ea, ut herbarius Cratenas author est,
contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata
eius farina cum nitro, & sulphure ignem non ex-
perto contra vitiligines efficax est: easq; sicco lin-
teo antea confictas in balneis sanat: facit & ad
scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,
quam artemonem aliqui, alij arselam, aut sarco-
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-
vestri papaveri similis est. Recens trita interci-
siones imposita sanat: oculorum inflammationes
mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur:
vulnera conglutinat: convulsis, & vellicatibus im-
posita medetur, inflammationibus utilis, contra
ser

NOTHA.

serpentium morsus cum vino bibitur.

205.24. Anagallis purpurea, quibusdam aëris
is aut ægitis vocatur, alijs sauritis, Magis oculi
sanguis, aut chelidonium: Romanis macia, Hetrus
seis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphron.
Anagallis communis, quibusdam corchoron, alijs
halicacabon, alijs Zeliaurus, Magis nycteritis,
Aegyptijs mecij, Romanis aneciaton, Aphris asire
risce.

206.12. Aliquibus citharon, alijs cissaron, alijs
chryso carpos, alijs poetica, alijs corymbethra, alijs
cystion, alijs dionysia, alijs ithytherion, alijs persis,
alijs cemos, alijs asplenos, Romanis sylua mater,
alijs hedera, Gallis suibites.

207.17. Chelidonium magnam nonnulli pæo-
niam vocant, alijs crataam, alijs aybium, alijs glau-
ciam, alijs pandios radix, quidam philomedion, alijs
othonion, Romani fabium, Galli ithonan, Aegyptij
mohoth, Daci crustana.

209.13. Auricula muris. Cap. Myosota alijs myo-
ton, alijs anthyllion, alijs alsinen, nonnulli myor-
thocon, alijs myrthosplenon, Latini muris auricu-
lam vocant, Aphri labatholabat. Nomen ideò
accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur.
Lucos & sabulosa loca amat, ideò alsine dicta
est. Ea helxine similis, sed humilior, ac folijs mi-
nor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflam-
mationibus còuenienter ex potentia illinitur. Suc-
cus eius aurium doloribus instillatur: in totum ea-
dem

DIOSCORIDIS

dem potest, quæ helxine.

209.24. Isatis sativa aliquibus augion, alijs egne, Magis arufion, Romani gluta aut glastum dicitur.

210.8. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, sativum glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosque ramulos proferre: in cacumine autem folliculos lingue speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulēque supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiorē: florem purpureum, aut cœruleum, fructū cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito divisum.

210.10. Aliqui sylvestre sempervivum, alijs portulacam sylvestrem appellant, Romani illecebrā, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurin.

213.3. Aliqui rhiam vocant.

123.29. Aliqui centauriam radicem, alijs aloem Gallicam, alijs narcē, alijs chironion, Dardani aloitin, Romani gentianam aut cicendiam, alijs cimicinalem vocant.

214.29. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

216.4. Appellatur à quibusdam erarisa, & melecaprum, ephestios, lestitus, pyxionyx, Dardanion, ionitus, Gallis theximmon, Aegyptijs sophoepl, Siculis chamamelon, Italis malum ter

NOTHA.

terra, Dacus absynthium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si sudore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur: vulnera impositus sanat: carcinomatissarium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest: rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipis suillo, illitaq; Crateus herbarius, & Galenus, eadem de hac tradiderunt, & praeterea podagricis eam auxiliari.

216.6. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithram, alij libyestason, alij homœnomœon, alij peemithaomœon, Latini dulcem radicem appellare.

216.24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronem, alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestim, Magi Hercules sanguinem, Romani hieri, & vneferam, & fel terra.

217.17. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quae inflammationem minantur, plusq; scateat remedijs: pulsationes vulnerum, urinae stillicidia, calculosorum cruciatus, clyster e immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad orientem spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217.19. Aliqui limnesion, alij helleboriten, alij maranton, Magi Hercules sanguinem, Latini febrif

DIOSCORIDIS

brifugam, alij auram, multi radicem, Daci tulbe-
lam appellant.

218.27. Quibusdā chrysisceptron, alijs ixia, Ro-
manus carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur,
alijs ephithosechin.

219.18. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij
ixiam, alij cynomaſon, alij ocimoides, alij cnidion
soccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum
aut vernilaginem, Aegyptij sobel vocant.

220.22. Aliqui crocodilion vocāt, alij chameleo-
nem, alij onocardion, alij Veneris lauacrū, Roma-
ni labrum Veneris, alij carduum Veneris, Aegy-
ptij seneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

221.11. Aliqui agriocinnarā, alij donacitin, alij
erysisceptron vocant, Romani spinam albam aut
regiam, alij carduum ramptarium.

221.26. Quae acanthis aliquibus dicitur.

222.3. Alias pherusa, alias pyracantha nominat-
ur, in Aegypto cnius.

222.12. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

222.25. Acantham aut herpacantham, quidam
melamphyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā,
quidam crepulam vocant.

224.7. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij
ischiada vocant, Romani spinam albam.

225.2. Aliqui eryngen, alij eryneren, alij ca-
ryon, alij gorginion, alij hermion, alij origanum,
chlounion, alij myracanthon, alij moly, Aegy-
ptij crobysen, Magt systeron, Romani capitulum

N O T H A.

m Martis, Daci sicupnoëx, Hispani centumca-
ta, Aphri cherdam, aly oriam chloëm, aly chida
pellant.

225.22. Aloë aliquibus amphibion, aly hermi-
on, aly erylion, aly tragoceros, Romanis aloa,
arbaris aloë dicitur.

227.16. Aegyptij somi, Romani absynthium.

228.24. Latini Sandonicum vocant.

229.13. aly abutonon, aly absynthium, aly hera-
ion, aly cholopæon, aly absynthiomenon, aly the-
phthorion, aly procampylon, Magi aëuraphæ-
cos, aly cynanchiten, Romani absynthium ponti-
um, nonnulli thelythamnum, aly glycin ancona vo-
cant.

230.7. aliqui later vocant, aly cassialam, Aegy-
ptij pesalem.

230.26. aliqui syncliopa, aly alcibiadem, aly
incration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo,
Magi pythons oculum, Romani sciotebinam vocant.

232.37. vers. vlt. Glichona aly blechron, aly ar-
ncanthon, Latini pulegium vocant, Galli aluo-
m, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

233.16. aly embactron, aly belouacos, aly ar-
medeion, aly cretica, quibusdam ephemeron,
nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion,
et helbunion, Romanus vstilago rustica.

234.19. aly elaphoboscon, aliqui phacon, aly
osmin, aly phagnon, Aegyptij becion, Roma-

N

DIOSCORIDIS

si saluam vocant.

235.4. Hedyosmon satium alij miniham, alij calaminiham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherithrumerthumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymida, alij thyrsion, Latini thymum, Aegyptij stephanem, Daci mosulam.

237.23. aliqui xygin syluestrem, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominant amaracum, alij triphyllon, alij agathides, alij cnecon, alij acapnon, Pythagoras thramben, Aegyptij sopho, Armeni myuron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidori Latini maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocant.

229.28. aly syluestre basilicum, Latinis ocimum strum.

240.25. ruta montana, quam aliqui rhyt montanam vocant: & hortensis, quam Aegyptij epnubū, Syri harmala, alij besasa, Aphri churmi.

242.25. Syluestris ruta Cap. Rutam syluestrem aliqui appellant hypericon, alij androsomon, alij coron, alij chamapityn, Romani hederalem, alij centonalem, Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus est, ideo chamapitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia rupe figura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant, unde androsomon vocitarunt. Ram

bbirsuti, siliqua teretes, hordei effigie, in quibus
men nigrum resnam olens, gignitur incultus &
peris. Vrinam ciet, menses appositum trahit, pota
m vino quartana liberat. Folia cum semine am-
stis illitu medentur, & diebus quadraginta epo-
ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leucoion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant, Latini rusti-
um pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babi-
yron, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida
vocant, alij anicetum, Magi cyncephali genitu-
um, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini ane-
um, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci
ulpum.

250.18. siue cuminum syluaticum.

251.11. Animi, Latini ammiu Alex. andrinum,
uidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.6. alysonchites, Romanis lampuca, Pœnis
thileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion,
omani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedion, ab alijs hydroseli-
on agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant,
Aegyptij anonum.

DIOSCORIDIS

254.6. aliqui grielon, alij agrioselinum.

255.22. aliqui elaphicon, alij nephron, alij oph
genion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpycen, ali
lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij ch
min, Aphri ascaucau.

256.25. hippomarathrum, aliqui marathin, ali
marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, Magi thy
marnolion, Latini fœniculum erraticum, aliqu
mion, Galli fistrameor.

257.29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs par
lysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs delphi
nias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosan
dron, aut cronion, Romanus bucinus minor voc
tatur.

258.14. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij pyr
ton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, Magi pyri
ten, Romani saluarem vocant.

258.25. aliquibus xea aut campsanema appel
latur.

260.19. aliqui arangem vocant, alij phalan
gion, alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondy
lin, quidam chorodanon, aut oenanthen, Roman
herbã rutinalem, Aegyptij apsapher, Magi osirin

261.21. aliqui agrion vocant, alij agriophyllon
Magi bonum demonem, Romani satariam.

263.8. aliqui melanthium, alij mecona agrio
melana, Romani papauer nigrum appellant.

269. 2. herba est, ex qua ammoniacum fit sus
fimen, quod thymiama vocant, aliqui agaxyllon
ali

N O T H A.

lij criothem, alij heliustrum, Romani guttam.

271.18. aliqui ampelocarpon, alij omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

271.29. aliqui aspidion, alij haplophyllon, alij ccyseton, alij adyseton nuncupant.

272.12. aliqui cission, alij cissophyllon.

272.20. aliqui armyron vocant, alij cnicon sylvestre, alij aspidion, Magi aphedron, Aegyptij cheon, Romani praeseptum, aliqui fusum agrestem, ly colum rusticam.

273.2. quidam clinopedion, alij polygonaton, alij ouis colum, alij echeonymon vocant.

273.8. Edocuit experientia contritos in vino aliorum ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentæ vocantur, magno esse praesidio.

273.10. aliqui cleonicon, alij ocimoides, alij xonyron vocant.

273.21. aliquibus leontopodion, alijs leuceoron, alijs leontion, alijs doris, aut doricteris, alijs lychnis, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhaeion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

275.4. aliqui athanaton vocant, alij acylonion, alij ballarion, alij geranopodion, quidam corymbion, aliqui taurion, alij sceptron, aut maloion, Aegyptij semeon, Magi sanguinem apocathemenes, Romani gemcularem aut ballariam.

275.7. aliàs tragonaton, aliàs atocion, aliàs neracopodion, aut lampas vocatur, Aegyptijs

DIOSCORIDIS

semura, Magis apocathemenes taurus, Romanis a-
grete intubum.

275.13. Crinon basilicon alij crinanthemon vo-
cant, alij gallirion, Magi Martis sanguinem, Osth-
nes aurem crocodili, Aegyptij symphaphon, qui-
dam tialon, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Sy-
ri sasa, Aphri abiblabon.

276.5. Alij magnū vocant, aliqui naphi han, al-
notiano scemin, alij nosprasson, alij nothera, alij no-
chelin aut nostellin, alij nophryn, alij gnotorim, al-
gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut vlce-
rariam, aut marrubium nigrū, alij canthurinum.
Aegyptij asphon, magi Isionis sanguinem.

276.18. Alij melitæon, alij meliphryllon, alij er-
thran, alij teme le, Latini apiastrum aut citragi-
nem, Galli merisimorion vocant.

277.5. Prasion, alij eupatorion, alij phyllopha-
res, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij ast-
ropen, Magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, al-
Horigeniturum, Latini marrubium, aliqui labeo-
niam, Aphri atierberxiam.

278.6. Aliqui phyllin, alij acaulon, alij sylue-
stre lapathum vocitant.

278.16. Alijs leucacantha dicitur.

278.26. Alij crucion vocant, Romani trifolium
acutum, aut odoratum.

279.24. Polium montanum, aliqui teuthrion
alij pheux aspidion, alij achamenin, alij ebenitin
alij melosmon, nonnulli belion, quidam leontocha-

rex

on vocant.

280.22. Aliqui scorbion, alij pleuritin, alij dy-
osmon, alij sylvestrem calaminum, quidam cha-
nædryn, alij mithridanion, Magi Podotis sangui-
nem, Aegyptij apho, Romani trissagine palustrem
appellant.

281.13. Bechion quidam rhichion, alij petri-
am vocant, alij peganon, alij pithion, alij pagona-
on, alij chamæleucen, alij procheton, alij arcophy-
on, alij chamægeron, Aegyptij saarthan, Latini
usilaginem, quidam pharphariam aut pustulagi-
nem, Bessi asa.

281.28. Quibusdam polyclonos, alijs monoclo-
nos, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anactorios,
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis homi-
is sanguis, alijs chrysanthemon, Romanus valen-
ia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia,
alijs rapium, aut tertana, Gallis pona, Dacus quosle
licitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum du-
tus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sam-
suchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans,
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in
malagmati lentorem, & stomacho imponat, sani-
ati restituetur: qui nervorum dolore cruciantur,
succum ex rosaceo illinant, sanantur.

282.18. Romani caprum sylvaticum vocant,
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij

DIOSCORIDIS

merseon.

283. 6. Aliqui Pelonitin, alij tricam, alij gera-
nogeronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen a-
pellant.

283. 9. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij ox-
phyllon, alij cardamomon, alij organum vocant
Magi hierobryncas, Latini gruina, aut pulmo-
niam, aut cicotriam.

282. 15. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocom-
alij anaxiton, alij anaphalin, Aegyptij semeon, Ga-
li gelafonen, Latini centumculum vocant, quidam
tucularem, alij albinum.

284. 8. Aliqui cerascomion, alij leucanthion vo-
cant.

284. 15. Conyza magna. Cap. Conyza magna
aliquibus cynoxematitis, alijs danaus, alijs tana-
chion, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dy-
nosmos, Magis brephoctonos, quibusdam anubias
nonnullis hedemias, Aegyptijs ceti, Romanis inty-
bum, aut militaris, aut deliarium, aut febrifuga
alijs phragmosa, alijs musteros, alijs pissia nuncu-
patur.

285. 2. Aliqui conyzam parvam, alij panion, alij
libanotidem, Magi cronon vocant.

285. 10. Alij hemerocatalacton, alij crinon a-
grion, alij crinanthemon, alij porphyranthes, alij
bulbum hematicon, alij anticantharon, Aegypti-
iocri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut ma-
rinum, Aphri abiblabon vocant.

NOTHA.

285.28. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alij melion aqueum, alij entaricon, alij priapicon, aut satyricon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. à Latinis geminalis, à Dacis hormia dicitur.

289.14. Aliqui osmada, aliqui ononin, alij phloinitin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrada appellant, alij leucen, alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitim, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, Magi mustela sanguinem.

291.26. Quidam anthyllon, alij anthemida vocant, alij eranthemin, alij leucathemon, alij soranthin, alij campestrum florem, Romani solastrum.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamamelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani malium, Aphri a tertiphen appellant.

293.11. Alij anthemida, alij leucanthemon, alij chamamelon, alij chrysoalin, alij melabathron, nonnulli campestrum florem, Romani solis seculum, aliqui millefolium, Hetrusci cautam, Aphri thamath.

DIOSCORIDIS

294.5. Alij balsamenā, Magi hamorrhā, ali
Mercurij geniturā, ali aphilitis semen, aut mne
sithem, Romani Cappacorianam, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelion, quibusdam orobax,
alijs hamagogen, alijs paseden, alijs monogenion,
alijs menion, alijs pæonion, alijs panthiceratos, a
lijs idæi ductyli, alijs aglaophotis, alijs theodonion,
alijs selenion, Magis selenogonion, alijs phthisis, Ro
mani castra.

295.12. Alij ægonychon vocant, ali leontion,
ali leoninum lapidem, ali gorgonion, ali tantali
zin, ali diosporon, Romani columbam, Daci go
noletam, ali heraciam.

296.3. Aliqui teuthrion, ali dracanion, ali cin
nabarim, Latini rubiam, Helrusci lappam mino
rem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Alias cestron aut medusa dicitur, Las
tinè venerea aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinam dicunt.

297.12. Alij althiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, ali schinostrophon,
ali asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydrastinam, Romani termi
nalem dicunt.

299.26. Aliqui acopon, ali anagryron, ali agna
copon vocant.

299.27. Alij alceam, ali acyron, ali lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, ali eschasmenē,
ali hypericon, ali corion, ali chamæpytin, Ro
mani

NOTHA.

mani opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocinalem, Daci aniaffexe appellant.

301.24. Alij ascyron, aut dionysiadem.

302.21. Alys pitysorysis, alijs ori Zelon, is qui Pontum incolunt olecyron, alijs bryonia sylvestris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, Magis Minerue sanguis, Latini ainga aut cypripum, Dacus doche la appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacu, circa frutices: animas hominum & corpora custodit, no eternas ambulationes, & loca sancta: grauib somnus resistit: ad omnem medendi vsum commenda. Radicem habet rubram, odoratam, perracea folia, medio eorum punceo, in recto calamo triangu la, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorem finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij heracliam, alij asphalton, alij chiliophyllon, alij clema, alij polycarpon, alij carcine thron, alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion, alij Zari theam, alij pedalion, Aegyptij thephin, alij stemphin, Magi genituram heron, alij qui unguem muris, Latini sanguinariam aut seminalem, Aphrichulum,

DIOSCORIDIS

307.27. Alijs philetæon, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7 Aliqui epigeton, Aegyptij philacuon, Romani ambuxum vocitant.

309.23. Romani soldaginem vocant.

310.1. Rutaceis similes.

310.29. Alij tobion, Romani stipam vocant.

310.26. Alij calycanthemon, alij periclymenon, alij heliophyes, nonnulli hepatitum, alij milacem, alij anatolicon, alij diticon, alij merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyani, alij clymenon, alij clymenion, quod & agonon nuncupant.

311.8. Aliqui Aeginam, alij clymenon, alij carpathon, alij splenion, alij epetitum, alij axinā maiorem, nonnulli clematitum, alij myrsinen, alij calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauruceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18 Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon aliqui sarxiphragon, alij empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitatibus opitulatur: stranguriae prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs

N O T H A.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mys-
sij mendruta, Syrus neuda, alijs lycosemphyllon:
alijs helleborosemata, alijs scyllion, Magis lupicor,
Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabu-
lum terra, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

312.27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313.2. Aliqui medicam appellat, alij triphyllon,
alij clemation, nonnulli osmon, quidam trigonon,
alij cypellion, alij polyphyllon, Romani trifolium
odoratum, Aegyptij epaphon.

313.11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à non-
nullis pollyrrhiō, à Romanis vindicta nominatur.

313.21. Aliqui anactorion, alij phasganon, alij
machæronion, alij arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genitalem.

314.10. Alij bolon vocant.

314.16. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos,
à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis a-
prus dicitur.

315.2. Anchusam aliqui catanchusam vocant,
alij libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij
onophyllon, alij porphyrida, alij mydusam, alij sa-
lyca, alij noneam, Aphri buinesath.

316.12. Aliqui aridam, alij alcibiadion, Roma-
ni alcibiicum nominant.

316.25. Aliqui & hanc echion vocant, alij scor-
piuron, alij sparganon, alij althæam, alij amarāti-
da, alij probatæam, alij elaphion, alij antimonon,
alij porphyrida, alij augion, alij nemesion, alij phi-
leter

DIOSCORIDIS

leterion, alij hyenopsolon, alij thyrstitim, alij therā
mutin, alij misopathos.

317.8. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egicon, alij amaxitin,
Aegyptij amphu vocant, Latini gramen, aliqui
asyphyllion, alij sanguinalem, alij vniolam, Hispani
apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

318.9. Magi genitiram, aut sanguinem Titani,
alij scorpionis vrinam, Pythagoras parmiron,
Andreas xanthophanea, Osthane boephthalmō,
Aegyptij sendionor, Romani vertemnum, alij so-
leastron, Aphri vdedonin.

319.5. Aliqui myriomorphon nominant, alij
chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, La-
tini supercilium Veneris, alij acron syluaticum,
alij militare, alij millefolium.

319.19. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs seli-
morition, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani san-
guis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus,
ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à
Dacis mantia, Aegyptijs hemoos, alijs ametros
appellatur.

321.2. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani
volucrum maius.

321.17. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alij pen-
tatomon, alij pentadaetylōn, alij pseudoselinū, alij
callipetalon, alij xyloleton, nonnulli xylopetalon,
alij asphalton, alij pentacœnon, alij thymiatitin,
Aegyptij orphitebeocen, alij enotron, Magi ibidis
vng

N O T H A.

inguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon.
Romani quinqsolum, Galli pempedulam, Daci
propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phæ-
nicopteron, alij rhon stuchyos, alij osthaleu, Aegyp-
tiij athnon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anabao-
sin, alij cheredranon, alij phædran, alij utiand-
dron, alij gu, alij schæniostrophon vocant, Aegyp-
tiij pherphram, Magi Saturni cibum, Romani
equinalem, alij equi salicem, aut anabasion, alij
ephydron.

324.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganon, Romani cor-
nulacam, alij bituensa, Daci saliam, Aegyptiij so-
ber, Aphri achæosim.

325.20. Oxyschænos aliquibus schænos leuis,
alijs oxypternos, alijs Solis supercilium, Romani
iuncus marinus, aut manualis, Aphrus chudua di-
citur.

326.13. Alijs adocetos, alijs neuras, alijs phry-
nion, Romani bouinalis.

326.17. Alijs chrysitis, alijs chrysanthemon,
nonnullis amaranton, alijs diospogon, Aphris du-
bath, vel barchumath, Romani Iouis barba ap-
pellatur.

326.26. Aliqui chrysofermon vocant, alij da-
spin.

DIOSCORIDIS

spin, alij origanon, alij arcophthalmon, Romani arilariam.

327.19. Aliqui chalchitin vocant, alij chalcantthon, alij chalcanthemon, Romani acantham, Hetrusci garuleum, Aphri churfeten.

328.8. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobotanen, alij philtrodoten, Aegyptij pemsempe, Magi Iunonis lacrymam, nonnulli mustela sanguinem, alij sanguinem Mercurij, Romani cristam gallina ceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij exuperā, alij qui herbam sanguinalem.

328.20. Alij erigenion, alij chamælycon, alij sideritin, quidam curitin, alij persephomon, alij Iouis colum, alij dichromon, alij callesin, alij hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij pemphthenphluham, Pythagoras eryscisceptron, Romani cinnamalem.

329.11. Aliqui chamæfycen, alij gatalen, alij onycha vocant, Romani pinum triuiam, aut ficum terra, alij qui glandulam, alij tium, alij nonariam.

329.22. Aliqui heloniam, alij porphyranes, Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

330.4. Nonnulli oxytonon, Romani papaueralem, Aegyptij nanti.

330.22. Papauer satium alij qui chamæfycen, alij papauer rhoxada, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti.

333.13. Aliqui paralion, alij syluestre papauer, alij thalasion, Romani fabulum marinum, Aphri fism

issimacam vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia acci-
dunt, quàm qui opium ebberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij pythionion, aliqui dioscyamon vocant, alij adamantia, alij adamenon, alij hypnoticon, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dihiambriion, Magi, Pythagoras & Osthane, xeleo, Zoroastres, iphionion, Magi rhapsodicā, Romani inananoenariam aut apollinarem, Aegyptij saphiho, Hetrusci fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

336.9. Aliqui cataphysin, alij cynocephalion, alij chrystalion, alij cynomyam, alij psyllerin, alij sicelioticon, Sicuti comidyn, Romani herbam puliscarem aut silbacium, Aphri vargugum appellāt.

336.27. Romani strumum vocant, alij cacubulum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismum vocant.

338.2. Aliqui dircion appellant, alij strychnonmanicon, alij dorycnion, alij calliada, Romani apollinarem minorem, alij vlticanam herbam, aut opsaginem, Daci cycolidem, Pœni cacabum.

338.19. Strychnonmanicon, alij anydron, alij pentadryon, alij enoron, quidā orthoggyion vocant.

339.22. Alij exeranthès, aliqui antimnion aut antimion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras anthropomor-

DIOSCORIDIS

phon, alij alæten, alij thridaciam, alij cammaron,
Zoroastres diamonon, aut archinen, Magi hemio-
nos, aliqui gonogeonas, Romani caninum málum,
alij terrestre málum.

342.18. Alij cyamon leucon, Rom. colomestrü.

343.4. Conion, aliquibus aginos, alijs ethusa,
alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs pa-
ralysis, nonnullus aphron, quibusdam creidion, alijs
cæten, alijs catechomeniö, alijs abioton, alijs apseu-
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody-
nos, alijs dardanis, alijs catapsyxus, Osthani baba-
thy, Aegyptijs apemphi, Romanis cicuta appel-
latur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij par-
dalianches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij
phaleon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippo-
manes, alij onistia, alij ophioscorodon, alij cynari-
cam, alij elaphoscorodon, Magi paralysin, Romani
brassicam rusticam aut caninam.

344.20. Alij spongon, alij hæmostarin, Romani
rhododendron, Lucani icmanen, Aegyptij schim-
phen, Pœni rhododaphnen dicunt.

346.23. Aliqui elitim vocant, alij canocerseam,
alij amelxinen, alij eusinem, alij amorginen, alij
sucotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij
cittampelon, alij cissamethon, alij anetetamenon,
Romani volutum laparon, Aegyptij apap, alij par-
thenion, alij sideritin, alij heracleam, nonnulli as-
griam, quidam clibodion, alij polyonymon.

347.

N O T H A.

347.9. Alij myortochon dicunt, alij myorto-
lenon, Romani muris auriculam: Poeni laba-
solabat.

347.20. Agriam phacon aliqui, alij epipteron,
romani viperalem, alij iceosnigdonon vocant.

347.27. Aixoon maius, aliqui aithales, alij
mbrosion, alij chryssipermion, alij Zoophthal-
on, alij bubophthalmion, alij stergethron, alij æ-
on, alij aichryson, alij holochryson, nonnulli chry-
nihemon, alij protogenon, alij boron, alij notion:
agi paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam
spiam, iuxta Iouis caulem nominant, alij leapetes,
sedum maius, Aegyptij pamphanes.

348.17. Aixoon paruum, alij petrophyes appel-
ant, alij brotion, alij thesbrotion, crobrysson, alij
imerinen, alij ceramiam, Romani vitalem, alij
imperuium, Aegyptij et i celiam.

348.24. Semperuium quod tenui constat fo-
liis, aliqui aixoon paruum, alij petrophyes, alij ai-
on sylvestre, Romani semperuium minus ap-
pellant.

349.2. Aliquibus cymbalion, alijs scytalion,
alij hortus Veneris, alijs terra umbilicus, alijs
echus, alijs stergethron, Latinus umbilicus Ve-
ris dicitur.

349.19. Acalyphen aliqui enidem, alij adicen,
atini urticam, Aegyptij selepsion, Dacidyn ap-
pellant. Acalyphen etiam alteram aliqui eniphen,
romani urticam mollem vocant.

DIOSCORIDIS

350.12. Alijs galeobdolon, vel galephos, Aegyptijs etopi, Latinis vrtica labeo dicitur.

350.23. Alijs galation, aut gallerion.

351.4. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, aliàs erechihites.

351.25. Marimum bryon, aliqui ballarin, alijs iranen, Latini gnomeusilon vocant.

352.14. Alias stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

352.20. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nuncupatur, Aegyptijs tibus, Magis eluri sanguis.

353.11. Phlomon, alijs phlonon, Latini verbascum, alijs pheminalem vocant.

355.8. Arcion alijs profopida, alijs profopion, alijs aparinen, Latini personatam, aut lappam appellant.

355.24. Alys borion appellatur.

355.28. Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocant, alijs syluestre corydalion, alijs capnon in hordeis, alijs capniten, alijs marmariten, alijs capnogorgion, alijs chelidonion micron, alijs peristerion, alijs caniharida, alijs chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptij enyx, alijs tucin.

356.7. Alijs tripodion, alijs tribolion.

356.12. Aliqui libyon, alijs triphyllon.

356.22. Aliqui telinen, alijs lotum magnum, alijs triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

357.18. Alijs meliphyllon, alijs stratioticem, alijs achillion, Latini millesfolium vocant, aliqui super-

ci

N O T H A.

ilium veneris, Galli beliocandas.

357.27. Alij myrrham, alij conilen vocant.

358.23. Aliqui buglossum magnum vocant, Romanani spinam mollem.

359.6. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyothihalmion, Romanus inguinalis, Dacis rathibus.

359.19. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non viderunt, esse inaeque simulacrum arbitrantur. Medys saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateus Rhicotomus hac de ea refert: Si viridis cum axungia petere tundatur, contra rabioforum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoque serpentes fugat.

359.27. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij on syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut murariam, aut violam purpuream vocant.

360.5. Aiunt quod purpureum est in flore, aninis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

360.16. Aliqui aton, alij actinen, alij anemobhoron vocant magi paradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli hepsa.

361.2. Alio nomine chamæleuce, alio cissos carpos, aut terræ corona, aut selinitis, Latine heera pluuiatica dicitur.

361.17. Magi eluri gonon, Osthane txamibi, Aegyptij autuenrinbesor, Romani linguam

DIOSCORIDIS

bubulam, alij libanium, Poeni asanaph vocant.

362.2. Alij phyton, alij caballation, alij spli
neion, alij scolymon, Romani linguam canis, an
caninam appellant.

362.14. Aliqui xoonychon vocant, alij aëtony
chon, alij cemos, alij dānamenem, alij idiophyton
nonnulli phytobasilam, alij crosion, alij crosso
phthoon, Magi sanguinem crocodili, alij crocome
rion, Aegyptij daphnænen, Romani numercium
alij palladium, alij neumiatum, alij flammulam.

362.23. Aliqui & id antirrhinon, alij anarrh
non, nonnulli lychnida agriam vocant.

362.29. Nonnulli lychnida agriam appellant.

363.8. Catanance aliquibus damnamete, alij
dionysias, alijs thyrion, alijs demos, alijs cemos
alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Ro
manus herba filicula, alijs datisca, Dacis caro
pithla dicitur.

363.21. Aliqui psychen, alij merida, alij pota
mogitona, alij stachyiten, Romani caliummaren
nominant.

364.11. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Ae
gyptij epier, Romani cincinnalem, alij terræ ca
pillum, alij supercilium terræ, Daci phithophi he
thela vocant.

365.4. Aliqui pterion, alij opteron, Roman
capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnull
& eam adianton appellant.

355.11. aliqui phasganon, alij antiuhsion, alij chascanon, alij chocradolethron, alij & hanc aparinam nominant, Latini lappam.

355.24. aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs bromos, Romanis auena dicitur.

365.29. aliqui siphonion, alij acrospelon vocant.

366.28. alijs epapitis, alijs lycanibemon, alijs cynosbaton, alijs anicetō, alijs heliophiton, alijs anatonicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe, Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

367.23. alijs hieromyrton, alijs myacātha, alijs agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos, alijs anangelos, alijs aceron, alijs ocneron, alijs cinnen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæmyrtē, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura appellatur.

368.10. aliqui idaan, alij danaen, alij hippoglotton, alij Zaliā, alij stephanen, alij daphnon, alij famoithracicen, alij melhron, alij hypoglossion vocant.

368.19. Daphnoides alypo simile, flos ut nymphaea, cuius medium nuci cypressi non d. simile, in quo semen: aliqui chamædaphnen, alij peplion, alij eupetalon vocant.

369.2. aliqui & hanc alexandrinam appellant, alij daphniten, alij hydragogon, Romani laureolam, alij lactaginem, Galli vsubim.

369.11. aliqui ascida vocant, alij atomon, alij pigatoxarin, Magi sanguinem Herculis, alij polyt-

DIOSCORIDIS

dos, alij anaphyſton, Aegyptij ſomphia, alij vnre,
Galli laginum, aliqui anepſa.

370.22. aliqui melanpodion vocant, alij ecſto-
mon, alij polyrhizon, alij protion, alij melanorrhio-
zon, alij cyiranion, Magi xomarition, Aegyptij
iſeam, alij elaphine, alij cemeleg. Latini veratrum
nigrum, alij ſaraca, Daci prodiorna.

372.10. aliqui ſeſamiten, alij ſeſamin, alij lyco-
cytalion, alij helleborum album appellant.

372.17. aliqui coronion, alij ſeſamon ſylueſtre.

372.27. aliqui elaterion vocāt, alij grynon, alij
balin, alij ſyncriſin, alij bubalion, alij ſcopion, alij
pherombron, alij peucedanon, alij notion, Romani
ancetum, alij agreſtem, Pœni cuſimexar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris
trita radix, & drachmæ vnius pondere pta in hy-
dromelite, vomitus ciet. Si quis facilè ſecundum cœ-
nam vomere velit, binis obolis ſit contentus.

375.16. alij triphyllon, alij ſteſion, alij aſtaphi-
da, alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apanthro-
pon, alij polyides, alij pſeudopathes, alij arſenoten,
Aegyptij ibeſaceden, Romani herbam pediculariã
vocant.

376.4. aliqui hypopyon vocāt, alij pancranen,
alij ſcammonion, alij thelyterim, Romani ſerulagi-
nem, alij ſerulam ſylueſtrem, Pœni boeden.

378.17. aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.26. aliqui narciſſon anydrō, alij autoge-
nes, alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbū
morb

NOTHA.

morbitorium dicunt.

380.16. alij hippophyes, alij hippophanes, alij hippion, alij echinon, alij pelecimon, Romani lappiginem vocant.

381.17. aliqui sesamon sylvestre vocant, alij selseli cyprian, alij crotona, Aegyptij systhanna, alij qui trixin, magi sanguinem febræ, Latini ricinū, alij lupam.

382.5. aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canapicon vocant.

386.13. aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. alij spumosum papauer vocitant.

387.20. aliquibus scambonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs famulum dicitur.

389.5. alij chamaelea nigra, alij pyros achnen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleagine, quidam oleastellum vocant.

389.16. alij chamaeleam, alij pyros achnen, alij cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dendron arctu, alij hemon, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci sebam vocant.

390.23. alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Eubolica, Gallis ducone, Daci olma.

392.2. nonnulli ischiada, alij chamæbalanum agriam, alij linozostin, Latini radicem sylvestrē.

D I O S C O R I D I S

Pani thorphathsadce appellant.

392.16. aliquibus colocyntha egos, alijs sicca pira, alijs alexandrina colocyntha, Zoroāstri thymbra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita sylvarica, Dacis tutrastra dicitur.

393.8. alijs cedres, Romani involucrum vocant.

394.15. alijs ophiostaphylon, alijs chelidonium, aut melothron, aut psylthron, aut archezostin, aut agrostin, aut cedrostin appellant.

395.22. alijs chironion ampelon, alijs bucranion, Romani oblameniam, alijs batanutam, alijs betisalcam, Daci priadelā, alijs pegrinā, Aphri lauothen.

396.8. Pterin alijs pterion, alijs pterineon, alijs dasyclonon, alijs anasphoron, alijs blechnon, alijs polyrrhizon vocant, Magi hermubain, Romani filicem, alijs laculam, alijs filis sanariam, Aegyptij asini sanguinem.

396.23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin nominant, Romani linguam ceruinam.

397.9. Polypodion aliqui scolopendrion, alijs pterin, alijs polyrrhizon, Latini siliculam vocant.

398.2. aliqui pterion, alijs nymphæam pterin nominant.

398.21. alijs argyron, alijs aritrillin, alijs chrysitin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem masculā, alijs tessiculatam, Aphri asumes.

399.6. aliquibus linostus, Aphris armas, alijs asumes labon dicitur.

399.14. aliqui scorpiuron vocant, alijs heliotropon

NOTHA.

pon, alij dialion, alij heliopon, alij scorpioclonon, alij sesamon agrion, alij scorpij vram.

400.4. alij qui scorpiuron vocant.

405.3. Idem adstringit: prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item vis qui ilei dolore confluctantur: conuenit in grauidarum malacia: sorptum auxiliari constat, cum populatum grassatur pestifera lues. Huiusce modi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

429.17. quam alij Medicinam, alij symphyton, alij idaum phlomon, alij orestion, alij nectarion vocant.

448.6. alij larbason, alij gynacion, alij Chalcedonion.

458.20. alij pecton, hephion, aracton, lonchoton.

505.7. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum ferat, contra venena & improbos homines proderit: pecoribus iuuandis appenditur: nauigys circumponi solet: valet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter facit, lassitudinē discutiet: & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruesacito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est:
strangul

DIOSCORIDIS

strangulatuū vuluē mirum in modum auxiliatur:
vrinæ stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylū si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarū tumores, ruam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, pforam pernicali fame cōtractam iuuat remoratos à partu menses eijcit: infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cū luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorū auxiliatur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinē reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnū siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas præpurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, vt presenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinam illinito. Herbam vere, magnis aestibus, autumnūq; eruito.

De

NOTHA.

De Salvia.

Salvia singultum tussimq; discutit: omnibus malis ulceribus cum cera & rosaceo sumpta auxiliatur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum vino albo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, potum medetur: ad extrahenda vulvae onera efficacis est: pessimae mulieres pessum ex ea subiciunt, ut partus excutiant.

De Cupresso.

Cupressus herba contra raucedines auriculasq; prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centauro.

Centaureum contra inflammata vitia & pulsantes ictus valet foeminis vulvae malo laborantibus auxiliatur: stillicidij urinae, calculorumq; tormenta leuat. Herbam vere oriente sole legito.

De Buphthalmo.

Buphthalmum crescente luna legere oportet. Facit autem contra pavores, larvas, & mala medicamenta, fascinationes, utpote cum eas auertat. Radicem si quis mandat, dentem expuet, fluxionemq; confestim sistens auxiliatur: quin & ventrem resoluit.

De Paeonia.

Paeonia herba per aestus Canculae ante Solis ortum vellitur: appensaq; contra venena, fascinum, pavores & larvas prodest: item contra febrem cum horrore venientem, diurnam nocturnamve, & ad
uer

DIOSCORIDIS

uerfus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorū & fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te cōferes: ve-
getiores reddit pueros, imo ventri appensa & ad
arcendos pauores nocturnos manu teneto. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arecentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortū eruatur,
& collo appendatur, veneficas mulieres omnesq;
fascinantes amolitur.

De Erysimō.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventris
dolorem bibitur: si quis grana septem domum inie-
cerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs hoion di-
citur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans.
Bibitur contra omne venenum, & iocineris vitia.

FINIS.

INDEX

INDEX OMNIUM
quæ in Dioscoride
continentur.

| A | | A | |
|---------------------|-----|-----------------|-----|
| Brotonum | 229 | Adeps omnis | 335 |
| Absynthium | 227 | Adianton | 364 |
| Absynthium marinū | 228 | Aegilops | 365 |
| Absynthiū Santonicū | 229 | Aeris squamma | 442 |
| acacalis | 76 | Aeris flos | 440 |
| acacia | 83 | Aerugo rasa | 442 |
| acacia altera | 84 | Aerugo scolecia | 444 |
| acantha, us | 223 | Aes vltum | 439 |
| acanthium | 222 | Aethiopis | 354 |
| acanthus syluestris | 223 | Aetites lapis | 482 |
| acetum | 413 | Agallochon | 25 |
| acetum è betonica | 427 | Agaricum | 211 |
| acetum mulsum | 414 | Ageraton | 327 |
| acetum scillinum | 416 | Agnus | 85 |
| acetum è storachade | 427 | Aiuga | 302 |
| chillea | 319 | Alabastrites | 480 |
| chras | 99 | Alcea | 298 |
| cida muria | 415 | Alcibiadion | 315 |
| onicinos | 239 | Alcyonium | 473 |
| ocorum | 8 | Alisma | 299 |
| oconitum | 342 | Allium | 186 |
| isdarces | 474 | Aloe | 225 |
| | | Alfine | 347 |
| | | Alc | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Althæa | 297 | Anisum | 249 |
| Alumen | 464 | Anonis | 223 |
| Alumen scissile | ibidem | Anthemis | 292 |
| Alus | 309 | Anthericum | 198 |
| Alysson | 271 | Antyllis | 291 |
| Alypon | 393 | Antipathes | 475 |
| Amaracum | 238 | Antirrhinon | 362 |
| Amaranton | 327 | Antispoda | 439 |
| Ambrosia | 282 | Aparine | 271 |
| Amiantus lapis | 481 | Aphaca | 184 |
| Ammi | 251 | Apiastrum | 276 |
| Ammoniacon | 269 | Apios | 392 |
| Amomis | 20 | Apium | 253 |
| Amomum | 19 | Apocynon | 344 |
| Ampelitis terra | 486 | Apollinaris | 334 |
| Ampeloprason | 186 | Apri iecur | 121 |
| Amphisbænæ ictus notæ | | Apum ictus curatio | 537 |
| 531. eius curatio | 541 | Aqua | 412 |
| Amurca | 88 | Aqua frigida | 515 |
| Amygdalæ amaræ | 101 | Aqua marina | 412 |
| Amylum | 157 | Aqua mulsa | 411 |
| Anagallis | 205 | Arabicus lapis | 480 |
| Anagyris | 299 | Araneus | 126 |
| Anchusa | 315 | Arbutus | 101 |
| Androsaces | 290 | Arcion | 355 |
| Androsamon | 301 | Arction | 354 |
| Anemone | 204 | Arcturon | ibidem |
| Anethum | 249 | Arena | 483 |
| Anguium senectus | 115 | Argemone | 205 |
| | | Arg | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Argentirecremētum | 449 | Atramentum librariū | 487 |
| Argentiscoria | ibidem | Atramentum sutoriū | 458 |
| Argentispuma | ibi.& 510 | Atriplex | 169 |
| Argentum viuū | 456.& 510 | Auellana nux | 103 |
| Arisarum | 198 | Auena | 156 |
| Aristolochia | 214 | Auricula muris | 209 |
| Armeniaca mala | 98 | Auripigmentum, siue ar- | |
| Armenius lapis | 454 | senicon | 463.& 510 |
| Armoracia | 167 | | |
| Aron | 197 | B | |
| Arrhenogonon | 286 | Bacca lauri | 71 |
| Artemisia | 281 | Baccharis | 240 |
| Arundo: vide Harundo | | Balaustium | 94 |
| Asarum | 13 | Ballote | 276 |
| Asclepias | 272 | Balsamum | 22 |
| Ascyron | 301 | Barbula hirci | 183 |
| Asininum iecur | 121 | Basilisci ictus notæ 533. eius | |
| Asini vngula | 120 | curatio | 543 |
| Asius lapis | 476 | Bdellium | 55 |
| Aspalathus | 24 | Beta | 171 |
| Asparagus | 173 | Betonica | 304 |
| Asplenon | 290 | Bitumen | 66.& 67 |
| Aspidis ictus notæ 533. eius | | Blata pistrinaria | 120 |
| curatio | 543 | Bliton | 168 |
| Aster Atticus | 359 | Botrys | 282 |
| Astragalus | 329 | Brassica | 169 |
| Athamanticum | 8 | Brassica marina | 171 |
| Athera | 155 | Brassica sylvestris | 170 |
| Atractylis | 272 | Britanica | 305 |
| | | Bromus | 365 |

P

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Bryon | 25 | curatio morsus eius | 52 |
| Bryonia | 394 | ab eo morsorum victu | 52 |
| Buccina | 110 | ratio | 52 |
| Buglossum | 361 | Cannabis | 29 |
| Bulbus esculentus | 199 | Cantharides | 12 |
| Bulbus vomitorius | 200 | Capnos | 35 |
| Bunion | 360 | Capparis | 20 |
| Buprestis | 125. & 499 | Capra vngula | 12 |
| Buphthalmos | 294 | Caprinum iecur | ibidem |
| Butyrum | 131 | Cardamomum | 1 |
| Butyri fuligo | ibidem | Cardamina | 17 |
| C | | Carduus | 22 |
| Acacia | 360 | Carpasi succus | 50 |
| Canchrys | 260 | Cariota | 9 |
| Cadmia | 433 | Carum | 249 |
| Cacilia ictus notæ | 531. cu- | Caseus | 130 |
| ratio eadem quæ vipera | | Casia | 16 |
| morsus. | | Castanea | 90 |
| Calamus odoratus | 21 | Castorium | 117 |
| Calamintha | 235 | Catanance | 363 |
| Calcifraga | 393 | Caucalis | 181 |
| Caltha | 327 | Cedria | 70 |
| Calx | 510 | Cedrides | 71 |
| Calx viua | 471 | Cedromela | 98 |
| Cancamum | 26 | Cedrus | 69 |
| Cancri | 113 | Celticum nardum | 12 |
| Canis rubus | 77 | Cechri ictus notæ | 532. eius |
| Canis rabidi iecur | 121 | remedia | 542 |
| Canis rabiosi signa | 524. | Centaurium magnum | 216 |
| | | Cent | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Centaureum minus | 217 | 327 | |
| Cepa | 185 | Chrysocolia | 454 |
| Cepæa | 299 | Chrysocome | 326 |
| Cera | 151 | Chrysogonon | ibidem |
| Cerasia | 56 | Cicada | 123 |
| Cerastæ ictus notæ 533. eius | | Cicer sativum | 159 |
| curatio | 542 | Cicer arietinum | ibidem |
| Cervi genitale | 120 | Cicer sylvestre | 160 |
| Cervinum cornu | 124 | Cichorion | 178 |
| Cerussa | 452. & 507 | Cici | 381 |
| Cestron | 304 | Cicuta | 343. & 503 |
| Chalcitis | 459 | Cimices | 119 |
| Chama | 111 | Cimolia | 485 |
| Chamaacte | 390 | Cinis sarmentitius | 472 |
| Chamaecissos | 361 | Cinnabaris | 455 |
| Chamaedaphne | 369 | Cinnamomum | 17 |
| Chamaedrys | 274 | Cionia | 110 |
| Chamaeleo albus | 118 | Circaea | 283 |
| Chamaeleo niger | 219 | Cirsium | 358 |
| Chamaeleuce | 361 | Cistus | 78 |
| Chamaepitys | 302 | Citria mala | 98 |
| Chamaesyce | 387 | Clematis | 307 |
| Chamaelea | 389 | Clinopodium | 273 |
| Characias tithymalus | 382 | Clymenon | 310 |
| Chelidonium | 207 | Cnicus | 328 |
| Chelidonium minus | 208 | Coagulum | 134 |
| Chia terra | 485 | Coccum gnidion | 390 |
| Chondrylla | 178 | Coccum infectorium | 324 |
| Chrysanthemon | 292. & | Cochlea | 112 |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Cæruleus | 455 | Croton | 381 |
| Colchicon | 345 | Cucurbita | 175 |
| Colligendorum ratio | 4 | Cucumis sativus | 175 |
| Colocasia | 161 | Cucumis sylvestris | 371 |
| Colocynthis | 392 | Cuminum sativum | 250 |
| Colymbades | 87 | Cuminum sylvestre | ibidem |
| Communis curatio in o- | | Cunila | 231 |
| mnes ictus virulentos | 533 | Cupressus | 68 |
| Conyza | 284 | Curmi | 154 |
| Corallium | 475 | Cyclaminus | 194 |
| Coriandrum | 251. & 502 | Cyclaminus altera | 196 |
| Coria veteramentaria | 121 | Cydonomeli | 419 |
| Coriarius frutex | 91 | Cynia | 399 |
| Coris | 302 | Cynocrambe | ibidem |
| Coronopus | 176 | Cynoglosson | 362 |
| Cornu cerui | 124 | Cynosorchis | 287 |
| Cornus | 100 | Cyparissias tithymalus | |
| Corruda | 173 | 384 | |
| Cos Naxia | 483 | Cyphi | 26 |
| Costus | 20 | Cypirus | 9 |
| Cotonea mâla | 97 | Cytinus | 94 |
| Cotyledon | 349 | Cytisus | 356 |
| Cratægogonon | 286 | | |
| Crimnon | 155 | D | |
| Crithmum seu crithamon | | D Amascena pruna | 100 |
| 176 | | Damasonion | 299 |
| Crocodilion | 220 | Daphnoides | 368 |
| Crocomagma | 27 | Daucus | 257 |
| Crocum | ibidem | Delphinium | ibidem |
| | | Dendroides | tithymalus |
| | | | 384 |

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|------------|------------------|------------|
| 384 | | Elæomell | 32 |
| Deuteria | 409 | Eleoselinum | 253 |
| Dictamnium | 233 | Elichryson | 327 |
| Dictamnium Cretenſe | 234 | Empetron | 393 |
| Diphryges | 462 | Ephemeron | 346. & 500 |
| Dipsacum | 220 | Epimedium | 313 |
| Dipsadis morſus notæ | 532. | Epimelis | 99 |
| eius curatio | 541 | Epipactis | 355 |
| Dorycnion | 339. & 501 | Epirotica mâla | 98 |
| Draba | 190 | Epithymum | 393 |
| Draco marinus | 113 | Equisetum | 323 |
| Draconis marini iſtus re- | | Equorum lichenes | 121 |
| media | 539 | Eretria terra | 483 |
| Dracunculus | 196 | Erica | 75 |
| Dryini iſtus notæ | 532. eius | Erinaceus | 109 |
| curatio | 541 | Erinei | 107 |
| Dryopteris | 397 | Erinus | 317 |
| Dulcis radix | 216 | Eruca | 181 |
| E | | Erucaolerum | 125 |
| E Benus | 80 | Eruca pinorum | 125. & |
| Ebulum | 390 | 498 | |
| Ebur | 224 | Eruum | 163 |
| Echinus | 109 | Eryngium | 225 |
| Echion | 316 | Eryſimon | 190 |
| Elaphoboſcon | 255 | Erythrodanon | 296 |
| Elaterion | 373 | Eupatorium | 321 |
| Elarine | 320 | Euphorbium | 266 |
| Electrum | 73 | F | |
| Eleiſphacos | 234 | F Aba | 160 |

F

P ;

INDEX.

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| Faba Aegyptia | 161 | G | |
| Fax | 471 | Agates lapis | 479 |
| Fagus | 90 | Galaetites lapis | 480 |
| Farina crassior | 155 | Galaxias | ibidem |
| Fel | 143 | Galbanum | 267 |
| Ferri rubigo | 445 | Galerita | 123 |
| Ferula | 261 | Galion | 356 |
| Festuca | 365 | Galiopsis | ibidem |
| Fibrini testes | 116 | Galla | 90 |
| Ficus | 105 | Gallina | 122 |
| Filicula | 397 | Gallinae cerebellum | ibid. |
| Filix | 396 | Garum | 119 |
| Filix foemina | ibidem | Genitale cerui | 120 |
| Fimum | 145 | Gentiana | 213 |
| Flos aris | 440 | Geranion | 283 |
| Flos salis | 469 | Geodes lapis | 483 |
| Flos punicae | 94 | Gingiberis | 192 |
| Flos sylvestris punici | ibid. | Gingidion | 181 |
| Foeniculum | 256 | Gith | 273 |
| Foeniculum erraticum | ibi. | Gladiolus | 313 |
| Foenum graecum | 158 | Glans | 89 |
| Fraxinus | 72 | Glans Iouis | 90 |
| Fuligo e myrrha, resina, | | Glans Sardiana | ibidem |
| styrace | 59 | Glans vnguentaria | 379 |
| Fuligo liquidae picis | 65 | Glastum sativum | 209 |
| Fuligo pictoria | 486 | Glastum sylvestre | 210 |
| Fuligo thuris | 59 | Glaucium | 270 |
| Fumaria | 355 | Glaux | 366 |
| Fungi | 345. & 508 | Gluten piscium | 270 |
| | | Glut | |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
| Glutinum | ibidem | Heliotropium magnum | |
| Glycyfide | 294 | | 399 |
| Gnaphalion | 283 | Heliotropium parvum | 400 |
| Gnidium granum | 389 | Helleborum album | 369 |
| Gobius | 118 | Helleborum nigrum | 370 |
| Gramen | 317 | Helxine | 320. & 346 |
| Gramen arundinaceum | ibi. | Hemerocallis | 285 |
| Gramen Parnasi | ibidem | Hemionitis | 291 |
| Grossi | 107 | Herba Sabina | 69 |
| Gummi amygdalæ | 102 | Hieracium magnum | 252 |
| Gummi cerasi | 96 | Hieracium parvum | ibid. |
| Gypsum | 472. & 508 | Hippace | 131 |
| H | | Hippocampus | 110 |
| H Aematites | 477 | Hippoglosson | 362 |
| H Hemorrhoi ictus no | | Hippolapathon | 168 |
| ta 532. eius curatio | 542 | Hippomarathon | 256 |
| Halica | 156 | Hippophaes | 380 |
| Halicacabon solanum | 338 | Hippophaeston | 381 |
| Halimus | 76 | Hippopotami testes | 116 |
| Harundo | 74 | Hipposelinon | 254 |
| Harundo Cypria | ibidem | Hirci barbula | 183 |
| Harundo vallatoria | ibid. | Hirculus | 12 |
| Hastula regia | 198 | Hirundines | 124 |
| Hedera | 206 | Hirudo | 512 |
| Hedysaron | 289 | Holostium | 310 |
| Helcysma | 449 | Hordeum | 153 |
| Helenium | 28 | Horminum | 288 |
| Helenium alterum | 29 | Hyacinthus | 329 |
| Helioscopius | 384 | Hydromeli | 412 |

I N D E X.

| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Hydromelon | 419 | Iuncus | 325 |
| Hydropiper | 193 | Iuncus odoratus | 21 |
| Hyoscyamus | 334. & 504 | Iuniperus | 68 |
| Hypecoon | 334 | Ius piscium | 119 |
| Hypericon | 300 | Ixia | 218 |
| Hypocistis | 78 | L | |
| Hyssopum | 230 | L Abram Veneris | 220 |
| I | | L Labrusca | 402 |
| I Aspis | 481 | Lac | 128 |
| I Iberis | 108 | Lac coagulatum | 509 |
| Ibiscum | 297 | Lac humanum | 130 |
| Ichthyocolla | 270 | Lac schiston | 129 |
| Idæa radix | 323 | Lactis serum | ibid. |
| Iecur apri | 121 | Lacerta | 127 |
| Iecur asininum | ibid. | Lactuca sativa | 180 |
| Iecur canis rabidi | ibid. | Lactuca sylvestris | ibid. |
| Iecur caprinum | ibid. | Ladanum | 79 |
| Iecur mergi | ibidem | Lagopus | 312 |
| Illecebra | 348 | Lampsana | 168 |
| Ilex | 90 | Lana | 132 |
| Indicum | 455 | Lana cremata | ibidem |
| Inguinalis | 359 | Lanaria herba | 194 |
| Intybus | 177 | Lappa | 365 |
| Iouis glans | 90 | Lapathum | 167 |
| Irio | 190 | Lasfer | 264 |
| Iris | 6 | Lasferpitium | ibidem |
| Isopyron | 359 | Lathyris | 385 |
| Iudaicus lapis | 481 | Lauer | 175 |
| Iuglandes nuce | 102 | Laurus | 71 |
| | | Laurus | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Laurus Alexandrina | 363 | Lithospermon | 295 |
| Lauri bacca | 71 | Locusta | 123 |
| Lemnia terra | 457 | Lolium | 157 |
| Lens | 162 | Lonchitis | 296 |
| Lens palustris | 347 | Lora | 409 |
| Lentiscus | 61 | Lotus arbor | 99 |
| Lentiscina resina | 64 | Lotus Aegyptia | 357 |
| Leontopetalon | 272 | Lotus sylvestris | 356 |
| Leontopodion | 363 | Lotus vrbana | ibid. |
| Lepidium | 203 | Lupinus | 164 |
| Leptocarya | 103 | Lychnis coronaria | 275 |
| Lepus marinus | 115 & 511 | Lychnis sylvestris | ibid. |
| Lepus terrestris | 115 | Lycium | 82 |
| Leucacantha | 224 | Lycopsis | 316 |
| Leucanthemon | 292 | Lygos | 86 |
| Leucas | 274 | Lyfimachia | 306 |
| Leucoion | 285 | | M |
| Lichenes equorum | 121 | M Acer | 73 |
| Lichen | 326 | M Maena | 118 |
| Lignorum marcor | 73 | Magnes | 479 |
| Ligusticum | 246 | Magudaris | 365 |
| Ligustrum | 77 | Malabathrum | 15 |
| Lilium | 275 | Malicorium | 94 |
| Lilium sylvestre | 285 | Malua | 168 |
| Limonion | 212 | Malum | 97 |
| Lingua bubula | 361 | Malum Armeniacum | 98 |
| Linozostis | 398 | Malum cotoneum | 97 |
| Linum | 159 | Malum dulce | 98 |
| Lithocolla | 482 | Malum Epiroticum | ibid. |

P 5

INDEX.

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| Malum Medicum | ibid. | Memphites | 481 |
| Malum orbiculatum | ibid. | Mentha | 235 |
| Malum Persicum | ibid. | Menthastrum | ibidem |
| Malum præcox | ibid. | Meon | 8 |
| Malum punicum | 93 | Mercurialis | 398 |
| Malum sylvestre | ibid. | Mergi iecur | 121 |
| Mandragoras | 339. & 504 | Mespilus | 99 |
| Manna thuris | 58 | Metopion vnguentū | 49 |
| Martor lignorum | 73 | Milium | 156 |
| Maron | 239 | Millefolium | 357 |
| Marrubium | 277 | Millepedæ | 120 |
| Marrubium nigrum | 276 | Misy | 460 |
| Mastiche | 61 | Mituli | 111 |
| Meconium | 504 | Moly | 243 |
| Medica | 184 | Molybdæna | 443 |
| Medica mala | 98 | Molybdoides lapis | 448 |
| Medion | 313 | Morochthus | 480 |
| Medulla | 142 | Morus | 103 |
| Mel | 149 | Mullus | 116 |
| Mel heraclion | 502 | Mulsum | 411 |
| Melampsythium | 462 | Muralis herba | 346 |
| Melanteria | 460 | Muria | 469 |
| Melanthium | 263 | Mures | 128 |
| Melia terra | 486 | Muris auricula | 209 |
| Melilotos | 239 | Mus araneus | 127 |
| Melimela | 98 | Muris aranci ictus notæ | |
| Melissophyllon | 276 | 531. eius curatio | 539 |
| Melites lapis | 480 | Muscus | 25 |
| Melomeli | 419 | Muscus marinus | 351 |
| | | Must | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------|-----|------------------------|------------|
| Mustela | 117 | Nymphæa | 289 |
| Myagron | 358 | O | |
| Myosotis | 209 | O Chra | 455 |
| Myrica | 75 | O Ocymastrum | 316 |
| Myrrha | 52 | Ocymum | 182 |
| Myrrha Bæotica | 54 | Oenanthe | 284. & 403 |
| Myrrhis | 357 | Oesypum | 133 |
| Myrtidanum | 96 | Olea sylvestris | 86 |
| Myrtus sativa | 95 | Oleaster | ibidem |
| Myrtus sylvestris | 367 | Olee ethiopice lacryma | 88 |
| N | | Olei vires | 29 |
| N Aphtha | 67 | Oleum amygdalinum | 33 |
| Napus | 166 | Oleum balaninum | 34 |
| Narcaphthon | 25 | Oleum cicinum | 32 |
| Narcissus | 379 | Oleum cnicinum | 34 |
| Nardi genera | 10 | Oleum è gnidio grano | ibid. |
| Nardum Celticum | 12 | Oleum hyoscyaminum | 34 |
| Nardum montanum | 13 | Oleum laurinum | 35 |
| Nardinum vnguentum | 51 | Oleum lentiscinum | 36 |
| Nasturtium | 189 | Oleum mastichinum | ibid. |
| Natricis ictus notæ | 532 | Oleum melanthinum | 34 |
| eius curatio | 542 | Oleum melinum | 98 |
| Nepeta | 235 | Oleum myrteum | 35 |
| Nerion | 344 | Oleum oliuæ sylvestris | 30 |
| Nitrum | 469 | & 88 | |
| Nitrispuma | 470 | Oleum omphacinum | 29 |
| Nux auellana | 103 | Oleum picinum | 63 |
| Nux iuglans | 102 | Oleum raphaninum | 34 |
| Nux pinea | 60 | Oleum Sicyoninum | 31 |
| | | Oleum | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-------|
| Oleum sinapium | 34 | Othonna | 208 |
| Oleum styracium | 55 | Ouorum natura | 122 |
| Oleum terebinthinum | 36 | Oui candidum | ibid. |
| Oliuæ colymbades | 87 | Oxalme | 415 |
| Oloschoenos | 325 | Oxylapathum | 167 |
| Olusatrum | 254 | Oxymyrsine | 367 |
| Omphacium | 404 | P | |
| Omphacomelites | 419 | Pæderota | 223 |
| Onagra | 358 | Pæonia | 294 |
| Onitis | 231 | Paliurus | 76 |
| Onobrychis | 300 | Palma | 92 |
| Ononis | 223 | Palma elate | 93 |
| Onosma | 289 | Palma Thebaicæ | 92 |
| Onyx | 111 & 480 | Panaces Asclepii | 245 |
| Ophioscorodon | 187 | Panaces Chironium | ibid. |
| Ophites lapis | 482 | Panaces Heracleum | 243 |
| Opium | 331 | Pancration | 201 |
| Opobalsamum | 22 | Panicum | 156 |
| Opopanax | 243 | Papauer corniculatum | |
| Orbiculata mâla | 98 | 333 & 505 | |
| Oreoselinon | 253 | Papauer erraticum | 330 |
| Origanum | 231 | Papauer satium | ibid. |
| Origanum sylvestre | ibid. | Papauer spumeum | 334 |
| Ornithogalum | 183 | Pappi | 512 |
| Orobanche | 182 | Papyrus | 74 |
| Oryza | 156 | Paralios | 384 |
| Osisifragus | 123 | Pardalianches | 342 |
| Ostracites | 483 | Paronychia | 326 |
| Osyris | 366 | Parthenium | 293 |
| | | Pas | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Passum | 406 | Phycus marinus | 352 |
| Pastinaca herba | 247 | Phyllitis | 278 |
| Pastinaca marina | 115 | Phyllon | 286 |
| Pastinacæ marinæ ictus | | Phyteuma | 362 |
| notæ 531. eius curatio | | Picea | 59 |
| 339 | | Picis liquidæ fuligo | 65 |
| Pedicularia | 375 | Pinæ nuces | 60 |
| Pelecinon | 289 | Pinorum erucæ 125 & | 498 |
| Peplis | 386 | Pinus | 59 |
| Peplos | ibid. | Piper | 191 |
| Pepo | 179 | Piscium ius | 119 |
| Periclymenon | 311 | Pissasphaltos | 67 |
| Peristereon | 328 | Pisselæon | 65 |
| Persea | 108 | Pistacia | 102 |
| Persica mâla | 98 | Pityusa | 385 |
| Personata | 355 | Pix liquida | 64 |
| Petasites | ibid. | Pix sicca | 66 |
| Petroselinum | 253 | Plantago | 173 |
| Peucedanon | 261 | Platanus | 72 |
| Phalangium | 278 | Plumbago | 448 |
| Phalâgii morsus notæ 530. | | Plumbum elotum | 446 |
| eius curatio | 538 | Plumbum vstum | ibid. |
| Phalaris | 295 | Plumbi recrementū | 447 |
| Pharicon | 506 | Pnigitis terra | 485 |
| Phasiolus | 163 | Polemonia | 308 |
| Phœnicobalanus | 92 | Polion | 279 |
| Phœnix | 322 | Polycnemon | 273 |
| Phrygius lapis | 476 | Polygala | 366 |
| Phu | 14 | Polygonaton | 307 |
| | | Polyg | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| Polygonon | 306 | Pyrates | 477 |
| Polypodion | 397 | Pyrorum genera | 99 |
| Pompholyx | 435 | Q | |
| Populus alba | 72 | | |
| Populus nigra | ibidem | Q Vercus | 89 |
| Porrum capitatum | 184 | Q Quinquefolium | 321 |
| Portulaca | 172 | R | |
| Potamogeton | 352 | R Adicula | 194 |
| Poterion | 222 | R Radix | 166 |
| Propolis | 152 | Radix dulcis | 216 |
| Prunus, pruna | 100 | Radix sylvestris | 167 |
| Pseudobunion | 360 | Rana | 117 |
| Pseudocasia | 16 | Rana palustris | 511 |
| Pseudocinnamomum | 19 | Ranunculum | 203 |
| Pseudodictamnium | 234 | Rapum | 165 |
| Psoricon | 459 | Recondendorum ratio | 5 |
| Psychotrophon | 304 | Recrementum argēti | 449 |
| Psyllion | 336. & 502 | Resina variæ | 63 |
| Ptarmica | 193 | Resina lentiscina | 64 |
| Pulegium | 232 | Resina liquida è pinu & pi | |
| Pulegium sylvestre | 233 | cea | 63 |
| Pulicaria | 336 | Rha | 213 |
| Pulicula | 155 | Rhamnus | 78 |
| Pulmones animalium | 120 | Rhaphanus | 166 |
| Pumex | 466 | Rhaphanus sylvestris | 167 |
| Purpura | 110 | Rhaponticum | 213 |
| Pygnoconon | 351 | Rheon | ibid. |
| Pyrafter | 99 | Rhodia radix | 323 |
| Pyrethrum | 258 | Rhododendron | 344 |
| | | Rhus | 91 |
| | | Ric | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| Ricinus | 381 | Salix | 86 |
| Rosa | 81 | Salvia | 234 |
| Rosei pastilli | ibidem | Sambucus | 390 |
| Rosmarinus | 258 | Samia terra | 484 |
| Rosmarinum coronarium | | Samius lapis | ibid. |
| 260 | | Sampsuchum | 238 |
| Rubeta | 511 | Sandaracha | 463. & 510 |
| Rubia | 296 | Sandyx | 453 |
| Rubigo ferri | 445 | Sanguinaria | 306 |
| Rubrica fabrilis | 457 | Sanguinaria foemina | 307 |
| Rubrica Sinopica | ibid. | Sanguis | 144 |
| Rubus | 319 | Sanguis tauri | 509 |
| Rubus canis | 77 | Sapa | 406 |
| Rubus Idæus | 320 | Sapphirus | 481 |
| Rutmex | 167 | Sarcocolla | 269 |
| Ruscum | 367 | Sardiana glandes | 90 |
| Ruta | 240 | Sardonia | 503 |
| Ruta sylvestris | 242 | Sarmentitius cinis | 472 |
| S | | Satureia | 237 |
| Abina herba | 69 | Satyrion | 288 |
| Saccharum | 150 | Satyrion erythroniō | ibid. |
| Sacra herba | 328 | Scammonia | 387 |
| Sagapenum | 266 | Scandix | 181 |
| Sal | 467 | Schistum lac | 129 |
| Salis flos | 469 | Schistos lapis | 479 |
| Salis spuma | 468 | Scilla | 200 |
| Salamandra | 126. & 499 | Scincus | 127 |
| Saluaris | 258 | Scolopendra | 114 |
| Salunca | 12 | Scolopendræ ictus notæ | 530 |

INDEX.

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------|
| 536.eius curatio | 538 | Seseli Creticum | ibid. |
| Scolymos | 222 | Seseli Peloponnense | ibid. |
| Scordion | 280 | Setanium | 99 |
| Scorodoprasum | 188 | Sicyonium oleum | 31 |
| Scoria plumbi | 447 | Sideritis | 318 |
| Scorpioides | 400 | Sidion | 94 |
| Scorpius marinus | 113 | Siligo | 155 |
| Scorpius terrestris | ibid. | Siliquæ | 97 |
| Scorpii ictus notæ | 530.eius | Silphium | 264 |
| curatio | 538 | Silurus | 118 |
| Securidaca | 289 | Silybum | 379 |
| Sedum magnum | 347 | Sinapi | 188 |
| Selenites lapis | 481 | Sion | 175 |
| Selinusia terra | 485 | Siser | 167 |
| Semen | 155 | Sison | 248 |
| Semperuium | 347 | Sisymbrium utrunque | 175 |
| Semperuium minus | 348 | Sitania | 153 |
| Senecta anguium | 115 | Smarides pisces | 118 |
| Senecio | 351 | Smilax 183.& 343.& 503 | |
| Sepia | 115 | Smilax aspera | 366 |
| Seps | 127 | Smilax lævis | 367 |
| Seris | 177 | Smyris lapis | 483 |
| Serpyllum | 237 | Smyrnion | 254 |
| Sertula campana | 239 | Solanum hortense | 336 |
| Serum lactis | 129 | Solanum manicum | 338 |
| Sesama | 157 | Solanum somniferū | ibid. |
| Sesamoides | 372 | Sonchus | 177 |
| Seseli | 247 | Sorba | 100 |
| Seseli Aethiopicum | 248 | Sory | 461 |
| | | Spar | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------|------------|
| arganion | 314 | Struthia cotonea | 98 |
| partion | 378 | Struthion | 194 |
| statha | 93 | Styrax | 54 |
| rhondylion | 260 | Succinum | 73 |
| thragis ægos | 458 | Suilus pulmo | 120 |
| ina acuta | 77 | Suillus talus | 124 |
| ina alba | 221 | Sulphur | 465 |
| ina Arabica | ibid. | Sycomorus | 104 |
| longia | 474 | Symphyton | 309 |
| longiarum lapides | 482 | | |
| stuma nitri | 470 | T | |
| stuma salis | 468 | Alus suis | 124 |
| stuma argenti | 449. & | Tamarix | 75 |
| 510 | | Taxus | 343. & 503 |
| uamma æris | 441 | Tauri sanguis | 509 |
| uamma exacie decussa | | Telephion | 210 |
| 442 | | Tellinæ | 111 |
| thachys | 277 | Terebinthus | 62 |
| thacte | 50 | Terebinthina | ibidem |
| thaphis agria | 375 | Terra | 483 |
| thercus ferri | 445 | Terra fornacum | 486 |
| thibium | 448 | Testæ | 485 |
| thimmi | ibidem | Testiculus canis | 287 |
| thebe | 310 | Teucrion, Teucris | 274 |
| thexas | 230 | Thalassomeli | 413 |
| thomoma | 442 | Thalictron | 351 |
| thoratiotes | 352 | Thapsia | 376 |
| thoratiotes millefoliū | ibid. | Thelygonon | 286 |
| thomigmenta balnearum | 31 | Thlaspi | 189 |
| | | Thracias lapis | 479 |

Q

INDEX.

| | | | |
|----------------|------------|--------------------------|-----|
| Thunus | 119 | V | |
| Thus | 56 | Venerata | 5 |
| Thuris cortex | 58 | Veneris umbilicu | |
| Thuris fuligo | 59 | 349 | |
| Thuris manna | 58 | Veratrum album | 36 |
| Thyites lapis | 480 | Veratrum nigrum | 37 |
| Thymelæa | 389 | Verbascum | 3 |
| Thymoxalme | 415 | Verbenaca | 3 |
| Thymus | 236 | Vermes terreni | 12 |
| Tilia | 78 | Vesparū ictus curatio | 52 |
| Tithymali | 382 | Vesicaria | 33 |
| Tordylion | 248 | Vetonica | 30 |
| Torpedo piscis | 114 | Victus ratio in morsu ra | |
| Toxicon | 506 | biofi canis | 52 |
| Tragacantha | 224 | Vimen | 8 |
| Tragium | 324 | Vina marina | 41 |
| Tragoriganum | 232 | Vina picata | 42 |
| Tragos | 155. & 325 | Vina resinata | 4 |
| Tribulus | 311 | Vini natura | 40 |
| Trichomanes | 365 | Vinum abiegnum | 42 |
| Trifolium | 278 | Vinum abrotonites | 42 |
| Trimestria | 152 | Vinum absynthites | 228 |
| Triphyllon | 278 | 425 | |
| Tripolion | 363 | Vinum acorites | 43 |
| Trissago | 274 | Vinum adynamon | 41 |
| Triticum | 152 | Vinum anethinum | 43 |
| Tuber | 183 | Vinum apiites | 41 |
| Tussilago | 281 | Vinum aromatites | 42 |
| Typha | 283 | Vinum asarites | 43 |
| | | Vin | |

INDEX.

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------|-------|
| Vinum bunites | 427 | Vinum myrsinites | 428 |
| Vinum calaminthites | 428 | Vinum myrtites | 420 |
| Vinum catorchites | 422 | Vinum à nardo sylvestri | 430 |
| Vinum cedrinum | 423 | Vinum nectarites | 429 |
| Vinum cedrites | 424 | Vinum cenanthinum | 419 |
| Vinum cestrites | 427 | Vinum omphacites | 409 |
| Vinum chamædryites | 426 | Vinum palmeum | 421 |
| Vinum è chamælea | 431 | Vinum organites | 428 |
| Vinum chamæpityinū ibi. | | Vinum panacites | 430 |
| Vinum è coniza | 428 | Vinum phthorion | 431 |
| Vinum cupressinum | 423 | Vinum è petroselino | ibi. |
| Vinum cydonites | 418 | Vinum picatum | 424 |
| Vinum daucites | 430 | Vinum pineum | 423 |
| Vinum dictamnites | 427 | Vinum è pipere | 429 |
| Vinum è flore salis | 431 | Vinum è pulegio | 428 |
| Vinum belleborites | 432 | Vinum resinatum | 423 |
| Vinum hyssopites | 426 | Vinum rhodites | 420 |
| Vinum ex iride | 429 | Vinum rhætes | ibid. |
| Vinum iuniperinum | 423 | Vinum saluiatum | 430 |
| Vinum laurinum ibidem | | Vinum è satireia | 428 |
| Vinum lentiscinum | 421 | Vinum scammonites | 433 |
| Vinum mandragorites | 432 | Vinum scillinum | 417 |
| Vinum marathrites | 431 | Vinum selinites | 431 |
| Vinum è marrubio | 427 | Vinum stæchadites | 426 |
| Vinum melites | 418 | Vinum strobilites | 423 |
| Vinum melitites | 410 | Vinum è sycomoris | 422 |
| Vinum melomeli | 429 | Vinū è Syriaca nardo, cel | |
| Vinum è myrrha | 429 | tica, malabathro | 429 |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------|--------|
| Vinum terebinthinum | 421 | Vng. hedychoon | 49 |
| Vinum thymites | 428 | Vng. iasminum | 51 |
| Vinum è thymelæa | 431 | Vng. irinum | 46 |
| Vinū tragoriganites | 427 | Vng. lilinum | 4 |
| Viola alba | 285 | Vng. malabathrinum | 51 |
| Viola purpurea | 359 | Vng. megalinum | 49 |
| Viperæ ictus notæ 331. eius | | Vng. melinum | 32 |
| curatio | 540 | Vng. mendesium | 50 |
| Viperinæ carnes | 114 | Vng. metopion | 49 |
| Viscum | 270 | Vng. narcissinum | 44 |
| Vitis alba | 394 | Vng. nardinum | 5 |
| Vitis nigra | 395 | Vng. ocyminum | 4 |
| Vitis sylvestris | 397 | Vng. œnanthinum | 33 |
| Vitis vinifera | 401 | Vng. onychinum | 4 |
| Vitex | 85 | Vng. rosaceum | 33 |
| Vlmus | 73 | Vng. sampsuchinum | 40 |
| Vmbilicus Veneris | 349 | Vng. styracinum | 4 |
| Vnedo | 101 | Vng. susinum | 4 |
| Vnguentorum ratio | 36 | Vng. telinum | 40 |
| Vng. abrotoninum | 41 | Vngula asini | 120 |
| Vng. amaracinum | 48 | Vngula capræ | ibidem |
| Vng. anethinum | 42 | Vnguis odoratus | 11 |
| Vng. butyrium | 45 | Vrina | 14 |
| Vng. cinnamominum | 50 | Vrtica | 345 |
| Vng. crocinum | 44 | Vstio contra venenato | |
| Vnguentum cyprinum | 45 | ictus | 526 |
| Vng. elatinum | 38 | Vua | 401 |
| Vng. gleucinum | 48 | Vua passa | 401 |
| | | Vulpinus pulmo | 120 |
| | | | Xa |

INDEX.

| | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-------------------|
| X | | Xyris | Z | 314 |
| X | Anthion | 365 | | |
| X | Xyphion | 313 | Z | Ea, seu semen 155 |
| | Kylobalsamon | 23 | Z | Zopiffa 66 |
| | Kylocinnamomum | 18 | Z | Zythum, 154 |

FINIS.

INDEX NOMENCLATIO

num, quibus officinae Seplasiariorū, & Herbarij
nostr i temporis utuntur.

A

| | | | | |
|----------|--------------|-----|--------------------|-----|
| A | Cacia | 83 | Berberis | 77 |
| | Agnus castus | 85 | Berula | 175 |
| | agrimonia | 321 | Bismalua | 297 |
| | alcanna | 77 | Borago | 361 |
| | alkekengi | 337 | Branca vrsina | 223 |
| | coloe | 25 | Bruscus | 367 |
| | apium | 253 | Bryonia | 394 |
| | apium risus | 283 | Buglossa | 358 |
| | aphroditos | 198 | | |
| | arabis | 190 | C | |
| | artichault | 222 | C Alamentum | 235 |
| | aspergula | 271 | C Camomilla | 292 |
| | | | Capillus Veneris | 364 |
| | | | Caprifolium | 311 |
| | | | Cartamus | 398 |
| | | | Cataputia maior | 381 |
| | | | Cataputia minor | 385 |
| | | | Cauda equina | 323 |

B

| | | | | |
|----------|----------|-----|--|--|
| B | Alfamita | 175 | | |
| | Bardana | 355 | | |
| | asilicon | 182 | | |

Q 3

I N D E X.

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-----|
| Centinodia | 306 | Hermodactylus | 341 |
| Cerefolium | 181 | I | |
| Ceterach | 290 | I Arus | 192 |
| Cheiri | 285 | I Iringus | 221 |
| Coloquintida | 392 | Iua arthritica | 301 |
| Consolida maior | 309 | Iusquiamus | 334 |
| Cornu cerui | 176 | L | |
| Crassula maior | 210 | L Acca | 26 |
| Cucumer asininus | 372 | L Lapatium | 167 |
| D | D | Lappa maior | 355 |
| Ragaganthum | 224 | Lappa minor | 365 |
| E | E | Laureola | 368 |
| Nula campana | 28 | Lenticula aquæ | 347 |
| Eupatoriū vulgatum | 298 | Lilium conuallium | 346 |
| F | F | Linaria | 366 |
| Aba inuersa | 210 | Lingua hircina | 316 |
| Filipendula | 284 | Liquiritia | 216 |
| Flammula | 308 | M | |
| Fumus terræ | 355 | M Aluauiscus | 297 |
| G | G | M Malum granatū | 91 |
| Allitrichum | 288 | Mastix | 61 |
| Genista | 378 | Matricaria | 291 |
| H | H | Matrisylua | 311 |
| Edera terrestris | 361 | Melissa | 276 |
| Hepatica | 326 | Mezereon | 389 |
| Herba Iudaica | 318 | Milium solis | 295 |
| Herba Simeonis | 298 | Millefolium | 352 |
| Herba tetrahil | 318 | Morsus gallinæ | 347 |
| | | N | |

INDEX.

N

N Asturtium aquati -
cum 175
Nenuphar 289

O

O Robus 163

P

P Apauer cornutum 333

Papauer rubrum 330

Parietaria 346

Perforata 300

Perficaria 286

Pes columbinus 283

Petroselinum 153

Piperitis 203

Plantago aquatica 299

Polytrichon 365

Prasinum foetidum 276

Pulicaria 284

R

R Esta bouis 223

Reuponticum 216

Rostrum porcinum 177

Rubia tinctorum 296

S

S Aponaria 199

Satyrion 287

Scariola 177

Scrofularia minor 208

Sicla 172

Sigillum Salomonis 307

Siler montanum 247

Solatrum 336

Sparagus 173

Spelta 155

Squilla 200

Squinantum 21

Stichas Arabica 230

Stœchas citrina 327

Sumach 91

T

T Amariscus 75

Tapfus barbatus 353

Terpentina 61

V

V Ermicularis 348

Vicia syluestris 184

Vincamperuinca 307

Virga pastoris 220

Vngula caballina. 281

FINIS.

Q 4

CVRATIONVM

MORBORVM IN

DIOSCORIDE

contentarum
Index.

ABSCESSVM

remedia.

Mel
Cucurbita
Thlaspi
Viscum
Bechion siue Tussilago
Pentaphyllon
Buglosson

ABORTVM

facientia.

Asparagus
Ampeloleuce
Hedysaron
Populus alba
Oxyacanthos
Coagulum
Brassica sativa
Cyclaminos
Dracunculus duplex
Onosma
Scammonium
Thelypteris
Vinum phthorion, siue
abortium
Vinum helleborites
Coniza.

ABORTVS

remedia.

Sabina Galbanum

ACONITO

contraria.

Balsamum
Morus
Lac schiston
Coagulum
Chamapitys
Vinum in comuni
Scoria, siue recremen-
tum ferri.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

ACVLEOS ex-

trahentia.

Vide, spicula corpori
infixa extrahentia.

ACVLEATORVM

ictus remedia.

Laurus
Malua
Sisymbrium
Anisum
Althaa
Oxalme
Vinum thymite

INDEX

Adipum medela
Diosc. lib. 2. cap. 68.

ADVRENTES
medicinae.

Buprestis
Cantharides
Pityocampæ
Salamandra.

ADVSTIONVM
remedia.

Vide, Ambustorum re-
media.

ÆGYLOPIAE
remedia.

Afarum Myrtus
Iuglans Oryza
Malua Plantago
Myosota, vel myosotis
altera

Baccharis Anthemis
Strychnon fatiū siue
Solanum hortense

Aegilops
Vua ænanthe Alica.

ALARVM virus
extinguentia.

Myrrha Myrtus
Scolymos, siue Car-
duus Alumen.

ALGORIS RE-
media

Laurinum oleum
Ocyminum vnguētum
Cinnamomum
Aristolochia terra
Abrotonum

Vinum scilliticum
Elcomel, vel Eleomel.

ALLII acrimoniā
extinguentia.

Ruta.

ALOPECIAE mor-
bi remedia.

Harundo Iuglans

Auellana

Erinaceus terrestris

Hippocampus

Rana Locusta

Adeps Finum

Rhaphanus Beta

Cepe Milium

Sinapi Cyclaminus

Asphodelus

Batrachion

Myosotis

Nymphaea

Cynoglosson

Adianton Thapsia

Acrugo ferri

Sandaracha

Halcyonium Cotes

Cinis vngularum capri-
narum

ALVVM con-
turbantia.

Eruum Orobus

Brassica fatiua

Allium Capparis

Peplus Vua recentes

Vinum dulce

Aqua maris Flos salis.

ALVVM soluentia
atque

CVRATIVVS.

atque purgantia.

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Afarum | Crocus | Brassica marina | Elitum |
| Crocomagma | | Malua | |
| Oleum amygdalinum | | Asparagos | |
| Oleum cicinum | | Porrum | Cepe |
| Oleum balaninum | | Struthion | Zinziber |
| Oleum cnidium | | Cyclaminos | Scilla |
| Olca Aethiopica | | Bulbus esculentus | |
| Fagus | Galla | Agaricum | Aloë |
| Faba Thebaica | | Absynthium | Scirphium |
| Siliquæ | | Hyslopum | |
| Mespilus | Cornus | Ammoniacum | |
| Ficus Aegyptia | | Phyllitis | Cestron |
| Caprificus | | Scordion | |
| Cerasia | Melimela | Chamaepitys | |
| Citrea mala | Pruna | Androsamon | |
| Amygdalæ amara | | Papauer ceratitis | |
| Morus | Ficus | Vrtica | Cynoglosson |
| Tellinæ | Chama | Spartum | |
| Iuncus odoratus | | Balanus myrepica, si- | |
| Cochleæ terrestres | | ue glans vnguentaria | |
| Sepiæ | Silurus | Hippophaes | |
| Pisces saxatiles | | Characias | Linozostis |
| Lac | Lac schistum | Lathyris | Quercus |
| Butyrum | Medulla | Chamaesyce | Cici |
| Fel | Fimum | Scammonium | |
| Tragus | Linum | Ampeloleuce | |
| Lens | Phaselus | Thelypteris | Passum |
| Rhaphanus | | Meliceratum | |
| Lapathum | | Vinum Albanum | |
| Nasturtium | | Vinum Lesbium | |
| Eruum | Eruca | Coccimela | |
| Scandix | Lactuca | Vinum melitite | |
| Cucumis | | Thalassonieli | |
| Cucurbita | Atriplex | Vinum absynthite | |
| Brassica sativa | | Vinum helleborite | |
| | | Vinum scammonite | |
| | | Rub | |

INDEX

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|---------|
| Rubrica sinopis. | | Aloe | Hæma |
| ALVVM fistentia. | | Ruta | Anisum |
| Aspalathus | | Orchis serapias | |
| Mastichinum | | Pæonia | Althæa |
| Laurinum | | Polygonon mas | |
| Populus nigra | | Lagopus | |
| Populus picca | | Clematis daphnoides | |
| Paliurus | | Xyris | Anchusa |
| Oxyacantha | | Gramen Parnasium | |
| Cynosbaros | | Rubus Pentaphyllon | |
| Cistos | Rosa | Phoenix herba | |
| Acacia | Palma | Idea radix | |
| Palma clate | | Oxyfcheenus | |
| Malum punieum | | Rubrica sinopis | |
| Malus | Siliquæ | Aizoon | |
| Cotonæ | | Papauer satium | |
| Mala epirotica | | Adianton | |
| Pyra | Mespilus | Phlomidès | Vuæ |
| Lotus | Cornus | Vinum phalernum | |
| Sorbus | Pruna syriaca | Vinum œnanthe | |
| Lepus terrestris | | Vinum passum | |
| Lac | Cascus | Vinum rhoite | |
| Fuligo butyri | | Vinum myrtite | |
| Sanguis | Fimum | Vinum cedri | |
| Lyncurion | Triticum | Vinum lauri | |
| Brassica fatiua | | ALVINIS vtilla. | |
| Hordeum | Plantago | Coagulum | |
| Criannon | Seris | Nymphæa | |
| Bromos | Chondryllæ | Clymenon | |
| Oryza | Alica | Papauer satium | |
| Milium | Faba | Omphacomeli | |
| Lens | Anethum | AMATORIIS ve- | |
| Apium | Aphacc | neficiis attributa. | |
| Smyrnion | | Cyclaminos | |
| Hippomarathrum | | Catanance | |
| Acantha | | Dorycnion | |

Cot

CURATIVVS.

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Cotyledon | | 64. | |
| Mandragoras | | ANGINAE re- | |
| Leontopodion | | media. | |
| Phyteuma | | Acetum Absynthium | |
| AMBVSTORVM | | Cyprinum vnguentum | |
| remedia. | | Cedria | Cepe |
| Acacia | | Crocodilium | |
| Asphodelos | | Elaterium | |
| Aristolochia | | Fel animalium | |
| Althæa | Ascyron | Fimum | Hirundo |
| Aizoon maius | | Hyssopus | Irinum |
| Arction | Alumen | Laserpitium | |
| Atramentū scriptoriū | | Mel | Oxymel |
| Buccinum | Beta | Spartum siue genista | |
| Cyros | Cistos | Sal | Viola |
| Coriū vstum, siue vete- | | Piper | Pix |
| rum calceamentorum | | Rhaphanus | |
| Cynoglossum | | ANHELITVS dif- | |
| Cinnabaris | | ficulatis re- | |
| Ebulus | Fimum | media. | |
| Phlomis, siue verbasco | | Asarum | Balsamum |
| Gallion | Hedera | Naphtha | |
| Hypericon | Helxine | Centaurium maius | |
| Lactuca sylvestris | | Baccharis | Peucedanū |
| Lilium | Myrtus | Galbanum | |
| Morus | Malua | Parthenion | |
| Narcissus | | Adianton | |
| Oliuæ colymbades | | Ampeloleuce | |
| Ouum | Picea | Et infra in verbo Or- | |
| Platanus | Plantago | thopnoicis. | |
| Sesamum | Stinmi | ANIMALIVM feri- | |
| Sal | Thus | tas mitigatur. | |
| Vnguentum felinum. | | Ocnagra | |
| AMPHISBAENAE | | ANI remedia. | |
| morsus curatio. | | Vide, Sedis remedia. | |
| Dioscorides lib. 6. cap. | | ANIMALIA ven- | |
| | | eris | |

INDEX

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|---------|
| Rubrica sinopis. | | Aloe | Hæma |
| ALVVM sistentia. | | Ruta | Anisum |
| Aspalathus | | Orchis serapias | |
| Maltichinum | | Paonia | Althæa |
| Laurinum | | Polygonon mas | |
| Populus nigra | | Lagopus | |
| Populus picea | | Clematis daphnoides | |
| Paliurus | | Xyris | Anchusa |
| Oxyacantha | | Gramen Parnasium | |
| Cynosbatos | | Rubus Pentaphyllon | |
| Cistos | Rosa | Phœnix herba | |
| Acacia | Palma | Idæa radix | |
| Palma clate | | Oxyschœnus | |
| Malum punicum | | Rubrica sinopis | |
| Malus | Siliquæ | Aizoon | |
| Cotoneæ | | Papauer sativum | |
| Mala epirotica | | Adianton | |
| Pyra | Mespilus | Phlomidès | Vuæ |
| Lotus | Cornus | Vinum phalernum | |
| Sorbus | Pruna syriaca | Vinum œnanthe | |
| Lepus terrestris | | Vinum passum | |
| Lac | Cascus | Vinum rhoite | |
| Fuligo butyri | | Vinum myrtite | |
| Sanguis | Fimum | Vinum cedri | |
| Lyncurion | Triticum | Vinum lauri | |
| Brassica sativa | | ALVINIS vtilia. | |
| Hordeum | Plantago | Coagulum | |
| Criannon | Seris | Nymphaea | |
| Bromos | Chondryllæ | Clymenon | |
| Oryza | Alica | Papauer sativum | |
| Milium | Faba | Omphacomeli | |
| Lens | Anethum | AMATORIIS ve- | |
| Apium | Aphacc | nesiclis attributa. | |
| Smyrnion | | Cyclaminos | |
| Hippomarathrum | | Catanance | |
| Acantha | | Dorycnion | |

Cot

CVRATIVVS.

Cotyledon

Mandragoras

Leontopodion

Phyteuma

AMBVSTORVM
remedia.

Acacia

Asphodelos

Aristolochia

Althæa

Ascyron

Aizoon maius

Arction

Alumen

Atramentū scriptoriū

Buccinum

Beta

Cyros

Cistos

Coriū vsum, siue vete-

rum calceamentorum

Cynoglossum

Cinnabaris

Ebulus

Fimum

Phlomis, siue verbasco

Gallion

Hedera

Hypericon

Helxine

Lactuca sylvestris

Lilium

Myrtus

Morus

Malua

Narcissus

Oliuæ colymbades

Ouum

Picea

Platanus

Plantago

Sesamum

Stimmi

Sal

Thus

Vnguentum felinum.

AMPHISBAENAE

morsus curatio.

Dioscorides lib. 6. cap.

64.

ANGINAE re-
media.

Acetum Absynthium

Cyprinum vnguentum

Cedria

Cepe

Crocodilium

Elaterium

Fel animalium

Fimum

Hirundo

Hyssopus

Irinum

Laserpitium

Mel

Oxymel

Spartum siue genista

Sal

Violæ

Piper

Pix

Rhaphanus

ANHELITVS dif-
ficultatis re-
media.

Asarum

Balsamum

Naphtha

Centaurium maius

Baccharis

Peucedanū

Galbanum

Parthenion

Adianton

Ampeloleuce

Et infra in verbo Or-

thopnoicis.

ANIMALIVM feri-

tas mitigatur.

Ocnagra

ANI remedia.

Vide, Sedis remedia.

ANIMALIA ven-

tris

INDEX

tris expellentia.
Vide, Tineas latas pel-
lentia.

ANIMALIA quæ
perimunt.

Diosco. lib. 6. in præfa-
tionis fine.

ANIMALIVM ictus
remedia.

Bdellium

Panaces heracleon

Terra lemnia

Diosco. lib. 6. cap. 55.

ANIMI defectus
remedia.

Cucumis Pulegium

Coris

ANIMI volupta-
tes auget

Buglosson.

ANIMI deliquia
generantia.

Diosco. lib. 6. in præfat.

ANODYNA.

Hyoscyamus

Aconitū pardaliāches.

ANTIDOTVM in-
gredientia.

Acorus

Phu

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cyphi

Scincus, siue scingus

Sanguis Rapæ satiuæ

Napum, siue bunias

Brassica sativa

Piper

Stichas

Caros

Petroselinon

Hedysaron

Mandragoras

Rubrica, siue terra le-
mnia.

APVM ictus
remedia.

Laurus

Malua

Sisymbrium

Althæa

Diosco. lib. 6. cap. 57.

APOSTEMATVM
remedia.

Vide, Suppurationum
remedia.

APPETITVM
generantia.

Cerasia.

APPETITVM
incitantia.

Vinum in comuni

Vinum Selenite.

AQVAE inter cu-
tem remedia.

Vide Hydopicorum.

ARANEIS con-
traria.

Morus

Grossi

Melanthion.

ARANEI ictus
remedia.

Mullus piscis

Al

CVRATIVVS.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Allium | Bulbus esculentus |
| Melissophyllon | Centaurium minus |
| Coris Oxyſchœnus | Cinis vitium |
| Hyacinthus | Helleborus niger |
| Aizoon maius. | Scammonium |
| ARGENTI viui | Mandragoras |
| curatio. | Meon |
| Dioſc. lib. 6. cap. 28. | Nardus |
| ARGEMATVM | Ouum |
| morbi remedia. | Palma elate |
| Fel animalium | Pentaphyllon |
| Vrina | Pſyllium |
| Lactuca ſylueſtris | Ruta |
| Cera Argemone | Thapſia |
| Anagallis Ocyminum | Thymoxalme |
| Papauer ceratitis | Vua paſſa |
| Lotus ſatiua. | Vinum melitite. |
| ARQVATORVM | ARTERIAE re- |
| remedia. | media. |
| Onos ſiue millepeda | Irinum |
| Asparagus | Myrrha |
| Cyclaminos | Caryotæ, ſiue caryoti- |
| Sphondylion | des |
| Oenanthe | Ficus |
| Buphthalmos | Sinapi |
| Chryſanthemon | Præſon, id eſt porrum |
| Vinum abſynthite. | Glycyrrhiza |
| ARSENICI, ſiue | Triticum |
| auripigmenti | Rhaphanus |
| curatio. | Laſerpitium |
| Dioſc. lib. 6. cap. 29. | Pentaphyllon |
| ARTICVLORVM | Vua paſſa |
| morbis vtilia. | Rhodomeli |
| Amurca Anethinum | Tragacantha. |
| Agaricum | ASPIDVM morſus |
| Arſtion | remedia. |
| | Cimices lecti |

But

INDEX

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Butyrum | Clematis | Lixiuia ex ficu |
| Daphnoides | | Ionia siue Cionia |
| Aqua maris | | Adeps |
| Diosc. lib. 6. cap. 70. | | Adipum medicinae |
| ASTRICTORIAE | | Faba Aegyptia |
| medicinae. | | Lens |
| Aspalathus | | Portulaca |
| Bryon | Crocus | Seris |
| Oleum omphacinum | | Porrum |
| Oleum ex oleastro | | Hedera |
| Myrrha | | Myosotis |
| Vnguentum melinum | | Agaricum |
| Vnguentu cenanthinu | | Rhaponticum |
| Cortex thuris | | Gentiana |
| Picea ac pinus | | Absynthium |
| Pityides | Lentiscus | Absynthium seriphiu |
| Terebinthus | | Mentha |
| Fuligo picis | | Melilorus |
| Cypressus | Iuniperus | Maron |
| Vlmus | Paliurus | Ruta |
| Cyprus | Lilia | Cyminum satium |
| Cittos | Hypocistis | Hieracium maius |
| Cydonia | Rosa | Coniza tertium genus |
| Acacia | Salix | Lyfimachium |
| Vitex | | Clymenos |
| Olea syluestris | | Anchusa |
| Quercus | Castanea | Idaea radix |
| Galla | Thus | Granum tinctorum |
| Palma | Palma elate | Chrysocome |
| Malicorium | Myrtus | Aizoon maius |
| Myrtidanum | Malus | Phlomides |
| Cotonea | Perfica | Lotus syluestris |
| Pyra | Pyra syluestris | Ebulus |
| Mespilus | | Vitis syluestris |
| Mespilus alia | | Nuclei acinorum |
| Cornus | Morus | Vua cenanthe |
| | | Omphacium |
| | | Passum |
| | | Vinum omphacite |
| | | Vinum nigrum e la- |
| | | brusca |
| | | Vinum cydonite |
| | | Omp |

CURATIVVS.

| | |
|----------------------|----------------------|
| omphacomeli | Bulbus esculentus. |
| vinum apiite | AVRIVM medi- |
| vinum myrtite | cina. |
| vinum palmeum | Cannabis sativa |
| vinum cedro | Araneus |
| vinum pifsite | Adipum medicinae |
| vinum absynthite | Asphodelus |
| vinum tragoriganite | Absynthium Anisum |
| vinum prasite | Aparine Aqua maris |
| vinum calaminthite | Acetum |
| vinum aromatite | Acetum scilliticum |
| puma argenti | Alumen Aphronitrum |
| Chryfocola | Blattæ Beta |
| Cinnabaris | Crocus Cistos |
| Chalcanthon | Cornix Cucurbita |
| Diphryges | Cepe Capparis |
| Arsenicum | Cucumis anguinus |
| Sax vini | Daphnides |
| Lapis Phrygius | Dracunculus maior |
| Lapis Afius | Ficus |
| Lapis scissilis | Fel animalium |
| Terra cretria | Faba Aegyptia |
| Lapis Samius | Flos æris Flos salis |
| Fuligo pictoria. | Hedera Helxine |
| ASSVLAS fixas cor- | Irinum vnguentum |
| poribus extra- | Hyssopus Laurinum |
| hentes. | Lycium Lapation |
| Cochleæ terrestres. | Malum punicum |
| TATTONITIS vtilia | Myrtus Mel |
| Ampeloleuce. | Myosotis Mentha |
| AVRVGINEM | Melilotus Myrrha |
| tollentia. | Oleum amygdalinum |
| Lycium Agaricum | Oleum balaninum |
| Libanotis coronaria. | Oleum hyoscyaminum |
| AVRICVLARVM | Olea sylvestris |
| remedia. | Onos Origanum |
| | R |

INDEX

| | | | |
|---|------------|------------------------------|----------------|
| Omphacium | Pix | Allium | Argemon |
| Populus alba | | Eryngium | Pulegium |
| Plantago | | Apium | Vinum cedrites |
| Porrum | Peucedanus | Sal | Terra samia |
| Prasion | | B I L E M adgene- rantia. | |
| Polygonon mas | | Iuglans. | |
| Papauer satium | | B I L E M pur- gantia. | |
| Psyllium | | Agriorhaphanus | |
| Rhus obsoniorum | | Androsamos | |
| Rosa | Salix | Anchusa | Apios |
| Senecta serpentis | | Brassica canina | |
| Sesamum | Sinapi | Calamintha | |
| Spondylium | Stoebe | Clematis | Cici |
| Strychnum satium | | Cucumis anguinus | |
| Sulphur | | Characias | Chamaelea |
| Thus cum pice | | Helleborum nigrum | |
| Terebinthina | | Elaterium | Ebulus |
| Vermes | Vrina | Epithymū | Empetron |
| Vinum myrteum, siue myrsinite | | Helenium | Hippophaes |
| Vinum cedrites. | | Heliotropium | |
| B DELLARVM, siue hirudinum cu ratio. | | Iris illyrica | |
| Diose. lib. 6. cap. 32. | | Lychnis sylvestris | |
| BESTIAS fu- gantia. | | Lathyris | Linzoostis |
| Acantha leuce, siue spi- na alba. | | Malus | Melanthion |
| BESTIARVM ve- nenatarum remedia. | | Mentha | |
| Balsamum. | | Mandragoras | |
| BESTIARVM mor- sus remedia | | Ocymum | Parthenion |
| Helenium Aegyptium | | Peplōs | Scammonia |
| Sanguis | Porrum | Thlaspi | Thapsia |
| | | Thymelae | |
| | | Vitis fatiua | |
| | | Vnguentum | Susinaum |
| | | id est, lilii. | |
| | | BLATTAS in se cont | |

CVRATIVVS.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| contrahentia. | Amygdalus amara |
| phlomis. | Osisifragus |
| BOVM scabiem | Vrina |
| emendantia. | Struthion |
| Cedria. | Centaurium maius |
| BRONCHOCE- | Bdellium Daphnides |
| las discutientia. | Paliurus Pruna |
| vide, gutturis remedia | Finum Lapathon |
| BVPRESTIS ve- | Sisymbrium Ononis |
| neni remedia. | Cuminum sylvestre |
| ac schiston. | Artemisia |
| Dioscorides libro 6. | Hippomarathon |
| cap. 3. | Asplenon Anthemis |
| CACHEXIAE, id | Parthenion Pæonia |
| est maiore remedia. | Lithosperma |
| qua maris. | Althæa Tribulum |
| CACOETHE re- | Saxifragum |
| media. | Gramen Tragion |
| unguentum rosaceum | Acanthus |
| rocinum Thus | Cotyledon prima |
| landes Ficus | Vitis fativa |
| icer Plantago | Myrtus sylvestris |
| racunculus maior | Oxalme |
| racunculus minor | Lapis Iudaicus Ochra |
| edera Viscum | Lapides spongiarum. |
| sclepias Psyllium | CALEFACTO- |
| rtica Petasites | riæ medicinae. |
| admia Diphryges | Adipum medicinae |
| los salis. | Medullæ animalium |
| CALCIS curatio. | Fel Cera |
| Diosc. lib. 6. cap. 29. | Propolis Triticum |
| CALCVLI remedia. | Rhaphanus |
| typerus | Rhaphanus agria |
| tardamomum | Sisymbrium |
| oleum amygdalinum | Sisymbrium aquaticum |
| terasia | Sinapi Nasturtium |

INDEX

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| Thlaspi | Erysimon | Myrrha |
| Piper | Zingiber | Myrrha Bœotica |
| Dracunculus maior | | Styrax |
| Dracunculus minor | | Thus |
| Asphodelus | | Resina |
| Bulbus esculentus | | Iuniperus |
| Agaricum | | Sabina |
| Gentiana | | Cedrides |
| Anonis, siue Ononis | | Daphnides |
| Eryngion | | Cistos alia |
| Abfynthium | | Amygdalæ amara |
| Abfynthium seriphium | | Ficus |
| Hyssopum | Origanum | Lixiuia ex ficu |
| Tragoriganum | | Cisseris |
| Pulegium | | Cochleæ terrestres |
| Mentha | | Fiber |
| Serpyllum | | Buprestis pityocampa |
| Sampsuchum | | Salamandra |
| Maron | Aspalathus | Oesypus |
| Crocomagma | | Panaces heraclion, siue |
| Helenium | | herculeum |
| Oleum vulgare | | Ligusticum |
| Oleum sicyonium | | Seseli Massiliense |
| Strigmenta gymnastorum & palæstrarum | | Sison |
| Elæomeli | Laurinum | Caros |
| Sampsuchinum | | Cuminum satium |
| Ocimum | | Ammi |
| Anethinum | Susinum | Smyrnion |
| Cyprinum, siue ligustrium | | Hippomarathrum |
| Irinum | Gleucinum | Daucus |
| Amaracinum | | Laserpitium |
| Metopium | | Galbanum |
| Stacte | Nardinum | Ammoniacum |
| Malabathrinum | | Stachys |
| | | Scordion |
| | | Artemisi |
| | | Anthemis |
| | | Chrysocom |
| | | Portulaca agrestis |
| | | Lo |

CURATIVVS.

| | | |
|------------------------|--|-------------------------|
| Lotus fylueſtris | | CALLORVM |
| Vinum picatum | | remedia. |
| Vinum in comuni | | Triticum |
| Aqua maris | | Laſerpitium |
| Vinum è cedro, arbori- | | Chalcitis lapis. |
| búſque aliis | | CANCRESCEN- |
| Vinum è cypreſſo | | tibus vlceribus |
| Vinum cedrite | | medetur. |
| Vinum chamædryite | | Vrtica. |
| Aerugo aurificum | | CANES occidentia. |
| Chryſocolla | | Aſparagus |
| Chalcanthon | | Apocynon. |
| Alumen Sulphur | | CANIS rabiẽ ſanat. |
| Floſ ſalis Pyrites | | Alyſſum. |
| Lapis hæmatites. | | CANIS rabioſi mor- |
| CALEFACTO- | | ſus remedia. |
| rum remedia. | | Lycium Cancrĩ |
| Lana ſuccida. | | Cinis vitium Garum |
| CALIGINIS ocu- | | Omotarichos |
| lorum remedia. | | Smaris |
| Fel animalium | | Iecur ardens canis |
| Laſtuca fylueſtris | | Triticum Sanguis |
| Ocymum Cape | | Mel Groſſi |
| Dracunculus maior | | Panaces heracleon |
| Sinapi Naſturtium | | Cape Laſerpitium |
| Eryſimon Piper | | Vrina |
| Zinziber | | Aſter atticus |
| Dracunculus minor | | Meliſſophyllon |
| Anagallis | | Vrtica Cynogloſſon |
| Chelidonium maius | | Fœniculum |
| Sagapenon | | Ballote Oxalme |
| Chamædryſ | | Aphronitrum, ſiue ſpu- |
| Chamaſyce | | ma nitrĩ. |
| Floſ æris | | Dioſc. lib. 6. cap. 37. |
| Pumex Fax vini | | Herm. Coroll. cap. 212. |
| Lapis thyites. | | CANIS non rabidi |

R

INDEX

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| morsus remedia. | Cupressus | |
| Amygdalæ amarae | Fagus | Ille |
| Iuglans | Ficus | Palma elate |
| Miculi | Gobius | Myrtus |
| Cucumis | | Elelisphacos |
| Bulbus esculentus | | Vinum myrtite. |
| Mentha | Ebulus. | CAPILLVM |
| CANIS impetum | | rufantia. |
| cohibentia. | Cyprus | Lycium |
| Iecur & dens canis. | Lotus | Fax vini |
| CANES necantia. | CAPILLVM fla- | |
| Chamaeleon albus. | uum reddentia. | |
| CANVM scabiem | Aqua maris. | |
| emendantia. | CAPILLVM | |
| Oleum lentiscinum | purgantia. | |
| Cedria. | Fœnogræcum | |
| CANTHARIDES | Linum. | |
| fugantia. | CAPILLOS | |
| Vnguentum melinum. | tingentia. | |
| CANTHARIDVM | Acacia | |
| veneni remedia. | Myrtus | Morus |
| Lac schiston | Stratiotes terrestres | |
| Adipum medicinæ | Ebulus | |
| Diosc. lib. 6. cap. 1. | Terra ampelites. | |
| CAPILLORVM | CAPILLOS | |
| defluuium repri- | nutrientia. | |
| mentia. | Iuglans | |
| Oleum ex oleastro | CAPITIS vlce- | |
| Myrrha | rum remedia. | |
| Cistos alia, siue ladanū | Balsamum | |
| Myrtus | Oleum ex oleastro | |
| Brassica sativa | Oleum amygdalinum | |
| Nasturtium | Vnguentum rosaceum | |
| Aloë | Telinum | |
| Adiantum. | Narcissinum | |
| CAPILLVM | Myrrha | Thus |
| denigrantia. | | Vrina |

C V R A T I V V S.

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|-------|
| Vrina | Fœnogræcum | Oxyſchœnos | |
| Cicer | Linum | Psyllium | |
| Malua | Allium | Papauer rhœas, ſiue er- raticum | |
| Cyclaminos | | Strychnon, ſiue ſolanū ſatium | |
| Bulbus eſculentus | Lilium | Aizoon maius | |
| Melilotus | | Hippogloſſon | |
| Bettonica, ſiue Britan- nica | Rubus | Chamaedaphne | |
| Xyris | Oxalme | Myrtus ſylueſtris | |
| Rubus Idæus | Sal. | Elaterium | |
| Vinum myrſinite | | Scammonium | |
| CAPITIS dolo- ris remedia. | | Vitis ſatiua | |
| Iris Illyrica | Aſarum | Vinum | |
| Meon, ſiue meu | | Vua œnanthe | |
| Oleum oleaſtri | | Aqua maris | |
| Oleum amygdalinum | | Acetum ſcillite | |
| Vnguentum roſaceum | | Lapis ophites. | |
| Narciſſinum | Cyprus | CAPITIS dolo- rem facientia. | |
| Rofæ | Vitex | | |
| Amygdalæ amaræ | | Styrax | Oliuæ |
| Torpedo | | Glandes | Palma |
| Lac humanum | | Arbutus | |
| Lana ſuccida | | Iuglans | |
| Curmi | Sifymbrium | Eruum | |
| Sefamum | Hedera | Absynthium | |
| Portulaca | Aloë | Ferula | |
| Mentha | Serpyllum | Meu, ſiue meon | |
| Baccharis | Ruta | Peucedanus | |
| Aniſum | | Mandragora | |
| Sphondylion | | Vinum gypſatum | |
| Peucedanum | | Vinum phœnicite | |
| Melanthion | | Vinum rhetinite | |
| Coniza maior | | Vinum meſagite. | |
| Anagyris | Bettonica | CAPVT purgantia. | |
| Radix hederae | | Anemone | |

INDEX

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| Brassica satiua | Characias | Cadmia |
| Beta | Aes vstum | |
| Chelidonium minus | Flos aris | |
| Chalcanthum | Lascepitium | |
| Cyclaminos | Lana vsta | |
| Origanum. | Lapis Asius | |
| CARBVNCVLO- | Spuma argenti | |
| rum medicina. | Smaris. | |
| Brassica satiua | CARCINOMA- | |
| Cupressus | tum remedia. | |
| Cinnamomum | Fuligo thuris | |
| Cyprus | Buprestis | Cicer |
| Coriandrū | Erysimon | |
| Eruum | Dracunculus maior | |
| Iuglans | Dracunculus minor | |
| Lupinum satium | Aristolochia tertia | |
| Lascepitium | Vrtica | Galiopsis. |
| Nasturtium | CASEVS ne cariem | |
| Olea syluestris | sentiati. | |
| Pix | Dracunculus minor. | |
| Panaces heracleon | CAVA implemtia. | |
| Sabina | Cadmia | Pompholyx |
| CARDIACO- | Cerussa | |
| rum reme- | Lapis schistos | |
| dia. | Lapis morochthus | |
| Buprestis | Terra samia | |
| Seris | Fuligo thuris | |
| Rubus. | Aristolochia tertia. | |
| CARNEM tenerio- | CAEPAE acrimonia | |
| rem reddentia. | retundit | |
| Vrtica siue acalyphe. | Ruta. | |
| CARNEM coalesce | CAERASTAE ictus | |
| re facientia. | remedia. | |
| Lixiua ficus | Cedria, siue cedrinus | |
| Symphyton. | quor. | |
| CARNES superua | Harundo | |
| cuas compescentia. | | Rosa |

CVRATIVVS.

| | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| Rosa | Sal | Aeris flos |
| Dioscor. lib. 6. cap. 55. | | Aerugo aurificum |
| & 69. | | Fuligo butyri |
| CERVSSAE | CV- | Faba Fax vini |
| ratio. | | Oleum myrtinum |
| Dioscor. lib. 6. cap. 22. | | Oleum Balaninum |
| CERIONVM VL- | | Oleum cicinum |
| cerum remedia. | | Olea Aethiopica |
| Grossi | Pepo | Peucedanum |
| Quare, Fauos rum- | | Plumbum clotum |
| pentia. | | Pumex |
| CERVICIS rigo- | | Scoria argenti. |
| ris medicina. | | CICVTAE con- |
| Vide, Opisthotonico- | | traria. |
| rum remedia. | | Passum & vinum |
| CHIRONIORVM | | Vinum in comuni |
| vlcerum remedia. | | Acorum |
| Plantago | | Hermo. Cor. cap. 17. |
| Ampeloleuce. | | CIMICES fugan- |
| CHOLERICIS | | tia & negantia. |
| vtilia. | | Hermo. Cor. cap. 366. |
| Cotonea mâla. | | & 806. |
| Calamintha | | CLAVORVM |
| Ferrum | Mentha | remedia. |
| Polygonon mas. | | Smaris Fimum |
| CICATRICVM | | Laserpitium. |
| remedia. | | COELIACORVM |
| Anemone | | Remedia. |
| Aloe | Adeps | Myrrha Hypocistis |
| Bulbus esculentus | | Lycium |
| Balanus myrepica | | Olea syluestris |
| Cistos Centaurium | | Quercus aut robur |
| Chamaesyce | | Galla Thus |
| Calx viua | | Myrtus Cotonea |
| Corallium | | Morus |
| Aes vstum | | Lixiua ex ficu |

INDEX

Ceruinum cornu

Faba Aegyptia

Lapathon

Plantago Coronopus

Rhaponticum

Acantha leuce, siue spi-
na alba

Ferula

Lascepitium

Tragos herba

Papauer satium

Vinacci

Nuclei vinaceorum

Elæomeli

Vinum phœnicite

Vinum rhetinite

Ferrum

Lapis morochthus.

COLI remedia.

Colocynthis

Fimum Galerita

Mel Petroselinum

Ruta Sesamum

Talus suis.

COLOREM com-
mendantia.

Acetum scillite

Bupthalmos

Cerussa

Cyminum satium

Lascepitium

Mastichinum

Vnguentum rosaceum

Vinum

Vinum aromatite.

COLLECTIO-

num remedia.

Amomum

Vnguentum telinum

Zopissa Naphtha

Myrica Paliurum

Cyprus

Olea sylvestris

Glandes Morum

Grossi Ouum

Triticum Hordeum

Fœnogræcum

Linum Cicer

Agriorhaphanus

Plantago Sonchos

Nasturtium

Bulbus esculentus

Argemone altera

Rhaponticum

Acantha leuce

Thymus

Coriandrum

Smyrnum

Libanotis Viscum

Parthenion

Cannabis syluatica

Anagryis syluatica

Helxine

Pentaphyllon

Peristerion supinus

Papauer satium

Stratiotes aquaticus

Cytisus

Ampelos leuce

Vinum in communi

Vinum adynamon

Vinum cydonite.

COM

C V R A T I V V S.

COMITIALIS morbi remedia.

Cardamomum

Balsamum Naphtha

Populus nigra Ficus

Iuncus odoratus

Lepus terrestris

Mustela c cur

Vnguis asini

Lichen equi

Iecur hirci Hirūdines

Serum Lac humanum

Coagulum Fel

Sanguis Fimum

Plantago

Eryngion Ruta

Seseli Mafsiliense

Libanotis

Sphondylion

Peucedanum

Laserpitium

Galbanum

Sagapenum

Ammoniacum

Trifolium

Coniza Anthyllis

Symphyton Cestron

Pentaphyllon

Papauer aphrodeles

Viola purpurea

Helleborum nigrum

Hippophæston

Ampelos leuce

Ampelos melana

Oxymel

Acetum scillite

Lapis selenites

Lapis aetites

Cotes.

CONCEPTIONI

contraria.

Epimedium

Heliotropium maius

Aerugo ferri

Alumen

Lapis ostracites

Hermo. Cor. cap 267.

C O N C E P T I O -

nem facilitantia

Coagulum

Lolium

Staphylinos agrios

Lapis samius.

CONCOCTIO -

ni vtilia.

Anethum Althæa

Acetum scillite

Balsamum Crocus

Crocomagma

Caros Cestron

Calx viua Eruca

Ligusticum Pulegium

Papauer satium

Resina Styrax

Seseli Mafsiliense

sulphur Vinum

Vinum resinatum

Vinum absynthite

Vinum tragorigante.

CONSTRICTO -

riæ medicinae.

Vlde, Adstrictoriae me-
die

INDEX

dicinæ

CONVULSIO-

nis remedia.

Iris Illyrica

Acorus

Cardamomum

Asarum Costus

Iuncus odoratus

Balsamum Helenium

Calamus odoratus

Sampfuchinum

Metopium

Bdellium Iuniperus

Cedrides Halimos

Lixiua à ficu Fimum

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis Argemone

Rhaponticum

Gentiana

Aristolochia tertia

Centaurium maius

Acantha leuce

Abrotonum

Origanum Pulegium

Calamintha

Serpyllum

Baccharis

Panaces heracleon

Libanotis

Peucedanum

Laserpitium

Sagapenon

Galbanum

Clinopodium

Chamaedrys

Alisma

Cestron

Xyris

Symphytum

Psyllium

Phlomidet

Ampeloleuce

Vinum scilliticum

Vinum chamaedryte

Vinum tragoriganite

Vinum daucite

Vinum panacite.

CONDYLOMA-

tum remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum

Myrtus

Cotonea

Ouum

Aloe

Anethum

Libanotis

Ballote

Stachys

Phalangion

Penthaphyllon

Vitis sativa Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

CORDIS tremoris

medicinæ.

Nardi spica.

CORIANDRO

contraria.

Vinum in commun

Dioscor. lib. 6. cap. 9.

CORPORA defun-

cta à corruptione diu-

tuetur

Cedria.

CORPVS macre-

scencia.

Canc

CV RATIVVS.

| | | |
|------------------------|---------|----------------------|
| anchamum. | | CROCEVM colo- |
| COXAE doloris re- | | rem facit |
| media. | | Rhaponticum. |
| trigmenta à palæstris. | | CRVDITATIS |
| COXENDICVM | | remedia. |
| doloris remedia. | | Balsamum |
| spargus | | Strigmenta à balneis |
| garicus | Althæa | Gentiana |
| brotonum | | Vinum scilliticum. |
| Aster Atticus | | CRVSTAS generat |
| Acetum scilliticum | | Lana vsta. |
| Centaurium minus | | CVLICES fugan- |
| Calamintha | | tia. |
| Coris | Cestron | Cupressus |
| Cucumis sylvestris | | Coniza |
| Erysimum | | Ebulus |
| Euphorbium | | Absynthium |
| Fimum | Garus | Hiberis |
| Helenium | | Plumbum vstum. |
| Ammoniacum | | CVTEM albicantia. |
| Hypericon | Hiberis | Rapum sylvestre. |
| Heliochrysos | | CVTEM erugantia. |
| Iris Illyrica | Lolium | Oleum amygdalinum |
| Lupinum fatium | | styrax. |
| Laserpitium | | CVTEM lenientia. |
| Naphtha | Onos | Amygdala amara |
| populus alba | | Oleum sicyonium |
| Panaces heracleon | | Vnguentum telinum |
| Peucedanum | | Succus peponis |
| Pentaphyllon | Ruta | Terra Chia. |
| Scammonium | | CVTIS vitia tol- |
| Vinum asarite | Xyris. | lentia. |
| CRASSITVDI- | | Adarce Ampelos leuce |
| nē extenuātia. | | Amygdalæ amaræ |
| Porrum | | Cochleæ terrestres |
| Staphis agria. | | Costus |
| | | Chamaeleon niger |
| | | Iris |

INDEX

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|----------|
| Iris Illyrica | Lac | Ficus | Galba |
| Ficus | Linum | Galbanum | Hedera |
| Lupinus | | Hyoſcyamus | |
| Lotus ſylueſtris | | Hyſſopus | |
| Mel Ponticum | | Laſcrpitium | |
| Oleum raphaninum | | Leucacantha | |
| Picca | | Myrica | Morus |
| Sanguis leporis | | Melanthion | |
| Spuma argenti. | | Meliſſophyllon | |
| CVTIS pruritus | | Naphtha | |
| remedia. | | Olea Aethiopica | |
| Lac. | | Picca | Plantago |
| D ENTIVM dolo- | | Panaces heracleon | |
| ris remedia. | | Pyrethrum | |
| Amurca | | Peucedanum | |
| Halicacabus | | Pentaphyllon | |
| Asparagus | | Rhus | Rana |
| Allium | Anagallis | Sepia | |
| Aristolochia | | Senecta ſerpentis | |
| Acantha leuce | | Strychno hypnoticon, | |
| Absynthium | | ſiue ſomniſcerum | |
| Arction | Acetum | Vnguentum roſaceum | |
| Acetum ſcillite | | Vermes terreni. | |
| Alumen | Batrachion | D ENTIVM ſtupo- | |
| Cedria | Cytinus | ris remedia. | |
| Cochleæ terreſtres | | Portulaca. | |
| Capparis | | D ENTITIONI in- | |
| Chelidonium maius | | fantium vtilia. | |
| Chamaeleon niger | | Leporis cerebrum | |
| Clematis daphnoides | | Butyrum cum melle. | |
| Cucumis anguinus, | | D ENTIFRICIA. | |
| ſiue ſylueſtris | | Purpura Buccinum | |
| Characias | | Cervinum cornu | |
| Colocynthis | | Halevonium | |
| Ephemeron | | Corallium. | |
| Helleborus niger | | D ENTIBVS ſtupo- | |
| | | rent | |

C V R A T I V V S.

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| rem adferentia. | Althæa | Viscum |
| admia. | Galbanum | |
| DENTES firmantia. | Ammoniacum | |
| entifcus | Lapis Gagates. | |
| liuæ colymbades | DOLORVM inue- | |
| Myrrha | teratorum remedia. | |
| oleum omphacinum. | Sinapi | |
| DENTES albica- | Lana succida | |
| re facit. | Ligusticum. | |
| Halcyonium. | DOLORES lateris. | |
| DENTES vitiatos | Vide, laterum dolores. | |
| extrahentia. | DOLOREM ne fen- | |
| murca | tiant qui vrendi se- | |
| oleum oleastri. | candive sunt. | |
| DENTES mouentia. | Mandragoras | |
| oleum oleastri. | Lapis memphites. | |
| DEPILEŚ facientia. | DORYCNII curatio | |
| scolopendria | Diosc. lib. 6. cap. 6. | |
| Characias. | DRACONIS mari- | |
| DESQVAMATIS | ni morsus. | |
| vtilia. | Mullus piscis | |
| Strigmenta gymnasto- | Vrina | Ocymum |
| rum | Abfynthium | |
| Lana succida. | Plumbum elotū & cre- | |
| DESTILLATIO- | matum | |
| nes coercentia. | Sulphur | |
| Urinum | Diosc. lib. 6. cap. 61. | |
| Styrax | DRYINI morsus | |
| Naphtha | curatio. | |
| Et in verbo, Pituitæ de | Diosc. lib. 6. cap. 65. | |
| stillationis remedia. | DVRITIEM emol- | |
| DILACRYMA- | lientia. | |
| tionones emendantia. | | |
| Picea | Amaracinū vnguentū | |
| Pinus. | Bdellium | |
| DISCVSSORIAE | Bupthalmos | |
| medicinæ. | Cyprinum | |
| Androsamon | | |

Cap

INDEX

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Capparis | | Ferrum | Galla |
| Erysimon | Aegilops | Omphacium | |
| Ficus | Fimum | Hypocistis | |
| Glans | Galiopsis | Hedera | Hippuris |
| Hydropiper | | Lentiscus | Lycium |
| Ammoniacum | | Lotus | |
| Lens | Linum | Lixiuia ex ficu | |
| Lapis alabastrites | | Lac schiston | |
| Megaliu | | Linum | Lapathum |
| Melanthion | | Lyfimachia | |
| Mandragoras | | Myrrha | Macer |
| Porrum | | Malum punicum | |
| Panaces heracleon | | Melissophyllum | |
| Pentaphyllon | | Naphtha | |
| Paronychia | | Nymphæa | |
| Pyrites | Styrax | Nuclei acinorum | |
| Sanguis | Smyrnion | Oryza | Omphacium |
| Terra cimolia | | Oxalme | Portulaca |
| Vinacei | | Plantago | Phyllitis |
| DYSENTERICO- | | Polemonium | |
| rum remedia | | Pentaphyllon | |
| Adipum medicina | | Papauer ceratite, siue | |
| Asparagus | Argemone | corniculare | |
| Agaricum | | Quercus | |
| Althæa | Alcea | Rubrica, siue terra lēnia | |
| Alisma | | Silurus | Sanguis |
| Aizoon maius | | Sium | Scordium |
| Butyrum | Cupressus | Symphyton | |
| Cotonea | Cornu | Stœba | |
| Ceruinum cornu | | Sideritis achillea | |
| Coagulum | Cera | Salsugo | Tragion |
| Clematis daphnoides | | Vitis satiuā, siue vini- | |
| Elatine | | fera | Vinacci |
| Eupatorium | | Vinum cydonite | |
| Fernogracum | | Et in verbo, intestino- | |
| Faba Aegyptia | | rum remedia. | |
| | | Ebriet | |

C V R A T I V V S.

E BRIETATI vti-
lia.

Amygdalus amara

Brassica satiua

Absynthium.

E LEPHANTIAE
remedia.

Cedria

Erinaceus terrestris

Serum

Fel animalium

Zythum Plantago

Calamintha.

E LEPHANTIAS
gignentia.

Vinum sicyte.

E MOLLIENTES
medicinae.

Adipum medicinae.

Bdellium

Cinnamomum

Gypros

Cistos

Cerussa Chalcanthum

Calx viua Oesypus

Foenogracum

Gleucinum

Ammoniacum

Irinum Laurus

Lana succida

Linum

Lapis Gagates

Metopium

Myrrha Boeotica

Medullae animalium

Naphtha

Palimpissa

Panaces heracleon

Psyllion

Plumbum clotum

Resina

Styrax Viscum.

E N T E R O C E L A E
remedia.

Hippuris, siue equisetū.

E P H E L I D I S vti-
lia.

Balanus myrepica

Cici.

E P I N Y C T I D I S
morbi remedia.

Olea syluestris.

Myrtus

Amygdalae amarae

Grossi Fimum

Brassica satiua

Plantago Cucumis

Porrum Absynthiū

Coriandrū cum melle

passaque vua

Viscum

Heliotropium maius

Vua passa.

E P I P H O R A E re-
media.

Asarum Malobathrū

Cotonca Crimnon

Coriandrum Liliū

Ambrosia Vua passa

Terra samia.

E R V C I S pinorum
conuenit.

S.

INDEX

Vnguentum melium

Diosc. lib. 6. cap. 2.

ERYPTIONVM

remedia.

Serum

Lupinum satium

Beta Portulaca

Pentaphyllon

Balanus myrepica

Vinum myrsinitæ

Alumen.

EXCREATIONIS

crassæ pectoris

remedia.

Pix liquida

Dracunculus minor

Tordylon.

EXCRESCEN-

tia deprimētia.

Alumen Cerussa

Cinis vitis

Diphryges

Erinaceus marinus

Lapis Asius

Ochra Pumex

Pyrites Scordion

Spuma argenti Sal.

EXTENUATO-

riæ medi-

cina.

Artemisia

Anthemis

Iris Illyrica

Hyssopus

Lapis hematites

Pulegium

Panaces heracleon.

EXTRACTORIAE

medicinae.

Galbanum

Viscum Thapsia

Scoria argenti.

FACIES ne à sole

aduratur.

Ouum.

FACIEI vitia aufe-

rentia.

Ampelos agria

Halcyoniuna

Adarces

Brassica sativa

Bulbus esculentus

Balanus myrepica

Cinnamomum

Cochleæ terrestres

Cyclaminos

Eruum Ficus

Hedera Iris Illyrica

Lepus Lilium

Lotus sylvestris

Mastichinum

Mel sardoum

Oleum amygdalinum

Oleum raphaninum

Pepo Polygonaton

Spuma argenti

Sisymbrium aquaticum

Thapsia.

FACIEI rugas au-

ferentia.

Cacalia.

FASTIDIUM ge-

ner

C V R A T I V V S.

nerantia.

Vinum catorchite

Diosc. 6. in præfat.

F A T I G A T I O -

num remedia.

Adeps.

F A V O S rumpentia.

Eruum

Vua passa

Peponis radix

Grosi.

F A V C I V M morbi

remedia.

Acetum

Acetum scillite

Cacalia

Acthiopis

Ficus

Lac

Laserpitium

Mel

Papauer satium

Syrax.

F A V C E S asperas

facientia.

Characias

Cimolia terra.

F E B R I B V S con-

traria.

Mala punica.

F E B R I F V G I A.

Centaurium minus

Coniza.

F E B R I V M remedia.

Agaricum

Aristolochia tertia

Anthemis

Anchusa

Aphronitrum

Balsamū

Buglossum

Costus

Cucurbita

Clymenon

Feniculus Hypericon

Hyoscyamus

Heliotropium maius

Lac humanum

Lagopus

Myrrha

Ouum

Oleum sicyonium

Portulaca

Piper

Panaces heraclcon

Polygonon mas

Pentaphyllon

Peristerion supinus

Rhaponticum

Ruta

Smyrnon

Sapapenon

Saxifraga

Trifolium

Vua

Vinum melitite

Vinum rhoite

Vinum hyssopite.

F E B R I S quartana

remedia.

Araneus

Buglosson

Cimices lecti Dipfacū

Hypericon

Heliotropion maius

Pentaphyllon

Verbenaca supina

Trifolium

Ruta.

F E L L E suffusis uti-

lia.

Adiantum

Vinum asarite.

F E L L E I humoris

S 2

INDEX

remedia.
 Absynthium
 Centaurium minus.
 FERITATEM ani
 maliū mitigantia.
 Oenagra.
 FERRVMINAN-
 di vim habentia.
 Spuma argenti
 Rubrica sinopis
 Spongia
 Lapis morochthus.
 FILIVM masculū
 generantia.
 Phyllon Orchis
 Crataegonos.
 FISTVLARVM
 remedia.
 Adeps Arisaron
 Cinnamomum
 Characias
 Chalcites lapis
 Dracunculus minor
 Dipfacus
 Helleborum nigrum
 Orchis Scirpiaz
 Omphacinum
 Papyrus Plantago
 Pentaphyllon
 Stratiotes terrestris.
 FLATVS discutien-
 tia.
 Cinnamomum
 Ocymum
 Vinum stichadite.
 FLATVM adgene-

rantia.
 Malus Zythum
 Phaseolus.
 FLVXIONVM
 remedia.
 Fuligo butyri
 Erysimon
 Lichen in petris
 Ocymum Portulaca
 Pepo Squama aris
 Papauer fatium
 Acantha Arabica
 Chium vinum
 Acetum Ebenus
 Liciū Lixiua ex ficu
 Vinum rhoite
 Vinum terebinthinum
 Vinum pissite
 Vinum melampsythiū.
 FOETVS necantia.
 Vide, Partus necantia.
 FOEMINAS steri-
 lescentia.
 Lepus terrestris
 Hedera.
 FORMICAE mor-
 bi remedia.
 Cicer Characias
 Chamæfyce
 Batrachion Dipfacū
 Heliotropium maius
 Lacerta Ruta
 Thus Vitis sativa.
 FRACTVRAE re-
 media.
 Fuligo pictoria.
 FVNG

C V R A T I V V S.

FVNGORVM ve-
nenatorum re-
media.

Verbenaca

Fimum

Mel

Rhaphanus

Abfynthium

Meliffophyllon

Fungi

Vinum in comuni

Acetum

Chalcanthum

Sal

Pyrorum ligni cinis

Aphronitrum

Cinis vitium

Lapis Afius

Diofc. lib. 6. cap. 23.

FVRVNCVLO-
rum remedia.

Ficus

Groffi

Triticum

Rhaphanus

Asphodelus

Galbanum

Pygnoكوم

Sal

Aphronitrum.

FVRVRES tollen-
tia.

Allium

Adiantum

Alumen

Fœnogræcum

Fel animalium

Groffi

Linum

Lilium

Myrtus

Malua

Oleum oleastri

Oleum anygdalinum

Oleum myrtinum

Oxalme

Olea

Salix

Vnguentum melinum

Vnguentum telinum

Vrina

Vinum myrsinite

Allium

Beta.

GANGRAENAE
morbi remedia.

Ampelos leuce

Brassica fatiua

Bulbus esculentus

Cinnamomum

Characias Galiopsis

Iuglans

Lixiuia è ficu

Lilium

Lens

Lupinum fatium

Laserpitium

Rhus

Rhaphanus

Vrtica

Vua passa.

GENITALIUM
morbi remedia.

Asparagus

Amurca

Aloe

Aster atticus

Cyprinū Cotyledon

Fœnogræcum

Flos salis

Linum

Malum punicum

Polygonon

Sampsuchinum

Vinum terebinthinū.

GENITALIUM
virus extin-
guentia.

INDEX

| | |
|------------------------|---------------------|
| Alumen. | Aristolochia tertia |
| GENARVM mor- | Aloc Acetum |
| bi remedia. | Acetum scillite |
| Aloc | Alumen Butyrum |
| Aerugo aurificum | Canchamum Cytinus |
| Aerugo ferri | Chalcitis lapis |
| Ammoniacum | Aerugo aurificum |
| Lapis schistos | Aerugo ferri |
| Mituli Naphtha | Galla Lycium |
| Olea sylvestris. | Lepus terrestris |
| GENITVRAE pro- | Lac schiston |
| fluuii in somno | Lapis alabastrites |
| remedia. | Myrrha Mastiche |
| Lactuca sylvestris | Oleum omphacinum |
| Nymphæa | Pruna Plantago |
| Hermol. Cor. cap. 932. | Pumex Rosa |
| GENERATIO- | Rubus Staphis agria |
| nem deprimentia. | Sal Tribulus |
| Clymenon | Vua cœnanthe |
| Heliotropium malus | Vinum rhetinite. |
| Mentha Thelypteris | GLABROS aut depi- |
| Xyphion Asplenon. | les facientia. |
| GENITVRAM ex- | Scolopendra |
| tinguentia. | Characias. |
| Cannabis sativæ semen | GLADIORVM aciē |
| Anethum. | perstringentia. |
| GENITVRAM | Malum sylvestre. |
| augentia. | GLANDIS membr |
| Semen coriandri. | remedia. |
| Coriandrum. | Mel. |
| GENITALIVM | GRAVEDINIS |
| torporem in- | remedia. |
| ducentia. | Styrax. |
| Cicuta. | GVRGVLIONI |
| GINGIVARVM | vtilia. |
| morbi remedia. | Silurus. |

GVT

CVRATIVVS.

GVTTVRIS re-
media.

Edellium

Ficus After Atticus

Vinum halofanthinum

G Y P S I curatio.

Lixiuia ex ficu

Diosc. lib. 6. cap. 24.

H **AE MORRHOI-**
darū remedia.

Amaracinum

Allium Anonis

Aloe Cape

Irinum Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum Palma

Plumbum clotum

Rhus Rubus.

HAEMORRHOI-
darum curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 69.

HALITVS oris re-
media.

Agallochum

Anisum Bromos

Citrum Malobathrū

Myrrha Mastiche

Vinum selenite.

HASTVLA infi-
xas corpori ex-
trahentia.

Oxyacantha.

HEPATICORVM
remedia.

Vide, Iecinoris morbo-
rum remedia.

HERBAE quæ peri-
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

HERNIAE medicine

Cinnamomum

Cupressus Cytinus

Pentaphyllon

Psyllium Xyphion.

HERPETIS con-
traria.

Strychnon satium

Acetum.

HIRVNDINVM

visus restauratia.

Chelidonium maius.

HIRVDINES

pellentia.

Acetum.

HIRVDINIS

curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 32.

HOMINEM ne-
cantia.

Iuniperi ramenta

Smilax seu taxus.

HOMINIS morsus
remedia.

Iuglans.

HORRORES excu-
tientia.

Vide, Rigorem excu-
tientia.

HVLGERANTES
medicinæ.

Buprestis Salamandra

Batrachion Ruta

INDEX

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| Lonchitis | Hedysaron | Gentiana | |
| Clematis | | Iris Illyrica | Isatis |
| Portulaca agrestis | | Indicus lapis | |
| Ampeloleuce. | | Lixiua cū cinere ficus | |
| HVL CERV M re- | | Lentiscus | Lycium |
| media. | | Lana combusta | |
| Amygdala amara | | Lolium | Lens |
| Anemone | Amylum | Lupinus | Libanotis |
| Anagallis | Aristolochia | Laserpitium | |
| Aloe | Anthemis | Lilium | Myrtus |
| Althæa | Anchusa | Mel | Mandragoras |
| Astragalus | Aconiton | Nasturtium | |
| Arction | Acetum | Narcissus | |
| Arsenicum | Alumen | Olea sylvestris | |
| Brassica sativa | Beta | Oleum amygdalinum | |
| Bulbus esculentus | | Orobis | Orchis |
| Ballote | | Oenagra | Omphacium |
| Caries lignorum | | Plantago | Pix |
| Cistos | Chelidonium | Palma | |
| Centaurium | | Purpura combusta | |
| Chamaeleon niger | | Pepo | Panaces |
| Coriandrum | | Peucedanum | Prasion |
| Chamaedrys | | Pentaphyllon | |
| Chamaepitys | | Peristercon supinus | |
| Chamaelca | | Papauer ceratitis , id | |
| Cadmia | Cinis vitis | est corniculare | |
| Corallium | | Psyllium | |
| Dracunculus | | Plumbum clotum | |
| Elelisphacon | | Pumex | |
| Eupatorium | | Rhamnus | Ruta |
| Ebulus | Acs vstum | Stratiotes terrestris | |
| Ficus | Fimum | Scordion | |
| Aerugo aurificum | | Sandaracha | Sal |
| Fel | Glans | Spongia | Thus |
| Grossi | Hedera | Viscum | Thelypteris |
| Goed, id est, coriandrū | | Testæ fornacum | |
| | | | Vrt |

CVRATIVVS.

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Vrtica. | Ruta | Scilla |
| HVMORVM malo- rum medicina. | Sampſuchus | |
| Metopiũ vnguentum | Staphylinus | |
| Nardinum | Smyrnion | |
| Amygdalæ dulces | Strychnon hypnoticũ, | |
| Mel | ſiue ſolanum ſomni- ficum | ſal |
| HYDROPICO- rum remedia. | Trifoliũ | Tithymalus |
| | Vitex | Vrina |
| Aſarum | Anurca | Vinum ſcillite |
| Halicacabus | Allium | Vinum rhetinite |
| Abſynthium | Aniſum | Vinum cedrite |
| Androſaces | Alisma | Vinum aſarite |
| Ampelos agria | | Vinum panacite. |
| Aqua maris | | HYOſCYAMI cu- ratio. |
| Acetum | Aphronitrũ | Dioſc. lib. 6. cap. 15. |
| Halcyonium | | TECINORIS reme- dia. |
| Bupreſtis | Cyperus | Acorus |
| Cinnamomum | | Nardi ſpica |
| Calamus odoratus | | Nardum Gallicum |
| Cochleæ terreſtres | | Amomum |
| Cicer | | Iuncus odoratus |
| Chamæleon albus | | Agallochum |
| Chamædryſ | | Picea |
| Ceſtron | Cotyledon | Pinus |
| Cucumis anguinus | | Daphnoides |
| Cici | | Palma elate |
| Helleborum nigrum | | Amygdalæ amaræ |
| Ebulus | Ficus | Lac humanum |
| Erinaceus terreſtris | | Scandyx |
| Hippophaes | | Struthium |
| Hippophæſton | | Anagallis |
| Hyſſopus | Laſerpitiũ | Agaricum |
| Lathyris | Origanum | Rhaponticum |
| Plantago | Pancratiũ | Gentiana |
| Polium | Rhaphanus | Glycyrrhiza |
| | | Eryngium |
| | | Abſynthium |

INDEX

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| Serpyllum | Sphōdyliū | Lilium | Lens palustris |
| Ammoniacum | | Lapis smyris | |
| Anthemis | | Myrtus | Malua |
| Chamapitys | | Mandragoras | |
| Vettonica | Eupatoriū | Portulaca | Plantago |
| Hyoscyamus | | Parthenion | |
| Pentaphyllon | | Polygonon mas | |
| Chrysocome | | Pentaphyllon | |
| Papauer ceratitidis, siue | | Peristereon rectus | |
| cornutum | | Papauer satium | |
| Epipactis | Isopyron | Psyllium | Rhamnus |
| Vinum cydonite | | Rosa | Ruta |
| Vinum pilsite | | Rubus | Idæa |
| Vinum absynthite | | Salix | Sanguis |
| Vinum nardite | | Seris | |
| Vinum asarite | | Strychnon, siue solanū | |
| Vinum ex syluestri asa | | satium. | |
| ro | | Stratiotes aquaticus | |
| Vinum chamælates | | Vrina. | |
| Rubrica sinopis. | | ILEI morbi remedia. | |
| IGNIS sacri re- | | Oleum vulgare | |
| media. | | Strychnos halicacabus. | |
| Asarum | Acacia | IMPETIGINIS | |
| Acinos herba | | morbi remedia. | |
| Anchusa | Lycopsis | Amygdalæ amarae | |
| Aizoon maius | | Lapathon | |
| Erassica satia | | Lichen in petris | |
| Acetum | Beta | Lolium | Thus |
| Baccharis | Bechion | Myrrha | Nasturtium |
| Crocus | Cupressus | Sinapi | Propolis. |
| Coriandrum | Cicuta | INCYSSIS vtilia. | |
| Cotyledon | Cici | phlomides. | |
| Chalcitis lapis | | INFANTES mor- | |
| Aerugo ferri | | tuos vtero eii- | |
| Harundo | Helxine | cientia. | |
| Isatis | Lens | Dictamnus. | |

INF

CVRATIVVS.

INFANTIBVS

vtilia.

Athara Aster Atticus

Strychnum fatium

Smilax aspera.

INFANTIVM pu-

pillæ vt glauca,

non nigra red-

dantur.

Auellana.

INFLATIONES

facientia.

Allium

Capparis

Glans

Laserpitium

Porru

Bulbus esculentus.

INFLATIONVM

remedia.

Aspalathus

Amygdala amara

Absynthium

Anisum

Anethum

Anthemis

Althæa

Costus

Cicer

Cyminum

Eryngion

Epithymum

Heleniũ

Hysopum

Hieracium maius

Iuncus odoratus

Iuniperus

Lac

Ligusticum

Hordeũ

Ocymum

Peucedanum

Rapa syluestris

Rhaponticum

Triticum

Thymoxalme

Vrtica

Vinacel

Vinum

Vinum pifsite

Vinum absynthite

Vinum scilliticum

Vinum chamædryite

Vinum tragoriganite

Vinũ syluestris nardi.

IEFLAMMATIO

num remedia.

Coriandrum

Adcps

Asphodelus

Argemone

Anagallis

Artemisia

Aizoon maius

Acetum

Butyrum

Brasica syluestris

Bechion

Brion thalassion

Cassia

Cotyledon prima

Elatine

Ebulus

Faba

Ficus

Harundo

Hyoscyamus

Irinum

Laurus

Linum

Lupinum fatium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens palustris

Lapis

Melilotus Mādragoras

Naphtha

Ocymum

Ochra

Picea

Plat

INDEX

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| Platanus | Portulaca | Irinum | Lac |
| Pulegiū | Parthenion | Linum | Mastichinum |
| Polygonon mas | | Malua | Hordeum |
| Papauer erraticum | | Palma | Portulaca |
| Rosa | Rhus | Rosaceum | Rosa |
| Susinum | Sabina | Ruta | Salix |
| Sesamum | | Spartum | |
| Sonchos | Scordion | Vinum Surrentinum | |
| Symphytum | | Triticum | |
| Stratiotes aquaticus | | Et in verbo, Dysentericorum remedia. | |
| Triticum | Tribulus | INTERTRIGO vt tollatur. | |
| Vinacel | Xyris. | Vitex | Corium. |
| INGVINVM morbi remedia. | | ISCHIADICORUM remedia. | |
| Vide Genitalium. | | Asarum | Balsamum |
| INGENIVM promptum facientia. | | Cardamomum | |
| Ouum. | | Silurus | Finum |
| INSANIAM inducentia. | | Nasturtium | Thlaspi |
| Hyoscyamus | | Rhaponticum | |
| Strychnon hypnoticon | | Thymus | |
| Mandragoras. | | Ammonia cum | |
| INSANIENTIVM remedia. | | Leontopetalon | |
| Betonica | | Erythrodanum | |
| Helleborum nigrum. | | Ascyron | |
| INSOMNIA inducentia. | | Androsamum | |
| Vide, Somniferæ medicinæ. | | Chamæpitys | |
| INTESTINORVM remedia. | | Polemonia | |
| Agallochū | Anthemis | Ocymoides | |
| Cochleæ terrestres | | Aethiopis | |
| Hippuris | | Arction | |
| | | Chamæcissos | |
| | | Spartum | |
| | | Colocynthis | |
| | | Oxymeli | |
| | | Vinum | |

CVRATIVVS.

Vinum panacite Dioscorides libro 6. in
 salugo Adarces. præfat.
IUMENTIS con- **LACRYMA**
 traria. tiones emen-
 Gramen cilicum dantia.
 Nerion. Vide, dilacrymationes
IUMENTORVM emendantia.
 scabiem emen- **LACTIS** vberta
 dantia. tem facientia.
 Amurca Alysson Argemone Anethum
 Lupinum satium. Ampeloleuce
 Oleum piscinum. Cicer Circea
 Oleum lentiscinum. Echion Fœniculus
IUMENTORVM Halimos Hordeum
 vlcera emen- Lactuce Malua.
 dantia. Melanthion
 Oleum picinum Ocymum
 Alysson Sonchos Vitex.
 Thelypteris. **LACTIS** coagu-
LABIORVM scissu lati curatio.
L ræ remedia. Diosc. lib. 6. cap. 26.
 Adeps Lycium. **LASSITVDINVM**
 LAC coagulantia. remedia.
 Balsamum Ficus. Anethinum
 LAC extinguentia. Adeps Clymenon
 Cicuta. Laurinum
 LACRYMAS Ammoniacum sal
 trahentia. Lapis gagates
 Aerugo aurificum. Vinum chamælates.
LACERTAE mor- **LATERVM** morbi
 sus remedia. remedia.
 Portulaca Acorus Agallochum
 Seps, siue lacerta calchi Asphodelus
 dica in vino epota. Aristolochia tertia
LACRYMAE quæ Ampeloleuce
 perimunt. Balsamum

Brass

INDEX

| | | |
|------------------------|------------|----------------------|
| Brassica fatiua | Eruum | Galbanum |
| Bdellium | Melathion | Rhaphanus |
| Cyprinum | Finum | Sanguis leporinus |
| Centaurium maius | | Sisymbrium sylvestre |
| Gentiana | Galbanum | Spuma argenti |
| Hordeum | | Triticum cum aceto. |
| Leucacantha | Myrrha | LEPRAE remedia. |
| Naphtha | Phu | Allium |
| Panaces heraclion | | Anemone |
| Petroselinon | | Aristolochia |
| Prasium, siue marrubiū | | Acantha |
| Pseudobunion | | Anchusa |
| Ruta | Sagapenum | Acetum |
| Terebinthina | | Ampelos leuce |
| Thapsia | Vrtica | Halcyonium |
| Vinum cedrite | | Alumen |
| Vinum hyssopite | | Adarce |
| Vinum stichadite | | Buprestis |
| Vinum tragoriganite | | Brassica fatiua |
| Vinum aromatite | | Cochleæ terrestres |
| Vinum acorite | | Clematis |
| Vinum glycyrrhite. | | Fraxinus |
| LENDES necantia. | | Cucumis anguinus |
| Cedria | Mel | Helleborum nigrum |
| Myrica | Beta | Acrugo aurificum |
| Allium | | Ficus |
| Alumen | | Fel |
| LENTIGINIS ma- | | Hordeum |
| cula remedia. | | Iuniperus |
| Alysson | Halcyonium | Lolium |
| Aqua maris | | Lapathum |
| Ampeloleuce | | Lepidium |
| Brassica fatiua | | Myosotis |
| Bulbus esculentus | | Oleum oleastri |
| Balanus myrepica | | Oleum cicinum |
| Cinnamomum | | Olea Aethiopica |
| | | Oryza |
| | | Salamandra |
| | | Serum |
| | | Sinapi |
| | | Struthion |
| | | Scammonia |
| | | Sulphur |
| | | Terebinthina |
| | | Thapsia |
| | | Terra melia |

C V R A T I V V S.

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|
| Vlmus | Yrina | Piper | Struthion |
| Vitis sativa. | | Hedera | Cyclaminos |
| LEPORIS ma- | | Pancration | |
| rini remedia. | | Capparis | Lepidium |
| Fiber | Cornus | Agaricum | |
| Lapis ophites | | Rhaponticum | |
| Halcyonium | | Aristolochia tertia | |
| Chamaeleon niger | | Crocodilion | |
| Cicer | | Absynthium | |
| Cucumis anguinus | | Hyssopum | |
| Characias | | Tragoriganum | |
| Helleborum nigrum | | Pulegium | |
| Ficus | Glutinum | Dictamnus | |
| Lasercpitum | Olea | Sison | Anison |
| Pruna | | Smyrnion | |
| Rhaponticum | | Peucedanum | |
| Ruta | Sal | Sagapenum | |
| Vitis sativa | | Ammoniacum | |
| Vinum tethalassome- | | Viscum | Polium |
| num. | | Chamaedrys | Leucoion |
| LIENIS morbi | | Nymphæa | Asplenon |
| remedia. | | Hemionitis | |
| Iris Illyrica | | Erythrodanum | |
| Nardum Gallicum | | Vettonica | |
| Myrice | Acorus | Lonchitis altera | |
| Canthamum | | Polemonia | |
| Oleum amygdalinum | | Clymenon | Xyris |
| Lycium | Vitex | Anchusa | Vrtica |
| Cotonca | Linum | Adiantum | Pteris |
| Ficus Aegyptia | | Ampelos leuce & agria | |
| Lac humanum | | Aqua maris | |
| Lupinum sativum | | Vitis sativa | |
| Rhaphanus | | Acetum scilliticum | |
| Lapathum | Sinapi | Vinum panacite | |
| Brassica sativa | | Ferrum | Corallium |
| Nasturtium | | Lapis Asius | Coris |
| | | | Her |

INDEX

Hernol. Cor. cap. 124.

LINGVAE vtilia.

Olea Aethiopica.

LIPPITVDI-

nis remedia.

Ebenus.

Lapis hamatites

Plantago Spongiae.

LIQVORES qui

perimunt.

Dioscorides libro 6. in
præfat.

LIVOREM emen-
dantia.

Allium Aqua maris.

Iuglans

Lana succida

Rhaponticum

Sinapi

Lupinum sativum

Thapsia.

LOCORVM mulic-
brium remedia.

Anethum Althæa

Fœnogræcum

Linum Leucoion

Trifolium

LVMBRICOS

necantia.

Coriandri semen

Absynthium seriphium

Brassica sativa

Chamaeleon albus

Calamintha

Myrrha Portulaca

Oleum cicinum

Thelypteris

Lupinum sativum.

LVMBORVM affe-
ctuum remedia.

Asparagus Capparis

Chamaepeuce

Echion Harundo

Leucacantha

Papaver cornutum

Sampsuchinum

Smyrnon.

LVPOS necantia.

Aconitum pardalian-
ches

Aconitum alterum

Apocynum.

LVSCIOSORVM

remedia.

Fel animalium

Sanguis.

LVXATIS vtilia.

Asparagus Acantha

Aphronitrum

Bulbus esculentus

Fimum

Harundo

Heliotropion

Iuglans Lilium

Narcissus

Polypodion

Vitex

Vrtica

Vitis sativa

Vinum pissite

Sampsuchus

Sal.

MAC

CVRATIVVS.

MACIEI corporis remedia. Apium Asclepias

Erinaceus. Hemerocallis

Althæa

MACVLAS tol- Chamæpitys

lentia. Epimædion

Oleum balaninum. Cici

MACVLAS rube- Hyoscyamus

fcere facientia. Vinacci

Crocodilea, id est, Cro- Aqua maris

codili terrestris simū. Fax vini

MALIS medicamen- Terra samia.

tis contraria. **M**AMMAE virginum
ne crescant.

Adeps

Ruta

Cicuta

Cotis.

Pentaphyllon

Antirrhinon.

MASCVLVM

filium gene-
rantia.

MALORVM quæ
serpunt remedia.

Acacia

Plantago

Cratægogonos

Phyllon

Orchis.

Polygonon mas

Helxine

Cicuta

MATRICIS mor-
bi remedia.

trychnum satium

Aizoon maius

Colymbades oliuæ

abina.

Malua

Oleum balaninum

Pæonia.

MAMMARVM

morbi remedia.

MAXILLARVM

doloris remedia.

farum

Cotonea

Ceruinum cornu.

juglans

Thus

MEATVS ape-
rientia.

rysimon

Ochra

Allium

Cyperus.

ens

Eruum

MECONIO

contraria.

sphodelus

mentha

Passum & protropon vi-
num

cammonia

brandaracha

riticum

Acetum

Oxymel.

accharis

MELICERIDVM

morbi remedia.

T

INDEX

| | | |
|--------------------|---------------------|--------|
| Serum | Chondrylla | |
| Parthenion | Lactuca sylvestris | |
| Helleborum nigrum | Caucalis | Erucas |
| Epithymum | Ocymum | Cepe |
| Acetum scilliticum | Orobanch | Allium |
| Amonum | Porrum | |
| Melilotus. | Ampeloprasum | |
| MENSTRA | Nasturtium | |
| prouocantia. | Thlaspi | |
| Iris Illyrica | Struthion | |
| Meu | Cyclamino | |
| Asarum | Asphodelus | |
| Cinnamomum | Capparis | |
| Costum | Anemone | |
| Iuncus odoratus | Hedera | |
| Balsamum | Agaricum | |
| Canchamon | Aristolochia tertia | |
| Helenium | Centaureum maius & | |
| Sampfuchinum | minus | |
| Amaracinum | Eryngion | |
| Abrotonum | Absinthium | |
| Styrax | Origanum | |
| Cedrides | Tragoriganum | |
| Tilia | Pulegium | |
| Lycium | Elelisphacos | |
| Vitex | Calamintha | |
| Olea sylvestris | Thymus | |
| Lotus | Serpyllum | |
| Amygdala amara | Sampfuchus | |
| Ficus | Baccharis | Ruta |
| Cochlea terrestres | Panaces heracleon | |
| Fiber | Ligusticum | |
| Oesypus | Seseli Malsiliense | |
| Cicer | Tordylon | |
| Lapathum | Sison | Anisum |
| Brassica sativa | Forniculus | |

CVRATIVVS.

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| Orcoselinum | | Heliotropien maius |
| Petroselinum | | Vinum scilliticum |
| Hippomarathrum | | Vinum absynthite |
| Hipposelinum | | Vinum hyssopite |
| Smyrnion | | Vinum aromatice |
| Daucus | Libanotis | Vinum daucite |
| Melanthion | | Vinum panacite |
| Laserpitium | | Vinum helleborite |
| Sagapenon | | Vinum dictamnite |
| Euphorbion | | Staphylinus. |
| Clynopodium | | MENSTRVA |
| Chamædrys | Lilium | sistentia. |
| Melissophyllum | | Lentisci succus. |
| Prasium | Stachys | Myrica |
| Trifolium | | Oxyacanthios |
| Polium | Seordion | Thius |
| Artemisia | | Palma |
| Leucoion | | Malum punicum |
| Anthemis | Præonia | Myrtus |
| Erythrodanum | | Lepus terrestris |
| Anagyris | | Fuligo butyri. |
| Alisma | Coris | Coagulum |
| Hypericon | | Sanguis |
| Cestron | Medion | Acinos |
| Xyphion | Tragion | Acantha Arabica |
| Heliochrysos | | Hieracium maius |
| Mandragoras | | Nymphæa |
| Vrtica | Myrtus | Præonia |
| Adiantum | | Limonion |
| Myrtus fyluestris | | Medion |
| Laurus Alexandrina | | Sideritis achilleos |
| Daphnoides | | Rubus |
| Chamædaphne | | Idæa radix |
| Helleborus niger & al- | | Tragos |
| bus | | Lyfimachia |
| Ampelos melana. | | Oxyſchænos |
| | | Heliochrysos |
| | | Papauer ſatiuum |
| | | Mandragora |
| | | Aizon maius |

T

INDEX

Aerugo ferri
Vinum rhenitice
Fax vini
Lapis Aſius
Morochthus
Hamatites
Oſtracites
Terra ſamia.

MENTEM com-
mouentia.

Coriandrum
Orcoselinum

METALLA quæ
perimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

MOLLIENTES
medicinæ.

Vide, Demollientes.

MORBI regii
medicinæ.

Vide, Regii morbi.

MORBORVM quæ
ſerpunt remedia.

Vide, Malorum quæ
ſerpunt.

MVLIERVVM deſi-
derio quo ſatiſſiat.

Acorum

Picea

Pinus

Adeps bubulus.

MVLIERVVM
infirmorum
remedia.

Amomum

Balaſamum

Suſinum

Sefeli Maſſilienſe.

MVRES necantia.

Chamaeleon albus
Aconitū pardalianches
Helleborus candidus
Hermol. Cor. cap. 23.

MVRIS aranei mor-
ſus remedia.

Mus araneus

Abſynthium

Chryſogonon

Dioſc. lib. 6. cap. 62.

MVRIS morſus
remedia.

Groſſi Allium.

MVSCAS necantia.

Lyſimachia.

MYRMECIAS
tollentia.

Ficus.

NARIVM morbi
remedia.

Malum punicum.

NAVSEAM diſcu-
tientia.

Tragoriganum

Pulegium

Fœniculus.

NAVSEAM mo-
mentia.

Laurinum

Suſinum.

NERVORVM mor-
bi remedia.

Oleum ſicyonium

Oleum clæomeli

Laur

CVRATIVVS.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Laurinum | NODIS vtilia. |
| Cyprinum | Bdellium. |
| Gleucinum | NOMARVM mor- |
| Amaracinum | bos curantia. |
| Metopium | Bdellium Asparagus |
| Lixiua ex ficu | Sabina Papyrus |
| Erinaceus terrestris | Cistos |
| Cochleæ terrestres | Olea syluestris Olca |
| Vipera | Oliuæ colymbades |
| Vermes terreni | Malum punicum |
| Lac humanum | Smarides |
| Triticum | Poterium Fel animalium |
| Peucedanum | Vrina Lilium |
| Laserpitium | Plantago Arisaron |
| Lilium | Satyrium Asphodelus |
| Melissophyllon | Maron Prasium |
| Althæa | Coccus Orchis scrapias |
| Erigeron | Cacalia Britannica |
| Narcissus | Peristereon supinus |
| Hippophæston | Galiopsis |
| Vini qualitas | Vua œnanthe |
| Aqua maris | Omphacinum |
| Acetum scilliticum | Acetum Oxalme |
| Vinum stichadite | Squama æris |
| Vinum thymite | Acrugo aurificum |
| Pax vini | Fiber. Chalcites lapis |
| NERVOS ludentia. | Flos salis |
| Malus | Hedera Lapis ostracites. |
| Vinum | NVBECVLAS |
| Vinum gypsatum | oculorum emen- |
| Mefagite. | dantia. |
| NERVOS tollentia. | Vide, Oculorum reme- |
| Mel sardoum. | dia. |
| NIGREDINES | NYCTILOPARVM |
| abstergit | morbi remedia. |
| Sabina. | Vide, Luscioforum re- |

INDEX

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| medla. | Oleum vulgare |
| O B M V T E S C E R E | Elæomeli |
| facientia. | Oleum amygdalinum |
| Mandragora. | Myrrha Thus |
| O C V L O R V M epi- | Fuligo thuris & resinæ |
| phoræ remedia. | & picis |
| Asarum | Picea Cupressus |
| Malabathrum | Sabina Platanus |
| Cotonca Sefamum | Populus alba |
| Lens Cucurbita | Myrice Acalis |
| Anemone | Ebenus Rosa |
| Argemone | Lycium Acacia |
| Myosotis | Salix |
| Gentiana | Olea syluestris |
| Baccharis Ruta | Olea |
| Apium Hemerocallis | Olea Aethiopica |
| Rubus idæa | Palma Thebaica |
| Papauer sativum | Cytinus Myrtus |
| Phlomidis | Cerasia |
| Aster atticus | Halicacabus Mituli |
| Viola purpurea | Cochleæ terrestres |
| Cici. | Scorpius marinus |
| O C V L I S contraria. | Vipera |
| Lactuca | Senecta serpentis |
| Porrum Ocymum | Sepia |
| Coriandrum | Mullus piscis |
| Anethum. | Ouum Hirundines |
| O C V L O R V M mor- | Ceruinum cornu |
| borum remedia. | Lac humanum |
| Acorum Cassia | Costus |
| Cinnamomum | Fuligo butyri |
| Aniomum | Lana vsta Ocsypus |
| Balsamum | Fel animalium |
| Canchamum | Sanguis |
| Crocum | Vrina Mel |
| Crocomagma | Amylum |
| | Faba |

CVRATIVVS.

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| Faba | Lens | nutum |
| Brassica fatiua | | Hyoscyamus |
| Portulaca | | Mandragoras |
| Seris | Pepo | Aconitum pardalian- |
| Lactuca syluestris | | ches |
| Ocymum | Cape | Aizoon maius |
| Sinapi | Piper | Helleborus albus |
| Zingiber | | Cici Chamæfyce |
| Cyclaminos | | Capnos |
| Asphodelus | | Lotus fatiua |
| Dracunculus maior | | Sesamoides maius |
| Dracunculus minor | | Aes vstum |
| Argemone | | Vua œnanthe |
| Anagallis | | Vinum Surrentinum |
| Chelidonium maius | | Acetum scilliticum |
| Othonna | | Cadmia |
| Centaurium minus | | Squama æris |
| Tragacantha | Aloë | Acrugo aurificum |
| Abfynthium | | Plumbum clotum |
| Abrotonum | | Stimmi Cinnabaris |
| Ruta | Sampfuchus | Chalcitis lapis |
| Melilotus | | Alumen Pumex |
| Ruta Galatica, siue syl- | | Sal Flos salis |
| uestris | | Fæx vini Spongia |
| Panaces heracleon | | Corallium |
| Fœniculus | | Pyrites |
| Libanotis | | Hæmatites |
| Sagapenon | | Galactites Thyites |
| Ammoniacum | | Morochthus |
| Sarcocolla | | Sapphirus |
| Chamædrys | | Geodes |
| Prasium | Steebe | Samius. |
| Tribulus | Erinos | OPISTHOTONI |
| Gramen Parnasium | | corum, id est, cerui- |
| Rubus | Elatine | cis rigore laboran- |
| Papauer fatium, & cor | | tium remedia. |

INDEX

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Acanthion | | id est, difficulter spi- |
| Eryngion | | rantibus remedia. |
| Laferpitium | | Helenium |
| Sagapenon | | Myrrha |
| Satyriion | Coris. | Cupressus |
| | O P I I remedia. | Daphnides |
| sal | | Cotonea |
| Diosc. lib. 6. cap. 17. | | Struthion |
| | O R I S halitus re- | Cyclaminos |
| | media. | Dracunculus maior |
| Vide, Halitus oris re- | | Abrotonum |
| media. | | Hyssopus |
| | O R I S vlcerum re- | Calamintha |
| | media. | Thymus |
| Cyperus | Aspalathus | Baccharis |
| Fuligo picis | Cyprus | Seleli Mafsiliense |
| Tilia | Acacia | Hieracium maius |
| Olea fyluestris | | Smyrnion |
| Castanea | | Sphondylium |
| Malum punicum | | Peucedanum |
| Mæna | | Melanthion |
| Lac schiston | Butyrū | Ammoniacum |
| Plantago | Aloë | Melissophyllon |
| Origanum | | Bechion |
| Leucoion | | Botrys |
| Orchis serapias | | Anemone |
| Anthemis | | Hippuris |
| Periclymenon | | Vrtica |
| Rubus | | Elaterium |
| Staphis agria | | Hippophæstion |
| Vua ænanthe | | Vinum panacite. |
| Omphacium | | O S S I V M squamas |
| Acetum scilliticum | | extrahentia. |
| Sandaracha | | Aristolochia |
| Alumen | sal. | Ampelos leuce. |
| ORTHOPNOICIS | | O S S A fracta conso- |
| | | lidan |

CVRATIVVS.

lidantia.

Vetonica Xyris.

OVES necantia.

Nerion,

OXYPARA ingre-
dientia.

Ligusticum

Caros

Anethum.

PALPEBRA-
rum remedia.

Vnguentum rosaceum

Mastiche

Resina

Fuligo picis

Grossi

Lixiua ex ficu

Vrina

Alumen

Chondrylla

Vide supra, Genarum
morbi remedia.

PALPEBRARVM
pili euulsi ne rena-
scantur.

Tellinae

Sanguis

Capnos.

PALLIDVM colo-
rem facientia.

Hieracium minus

Aloc.

PANORVM remedia

Atriplex

Acetum

Bulbus esculentus

Coriandrum cum faba
fracta

Coniza

Ficus

Galiopsis

Olca sylvestris

Helxine

Ocymastrum

Ammoniacum

Isatis

Plantago

Xyphion.

PANTHERAS ne-
cantia.

Aconitum pardalian-
ches.

PAPAVERIS cu-
ratio.

Dioscor. lib. 6. cap. 17.
& 18.

PAPVLARVM
remedia.

Vrina

Flos aris.

PARALYTICO-
rum remedia.

Capparis

Erythrodanum

Colocynthis

Ampelos melana

Vinum scilliticum

Aphronitrum.

PARTVS necantia.

Daphnides

Coagulum

Adeps hircinus & ouil-
lus & bubulus

Nasturtium

Thlaspi

Ruta

Hedysaron

Helleborus albus &
niger

Colocynthis

Ampelos leuce

T 5

INDEX

Vinum phthorium.
PARTVS quibus
iuvatur.

Iris Illyrica
Cinnamomum
Balsamum
Vnguentum telinum
Irinum
Amaracinum
Myrrha
Picea
Olea Aethiopica
Oesypum
Fimum
Cicer
Lupinum sativum
Allium
Cyclaminos
Dracunculus maior
Dracunculus minor
Hedera
Gentiana
Centaurium maius
Centaurium minus
Pulegium
Elelisphacos
Calamintha
Baccharis
Panaces heracleon
Staphylinus
Thynni falsi caro
Seseli Mafsiliense
Smyrnion
Peucedanum
Sagapenum
Galbanum

Fiber

Clinopodium
Ammoniacum
Chamaedrys
Prasium
Bechion
Artemisia
Coniza
Leucoion
Onosma
Anthemis
Anchusa
Mandragoras
Laurus Alexandrina
Ampelos leuce
Heliotropium maius
Vinum panacite
Vinum helleborite
Alumen
Sulphur
Lapis laevis
Aetites
Samius.

PARONYCHIA-
rum, id est, vnguium
morborum remedia.

Thus cum melle
Olea sylvestris
Myrtus
Ebur

Paronychia
Vua cenanthe
Aerugo ferri

PAROTIDVM, id
est, aurium apostema
tum remedia.

Ficus

Fium

CURATIVVS.

| | | |
|------------------------|--------|----------------------|
| Simum | | Terebinthina |
| Linum | Faba | Iuniperus |
| Lapathum | | Ficus |
| Plantago | | Pomum |
| Rysimon | | Nasturtium |
| Riscum | Althæa | Piper |
| Syllium | | Chelidonium minus |
| Trychnon satium | | Rhaponticum |
| Vrtica | | Stichas |
| Galioipsis | | Thymus |
| Terra cimolia. | | Ruta |
| in verbo, Aurium | | Libanotis |
| medicina. | | Sagapenum |
| PA V E S C E N- | | Ammoniacum |
| tium remedia. | | Scordion |
| inum | | Bechion |
| Melicratum | | Vrtica |
| tydromel. | | Ifopyrum |
| PECORIS scabiem | | Vinum cedrite |
| emendantia. | | Vinum aromatite |
| bride, Iumentorum sca- | | Vinum nectarite |
| biem. | | Vinum daucite. |
| PECORI vtilia. | | PEDICVLOS ne- |
| diantum. | | cantia. |
| PECVS necantia. | | Allium |
| Merion | | Alumen |
| conitum lycoctonon. | | Mel |
| PECVS mortuum | | Cedria. |
| extrahentia. | | PEDVM qui a frige |
| ristolochia. | | re alserunt remedia. |
| PECTORIS morbi | | Cyclaminos. |
| remedia. | | PEDVM rimarum |
| corus | Meu | remedia. |
| ostum | Myrrha | Scilla |
| uncus odoratus | | PERFRICTIO- |
| ityides | | nis medicina. |
| | | Iris |

INDEX

Iris Illyrica
 Cyperus
 Balsamum
 Oleum
 Ficus Aegyptia
 Vinum stichadite.
 PERCVSSIS à fe-
 ris vtilia.
 Balsamum
 Paliurus
 Mustela
 Ouum
 Argemone
 Hippomarathrum
 Coagulum
 Sanguis
 Piper
 Elaphoboscon
 Phyllitis.
 PERNIONVM re-
 media.
 Vnguentum melinum
 & telinum
 Thus cum suillo adipe
 Acacia
 Ficus
 Cancrī
 Pulmo marinus
 Vngues asini
 Adeps
 Eruum
 Rapa sativa
 Beta
 Cyclaminos
 Dracunculus maior
 Dracunculus minor

Asphodelus
 Scilla
 Batrachion
 Arction
 Cotyledon prima
 Aqua maris
 Alumen.
 PERIPNEVMO-
 niacorum remedia.
 Abrotonum
 Tragoriganum.
 PESTILENTIAE
 contraria.
 Myrrhis, id est celifo-
 lium.
 Vinum omphacite.
 PHALANGIO-
 rū ictus remedia.
 Cinnamomum
 Terebinthus
 Myrica
 Myrtus
 Lixivia ex ficu
 Cancrī
 Malua
 Asparagus
 Lactuca sylvestris
 Hedera
 Abrotonum
 Daucus
 Sphondylium
 Aparine
 Phalangium
 Myrrhis
 Aqua maris
 Diosc. lib. 8. cap. 58.

Phag

CVRATIVVS.

| | |
|-----------------------|--------------------|
| HAGEDAENAE | Hedera |
| morbi remedia. | Staphis agria |
| Fimum | Sandaracha. |
| racunculus minor | PHTHISICORVM |
| statis | remedia. |
| namaleon niger | Pix |
| anaces | Adeps |
| aphyllinus | Porrum |
| stafites | Agaricum |
| amaracias | Rhaponticum |
| onpelos leuce | Acantha |
| inum | Prasium |
| retum | Cestrum |
| numen | Lapis Afius. |
| Flos salis. | PILI genarum ne |
| PHARICO veneno | defluant. |
| contraria. | Spica nardi |
| inum Albanum | Cochleæ terrestres |
| osc. lib. 6. cap. 19. | Oesypus |
| PHLEGMATIS | Chondrylla |
| contraria. | Armenius lapis. |
| antago. | PILI palpebrarum |
| PHRENETICO- | euulsi ne rena- |
| rum remedia. | scantur. |
| rocium | Tellinae |
| tex | Sanguis |
| baragus | Capnos. |
| pyllum | PILI alarum euulsi |
| stniza tertia | ne renascantur. |
| notuioion. | Fabæ. |
| PHPTHIRIASIS, si | PITVITAE crassæ |
| ue pedicularis mor | remedia. |
| bi remedia. | Iris Illyrica |
| signenta gymnasto- | Sesamum |
| inum | Hyssopus |
| exrica | Thymoxalme. |

INDEX

PITVITAE reme-
dia.

Cinnamomum

Seyrax

Vimus

Auellana

Ouum

Serum

Vrina

Hordeum

Linum

Faba

Lupinum satium

Agriorhaphanus

Portulaca

Cucurbita

Cæpa

Sinapi

Piper

Cyclaminos

Dracunculus maior

Capparis

Anemone

Anagallis

Centaurium minus

Tragacantha

Hysopus

Origanus

Tragoriganum

Pulegium

Thymus

Ruta

Pyrethrum

Sphondylium

Melanthium

Parthenion

Naphtha

Clematis

Sideritis achilleos

Hyoscyamus

Helleborum nigrum

Sesamoides maius

Cucumis

Elaterium

Staphis agria

Thapsia

Hippophaës

Hippophaëston

Cici

Characia

Lathyrus

Scammonia

Thymelæa

Ebulus

Apios

Colocynthis

Epithymon

Empetron

Ampelos leuce

Polypodion

Heliotropium maius

Vua passa

Aqua maris

Vinum rhetinite

Vinum aromatice

Vinum mandragorite

Vinum scammonite

Sulphur

Peplus

PITYOCAMPA-

rum curatio

Diosc. lib. 6. cap. 2.

PLAGARVM vibi-

ces emendantia.

Susnon.

PLAN

CURATIVVS.

PLANTAE quæ per-
rimunt

Diosc. lib. 6. in præfat.

PLEVRETICO-
rum remedia.

Staphylinus

Lascepitium

Aethiopsis.

PODAGRÆ mor-
bi remedia.

Amomum

Naphtha

Populus nigra

Amurca.

Salix

Ficus

Cochleæ terrestres

Mustela

Marinus pulmo

Lac humanum

Adipum medicinae

Sanguis scilicet men-
struus

Fimum

Hordeum

Lens

Rapa sativa

Brassica sativa

Seris

Cucurbita

Aros

Asphodelus

Bulbus esculentus

Pulegium

Panaces Heracleon

Libanotis

Scordion

Leucoion

Androsaces

Helxine

Papaver sativum

Hyoscyamus

Lens palustris

Aizoon maius

Bryon thalassion

Phycos marinus

Cucumis anguinus

Balanus myrepica

Ebulus

Heliotropium maius

Vua passa

Acetum. Ferrum

Sulphur. Sal

Lapis Asius

Lapis gagates

Testa siue terræ fornacum.

POLYPI morbi re-
media.

Dracunculus maior

Dracunculus minor.

PRESTERIS ser-
pentis morsus re-
media.

Omotarichos

Rubus.

PRAEPUTIO-

rum morbi re-
media.

Aloe.

PRAECORDIO-
rum remedia.

Scor

INDEX

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Scordion | Lepus marinus |
| Vinum thymite | Hedera |
| Vinum daucite. | Ampelos leuce |
| PRAECIPIT A- | Dryopteris |
| tis ex alto vtilia. | Arsenicum. |
| Iris Illyrica | PSORAE morbi |
| Vitex | remedia. |
| Asparagus | Cardamomum |
| Anisum | Oleum amygdalinum |
| Cannabis satiua. | Lycium |
| PROFLVVII ge- | Olea |
| niturae remedia. | Palma elate |
| Vide Geniturae proflu- | Ficus |
| uii in somno. | Erinaceus marinus |
| PRVRIGINEM | Cicer |
| facientia. | Lupinum satium |
| Scolopendra | Batrachion |
| Ephemeron | Chelidonium minus |
| Opium. | Origanum |
| PRVRIGINEM | Pentaphyllon |
| emendantia. | Staphis agria |
| Vrina | Balanus myrepica |
| Lapathum | Ampelos leuce |
| Aloe | Vitis satiua |
| Origanum | Aqua maris |
| Pulegium | Sal. |
| Elelisphacos | PSYLLII curatio. |
| Melilotus | Diosc. lib. 6. cap. 10. |
| Balanus myrepica | PTERYGII morbi |
| Acetum | remedia. |
| Alumen | Acacia |
| Sulphur | Rhus |
| Sal. | Malum punicum |
| PSILOTHRVM, | Myrtus |
| siue vnguentum de- | Ficus |
| pilatorium. | Glycyrrhiza |
| | Aloe |

Pras

CVRATIVVS.

Praſium
 Pentaphyllon
 Characias
 Ampelos leuce
 Zua cœnanthe
 acetum
 Alumen
 Sal
 Ferri rubigo.
PVBERTAS ne
 erumpat.
 Hyacinthus.
PVLMONIS mor-
 bi remedia.
 Puncus odoratus
 Balsamum
 Cedria
 Amygdalus amara
 Ficus
 Lac
 Pulegium
 Ruta
 Sagapenum
 Symphyton
 Pentaphyllon
 Chryſocome
 Vrtica
 Thapſia
 Melicratum
 Vinum hyſſopite
 Vinum aromatite.
PVLICES necantia.
 Vnguentum telinum
 Crocinum
 Butyrum.
PVTREDINVM ge

nitalium remedia.

Aspalathus.

PVTREDINES

purgantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QVADRVPED-
 dum ſcabiem
 emēdantia.

Vide Iumentorum ſca-
 biem.

QVARTANAE fe-
 bris remedia.

Vide, Febris quartanæ
 remedia.

RADICES quæ pe-
 rimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

RAVCEDINIS re-
 media.

Tragacantha.

REDVVIAS ſa-
 nantia.

Ferri rubigo.

REFRIGERAN-
 tes medicina.

Vnguentum melinum

Cupreſſus

Rhodiſes

Rofa

Acacia

Ouum

Sonchos

Seris

INDEX

Lactuca
 Caros
 Coriandrum
 Hieracium maius
 Polygonum duplex
 Clymenon
 Periclymenon
 Helxine
 Papauer satium
 Psyllium
 Cicuta
 Lens palustris
 Aizoon duplex
 Erigeron
 Phacos thalassion
 Potamogeton
 Cytisus
 Ebulus
 Acetum
 Omphacomeli
 Pompholyx
 Plumbum clotum
 Spuma argenti
 Cerussa
 Corallium
 Terra
 Lapis samius
 Terra ampelitis.

REGII morbi remedia.

Nardi spica
 Schistos
 Ceruinum cornu
 Fimum
 Cicer
 Lapathum

Atriplex
 Asparagus
 Erysimon
 Scilla
 Chelidonium
 Aloe
 Absynthium
 Origanum
 Hippomarathrum
 Libanotis
 Sphondylium
 Laserpitium
 Prasium
 Scordion
 Asplenon
 Anthemis
 Paonia
 Erythrodanum
 Chamapitys
 Pentaphyllum
 Hyacinthus
 Halicacabus
 Chamacissos
 Osyris
 Myrtus sylvestris
 Elaterium
 Vinum chamaedryte
 Vinum calaminthite
 Vinum nardite
 Sulphur.

RENV M doloris remedia.

Amygdala amara
 Asparagus
 Anagallis
 Agaricus

Anth

C V R A T I V V S.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Anthyllis | Vua passa |
| Anchusa | Vinum |
| Alcyonium | Vinum cydonite |
| Cardamomum | Vinum holosanthinum |
| Calamus odoratus | Erinaceus terrestris |
| Cicer | Casia Fœniculus |
| Cinnamomum | Vinum absynthite |
| Chamæpitys | Vinum nardite |
| Passum | Vinum aromatite |
| Glycyrrhiza | Oleum balaninum. |
| Uncus odoratus | R H A G A D V M |
| Laurinum | remedia. |
| ac | Pix |
| Lotus fatiua | Lycium |
| Meu | Vitex |
| Pistacia | Cancr. |
| Nardus Gallica | R H E V M A T I- |
| Nuclei pini | smis vtilia. |
| Oleum amygdalarum | Acetum |
| Palma elate | Cupressus |
| Portulaca | Daphnoides |
| Plantago | Ficus |
| Porrum | Fæx vini |
| Petroscelinum | Macer |
| Peucedanum | Oleum olcastr |
| Pæonia | Ouum |
| Rhaponticum | Persica |
| Saccharum | Portulaca |
| Candyx | Plantago |
| Myrnion | Staphis agria |
| Symphyton | Triticum |
| Stratiotes aquaticus | Vini qualitas |
| Fragacantha | Vinum labruscæ |
| Cordylon | Vinum ex pyris |
| Vrina | Vinum myrtite. |
| Vetonica | R I C I N O S necantia. |

INDEX

| | |
|----------------------|---------------------|
| Cedria. | Fimuni |
| RIGORES seu hor- | Dracunculus maior |
| rores febrium ex- | Dracunculus minor |
| cutientia. | Asphodelus |
| Gleucinum | Bulbus esculentus |
| Piper | Capparis |
| Panaces heracleon | Rhaponticum |
| Staphylinus | Gentiana |
| Vinum cedrite | Aristolochia |
| Pyrethrum. | Centaurium |
| RIMARVM sedis | Acantha |
| remedia. | Leucacantha |
| Vide, Sedis rimarum. | Abrotonum |
| ROSIONIS re- | Origanum |
| media. | Calamintha |
| Lac schiston. | Serpyllum |
| Pæonia. | Baccharis |
| RVCTVM mouëtia. | Panaces heracleon |
| Mastiche | Libanotis |
| Rhaphanus | Laserpitium |
| Anethum | Sagapenum |
| Smyrnion | Galbanum |
| Vinum daucite. | Polycnemom |
| RVPTORVM re- | Clinopodium |
| media. | Althæa |
| Acorus | Cestron |
| Cardamomum | Symphyton |
| Afarum | Holosteum |
| Calamus odoratus | Xyris |
| Helenium | Hippuris |
| Bdellium | Heliochryson |
| Iuniperus | phlomidis |
| Cedrides | Ampelos leuce |
| Halimos | Vinum daucite |
| Lixiua ex ficu | Vinum tragoriganite |
| Fel | Vinum panacite |

Lapis

CVRATIVVS.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lapis schistos. | Amylum |
| S AGITTAS infixas | Portulaca |
| extrahentia. | Plantago |
| Vide, Spicula infixa. | Porrum |
| SALIVAM cuo- | Erysimon |
| cantia- | Agaricum |
| Pyrethrum. | Aloe |
| SALAMANDRAE | Rhaponticum |
| veneni remedia. | Centaurium |
| Diosc. lib. 6. cap. 4. | Acantha leuce & Ara- |
| S ANGVINEM ex- | bica |
| creantibus vtilia. | Ferula |
| Iuncus odoratus | Althæa |
| Aspalathus | Cestron |
| Thus in potu datum | Lysimachia |
| Lentiscus | Symphytum |
| Mastiche potu data | Polygonon mas |
| Naphtha | Symphytum alterum |
| Cupressus | Clymenon |
| Macer | Aethiopis |
| Myrica | Ifopyrum |
| Hypocistis | Adiantum |
| Rosa | Vitis sativa |
| Lycium | Vua |
| Salix | Omphacium |
| Quercus | Vinum phœnicite |
| Palma | Corallium |
| Malum punicum | Lapis hæmatites |
| Myrtus | Terra samia. |
| Cichorium | S ANGVINEM si- |
| Amygdalus amara | stentia. |
| Ouum | Thus |
| Cervinum cornu | Cupressus |
| Fimum | Galla |
| Coagulum | Persea |
| Triticum | Cochleæ terrestres |

INDEX

Rana
 Araneus
 Ovum
 Coagulum
 Sanguis
 Finum
 Faba
 Plantago
 Porrum
 Isatis
 Elelisphacos
 Mentha
 Serpyllum
 Ruta
 Cyminum satium
 Stoebe
 Ferula
 Clymenon
 Hippuris
 Sideritis achilleos
 Pentaphyllon
 Phoenix herba
 Astragalus
 Lichen in petris
 Idæa radix
 Gallion
 Stratiotes terrestis
 Vicia cenanthe
 Acetum
 Vinum terebinthinum
 Plumbum elotum
 Stimmi
 Cinnabaris
 Alumen
 Sulphur
 Spongia

Gypsum.
 SANGVINEM co-
 cretum discutientia.
 Lixiua ex ficu
 Thymus
 Heliochryson.
 SANGVINEM per
 vrinam expellentia.
 Erum
 Cantharides
 Ammoniacum.
 SANGVINEM per
 nares expellentia.
 Crocodilium.
 SANGVINEM per
 vrinam reddentium
 remedia.
 Cyminum sylvestre.
 SANGVISUGAS
 necantia.
 Oxalme
 Diosc. lib. 6. cap. 32.
 SANDARACHAE
 curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 29.
 SARDONIAE
 curatio.
 Diosc. lib. 7. cap. 14.
 SCABIEM iumento-
 rum emendantia.
 Vide, Iumentorum sca-
 biem.
 SCABIEI morbi
 remedia.
 Argemone prima
 Chamæleon niger

Hel

C V R A T I V V S.

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| Helleborus niger | | Sampfuchum |
| Oesyfum | Sal | Hieracium maius |
| Oleum olcastri | | Delphinion |
| Sinapi | | Laserpitium |
| Sulphur | | Attractilis |
| Vnguentum melinum. | | Lychnis vtraque |
| SCOLOPENDRAE | | Millefolium |
| morsus remedia. | | Phalangium |
| Grossi | | Polemonia |
| Scolopendra | | Chamaefyce |
| Asphodelus | | Heliotropium |
| Sal. | | Scorpioides |
| Diosc. lib. 6. cap. 59. | | Aqua maris |
| SCORPIONIS ictus | | Vinū tethalassomenum |
| remedia. | | Vinum cydonite |
| Cyperus | | Sulphur |
| Amomum | | Sal |
| Cardamomum | | Lapis sapphirus. |
| Cinnamomum | | Diosc. lib. 6. cap. 60. |
| Daphnoides | | SCORPIONES ne- |
| Myrtus | | cantia. |
| Ficus | | Cancr. |
| Cancr | | SCORPIONIS ma- |
| Scorpius terrestris | | rini ictus remedia. |
| Smarides | | Vrina |
| Mullus piscis | | Asphodelus |
| Locustæ | | Plumbum syncerum & |
| Lacerta | | crematum |
| Mures domestici | | Sulphur. |
| Fimum | | Diosc. lib. 8. cap. 61. |
| Lapathum | | SCORPIONES tor- |
| Sonchos | | pefacientia. |
| Seris | | Delphinion |
| Lactuca sylvestris | | Lychnis sylvestris |
| Ocyinum | | Lens palustris. |
| Abrotonum | | SECUNDINAS |

INDEX

| | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| trahentia. | | media. |
| Balsamum | | Thus |
| Sampsuchinum | | Lentiscus |
| Abrotonum | | Pix |
| Picea | Schistos | Amurca |
| Fiber | | Malum punicum |
| Iecur mergi | | Myrtus |
| Linum | | Canceri |
| Aristolochia tertia | | Ouum |
| Thymus | | Ocsypum |
| Pulegium | | Adeps |
| Prasium | | Lens |
| Stachys | | Malua |
| Artemisia | | Althæa |
| Oenanthe | | Portulaca |
| Hemerocallis | | Sonchos |
| Erythrodanum | | Anagallis |
| Anagyris | | Melilotus |
| Myrtus | | Laserpitium |
| Adiantum | | Aster Atticus |
| Ampelos leuce | | Viola purpurea |
| Vinum dictamnite. | | Cucumis anguius |
| SEDIS rimarum | | Colocynthis |
| remedia. | | Acetum |
| Strigmenta balnearum | | Oxalnic |
| Meu | Aloe | Vinum terebinthinum |
| Dipsacos | | Flos æris |
| Leucoion. | | Plumbum elotum. |
| SEDIS inflammatio- | | SEMINA quæ |
| nis remedia. | | perimunt. |
| Oleum cicinum | | Diosc. lib. 6. in præfat. |
| Amaracinum | | SENSIBVS nocetia. |
| Lens | Libanotis | Vinum annosum. |
| Symphyton | | SENSVS recreantia. |
| Erigeron | | Lapis Samius. |
| SEDIS morbi re- | | SE PIS bestiola mor- |
| | | fus |

CURATIVVS.

fus remedia.

Portulaca

Oxymel.

SERPENTIVMve

nenis contraria.

Paliurus

Vitex

Cancr

Hippopotamus

Fiber

Mustela

Gallinaceus

Cantharides

Chondrylla

Nasturtium

Dracunculus

Asphodelus

Rhaponticum

Aristolochia tertia.

Origanum sylvestre

Baccharis

Ruta

Phlomos, siue verba-
scum

Panaces chironium

Staphylinus

Smyrnion

Aparine

Chamaedrys

Lychnis satiua, siue co-
ronaria

Erythrodanum siue Ru-
bia

Sparganion

Polygonon mas

Clematis daphnoides

Polemonia

Anchusa

Ocimoides

Hyacinthus

Mandragoras

Nerion

Adiantum

SERPENTES

fugantia.

Iuniperus

Cornu ceruinum

Adeps

Nasturtium

Dracunculus maior

Abrotonum

Origanum

Calamintha

Peucedanum

Melanthion

Galbanum

Polium

Oenanthe

Lyfimachia

Aster Atticus

Vinum conizite

Lapis gagates.

SERPENTIVM

morsus remedia.

Iris Illyrica

Asarum

Cinnamomum

Balsamum

Pix

Naphtha

Iuniperus

Platanus

Erica

Glandes

Pistacia

V 5

INDEX

| | |
|---------------------|----------------------|
| Ficus Aegyptia | Sagapenom |
| Pastinaca piscis | Prasion |
| Rana | Phyllitis |
| Gobius | Trifolium |
| Fel | Scordion |
| Omotarichos | Cestron |
| Fimum | Periclymenos |
| Marinus pulmo | Echion |
| Mel | Ocymoides, siue ocy- |
| Eruum | mastrum |
| Dictamnus | Rubus |
| Rhaphanus | Eupatorium |
| Agaricum | Heliochryson |
| Brassica sativa | Adiantum |
| Cyclaminos | Peristereon supinus |
| Ampeloprason | Ebulus |
| Dracunculus minor | Ampelos leuce |
| Asphodelus | Vitis sativa |
| Anagallis | Vinum |
| Acantha leuce | Acetum |
| Abrotonum | Oxymeli |
| Asclepias | Vinum conizite |
| Origanum | Vinum panacite |
| Lilium | Sal Cinis vitis |
| Calamintha | Lapis ophites. |
| Clinopodium | SERPENTES ne |
| Serpyllum | feriant. |
| Leontopetalon | Cervi medulla. |
| Panaces heracleon & | SERPENTES ne- |
| asclepion | cantia. |
| Cyminum sativum & | Anchusa onocheles |
| sylvestre | Vinum cedrite. |
| Ammi | SICCANTES me- |
| Foeniculum | dicina. |
| Daucus | Ammi |
| Libanotis | Bromos |

Cist

CVRATIVVS.

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Cistos | Glycyrrhiza |
| Cyminum satium | Symphytum. |
| Ebulus | SMILACI contraria. |
| Aes vltum | Vide, Taxo contraria. |
| Arena litoris | SOMNIFERAE |
| Libanotis | medicinae. |
| Mentha | Amygdalæ amaræ |
| Pompholyx | Halicacabus, siue sola- |
| Spodium | num vesicarum |
| Rubus | Anisum |
| Terra Chia | Amomum |
| Rubrica sinopis | Cistos tertia, siue lada- |
| Fæx vini | num |
| Diphryges. | Baccharis |
| SINGVLTVM pel- | Dorycnion |
| lencia. | Hyoscyamus |
| Fiber | Lactuca |
| Sisymbrium | Iris Illyrica |
| Rhaponticum | Opium |
| Mentha | Mandragoras |
| Aristolochia tertia | Papauer rhœas, siue fa- |
| Anethum | tium |
| Cyminum sylvestre | Porrum |
| Alysson | Styrax |
| Asplenon | Smilax hortensis |
| Clymenon | Strychnon hypnoticon |
| Saxifragum. | siue solanum somni- |
| SIRIASIS remedia. | ficum |
| Cucurbita | Vitex |
| Pepo | Vinum nouum |
| Heliotropium maius. | Lapis memphites. |
| SITIM generantia. | SOMNVN disc- |
| Cape Allium | tientia. |
| Capparis | Sphondylium |
| Vini qualitas. | Peucedanum. |
| SITIM extinguentia. | SOMNIA, imaginosa |
| | & |

INDEX

| | |
|------------------------|----------------------|
| & mala inducentia. | Silurus |
| Faba | Triticum |
| Lens | Tragion |
| Pygnoكوم | Xyphion |
| Smilax leuis. | Xyris |
| SORDES purgantia. | Lacerta. |
| Irinum | SPISSANDI vim |
| Cortex thuris | habentia. |
| Sabina. | Acacia |
| SPASTICORVM | Cotonea |
| remedia. | Malum sylvestre |
| Fiber. | Amygdalus amara |
| SPASMI remedia. | Baccharis |
| Vide, Conuulsionis re- | Britannica |
| media. | Polygonon mas & fœ- |
| SPIRITVM, id est, | mina |
| flatum generantia. | Clymenon |
| Gentiana. | Medion |
| SPIRANTIBVS | Rubus |
| difficuler vtilia. | Helxine |
| Vide, Orthopnoicis. | Idæa radix |
| SPIRITVS discurrē | Hippuris |
| tes coercentia. | Psyllium |
| Bdellium. | Bryon thalassium |
| SPIRANTIBVS vi | Potamogeton |
| tam auferentia. | Acetum |
| Cedria. | Vinum Hadrianum |
| SPICVLA infixæ cor | Aerugo aurificum |
| pore extrahentia. | Vinū nigrum labruscæ |
| Anagallis | Vinum Tyburtinum |
| Harundo | Cadmia |
| Aristolochia | Pompholyx |
| Dictamnus | Squama æris |
| Propolis | Pumex |
| Narcissus | Corallium |
| Oxyacantha | Rubrica sinopsis |

Lap

CURATIVVS.

Lapis hæmatites.

SPLENETICIS

utilia

Vide, Lienis morbi re-
media.

SPVMAE argenti
contraria.

Vinum in commune.

SQVAMAS ossium
extrahentia.

Aristolochia tertia

Peucedanum.

STAPHYLOMATIS
remedia.

Palma Thebaica

Lapis schistos

Lapis sapphiros.

STERNVTAMEN-
tum mouentia.

Iris Illyrica

Fiber Sinapi

Ptarmice

Struthion

Batrachion

Daphnoides

Helleborus albus.

STERILES fœmi-
nas facientia.

Vide, Generationem de
primentia.

STIGMATVM
remedia.

Batrachion

Mandragora.

STOMACHO
contraria.

Terebinthina

Cedrides

Melimela

Pruna

Arbutus

Iuglans

Auellana

Ficus

Hordeum

Lens

Malua

Porrum

Brassica sativa & mari-
na

Cape

Nasturtium

Capparis

Absynthium

Absynthiū seriphium

Balanus myrepica

Vua

Thymelæa

Ebulus

Prasium

Galbanum

Aqua maris

Vinū tethalassomenum

STOMACHI mor-
bi remedia.

Meu

Nardi spica

Nardum Gallicum

Malabathrum

Iuncus odoratus

Agallochum

Helenium

Oleum

INDEX

| | |
|--------------------|-------------------|
| Oleum balaninum | Lyncurion |
| Mastichinum | Saccharon |
| Vnguentum rosaceum | Faba Aegyptia |
| Susinum | Sifer |
| Nuclei pini | Lupinum satiuum |
| Mastiche | Lapathum |
| Cupressus | Lampfana |
| Iuniperus | Brassica satia |
| Laurus | Portulaca |
| Populus nigra | Sonchos |
| Rosa | Seris |
| Oliuæ colymbades | Cucumis |
| Palma | Lactuca |
| Palma clate | Gingidium |
| Malum punicum | Scandyx |
| Siliquæ | Aphace |
| Myrtus | Ampeloprasen |
| Cotonea | Allium |
| Mala Epirotica | Zingiber |
| Armeniaca | Scilla |
| Mespilus | Lotus |
| Pruna | Bulbus esculentus |
| Amygdalæ dulces | Agaricum |
| Pistacia | Rhaponticum |
| Iuglans | Gentiana |
| Morus | Acantha leuce |
| Persea | Aloe |
| Ficus Aegyptia | Absynthium |
| Ionia | Mentha |
| Cochleæ terrestres | Tragoriganum |
| Ouum | Pulegium |
| Lac | Melilotus |
| Lac humanum | Ligusticum |
| Caseus | Caros |
| Lana succida | Anethum |
| Oryza | Cuminum sylvestre |
| | Hieracium maius |
| | Apium |

Pct

CVRATIVVS.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Petroselinum | Vinum rhoite |
| Smyrnion | Vinum myrtite |
| Fœniculus | Vinum terebinthinum |
| Scordion | Vinum phœnicite |
| Artemisia | Vinum absynthite |
| Nymphæa Prœnia | Vinum bunitc. |
| Cestron | Vinum dictamnite |
| Polygonon mas | Vinum calaminthite |
| Rubus | Vinum aromatite |
| Strychnon satium | Vinum nectarite |
| Cotyledon prima | Vinum nardite |
| Erigeron | Vinum ex syluestri nar |
| Adiantum | do |
| Aster Atticus | Vinum selenite |
| Viola purpurea | Ferrum |
| Chamaedaphne | Flos salis |
| Colocynthis | Fœx vini |
| Vitis samia | Lapis alabastrites |
| Nuclei acinorum | Lapis samius. |
| Vua œnanthe | STRVMAE gut- |
| Omphacium | turis remedia. |
| Vini qualitas | Iris Illyrica |
| Phalernum | Grosi |
| Hydromel | Vipera |
| Thymoxalme | Mustela |
| Omphacomeli | Vnguis asini |
| Vinum | Finum |
| Vinum Surrentinum | Hordeum |
| Vinum omphacite | Lolium |
| Vinum nigrum ex la- | Fabæ Lens |
| brusca floribus | Lupinum satium |
| Vinum melitite | Lapathum |
| Vinum scilliticum | Andrachne, siue portu- |
| Vinum cydonite | laca syluestris |
| Vinum apiite | Plantago |
| Vinum anethinum | Piper |

Capp

INDEX

Capparis
 Argemone
 Coriandrum
 Libanotis
 Laserpitium
 Aparine
 Millefolium
 Scordion
 Lithospermon
 Cotyledon prima
 Galioipsis
 Pseudobunion
 Adiantum
 Testæ siue terræ fornacum.
 STRANGVLARUS remedia.
 Irinum
 Absynthium.
 STRANGVRIAE morbi remedia.
 Aspalathus
 Cedrides
 Locustæ
 Asparagus
 Sifymbrium
 Medica
 Panaces heracleon
 Sefeli Mafsiliense
 Hippofelinon
 Hippomarathron
 Polycnemom
 Clinopodium
 Oenanthe
 Coniza
 Asplenon

Cape
 Onobrychis
 Polygonon mas
 Saxifragon
 Xyris
 Laurus Alexandrina
 Tragion
 Pseudobunion
 Adiantum.
 STYPTICAE medicinae.
 Vide, Adstrictoriae medicinae.
 SVCCI qui perimūt.
 Diosc. lib. 6. in præfat.
 SVDOREM deprimentia.
 Oleum
 Oleum omphacinum
 Oleum oleastri
 Myrteum
 Lentiscinum
 Vnguentum melinum
 Rhodides
 Myrtus
 Bulbus esculentus
 Vinum myrsinite
 Sulphur
 Gypsum
 Terra samia.
 SVDORES euocantia.
 Metopium vnguentum
 Smyrnion
 Pyrethrum
 Onobrychis
 Flos salis

Anch

C V R A T I V V S.

Anchusa
 Cypripedium
 S V E S necantia.
 Chamæleon albus.
 S V F F V S I O N V M
 morbi remedia.
 Sanguis
 Agapenum
 Euphorbium
 Chamæfyce
 Arena litoris.
 V G I L L A T O R V M
 remedia.
 Acetum Sal.
 S V P E R C I L I O -
 rum raritati vtilia.
 Icea.
 S V P E R C I L I I S
 glabris vtilia.
 Puligo resina.
 S V P P V R A T I O -
 nis tuberculorum
 remedia.
 Trocomagma
 Palimpissa.
 S V P P V R A T I O -
 num remedia.
 Aegyptia
 Mel Hordeum
 Colium
 Cucurbita
 Ligusticum
 Myrrion
 Althæa
 Mandragoras
 Rtica

Narcissus
 Ampelos leuce
 Diphryges.
 S V S P I R I O S O -
 rum remedia.
 Canchamum
 Cyphi
 Oleum amygdalarum
 Pix
 Ficus
 Vulpinus pulmo
 Eruum
 Plantago
 Agaricum
 Rhaponticum
 Aristolochia tertia
 Hyssopum
 Thymus
 Acinos
 Ruta
 Galbanum
 Ammoniacum
 Prasium
 Parthenium
 Anagyris
 Adiantum Thapsia
 Ampelos leuce
 Vinum passite
 Vinum hyssopite.
 T A B I D I corporis
 remedia.
 Vide, Phthysicorum re-
 media.
 T A B E S C E N T I -
 bus vtilia.
 Daphnoides

X

INDEX

Vinum strobilite.
 TAXO contraria.
 Vinum in commune
 Acetum.
 Diosc. lib. 6. cap. 12.
 TELA infixa corpori-
 bus extrahentia.
 Vide, Spicula infixa.
 TENASMI mor-
 bi remedia.
 Lac schiston
 Foenogracum
 Linum
 Eruum.
 TEREDINEM
 sentientia.
 Ficus Aegyptia
 Hyoscyamus.
 TEREDINEM
 non sentientia.
 Tilia.
 Hermol. Cor. cap. 133.
 TEREDINEM
 necantia.
 Sal.
 TESTIVM mor-
 bi remedia.
 Vitex
 Myrtus
 Cicer
 Faba
 Erysimon
 Asphodelus
 Melilotos
 Ruta
 Cyminum

Lilium
 Hyoscyamus
 Erigeron
 Vua passa
 Geodes lapis
 Terra samia
 Cimolia.
 THAPSIAE
 contraria.
 Diosc. lib. 6. in præfat.
 & cap. 33.
 THERIACAM
 ingredientia.
 Rapa satiua
 Zingiber
 Dictamnus
 Apium.
 THERIOMATVM
 remedia.
 Lupinum satium
 Elelisphacos.
 THORACIS reme-
 dia.
 Cerebrum gallinacei
 Glycyrrhiza.
 THYMOS ab-
 sumentia.
 Smaris
 Thymus
 Heliotropium maius
 Vitis satiua
 TIBIARVM vlce-
 rum remedia.
 Hydropiper
 Ampelos leuce.
 TINEAS latas
 pellen

CVRATIVVS.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------|
| pellentia. | Pix | Cedria |
| Cardamomum | Lycium | |
| Costum | Pruna | |
| Malicorium | Morus | |
| Melimela | Ficus | |
| Iuglans | Hirundines | |
| Morus | Lac schiston | |
| Heliotropium minus | Mel | Sinapt |
| Zinum absynthite | Aloë | |
| Lupinum satium | Origanum | |
| Rassica fatiua | Britannica | |
| Portulaca | Periclymenos | |
| Chamaeleon albus | Helxine | |
| Hyssopum | Peristercon supinus | |
| Calamintha | Omphacium | |
| Thymus | Vinum myrsinite | |
| Ruta | Flos aris | |
| Coriandrum | Alumen | Saf. |
| Melilotum | TORMINIS remedia. | |
| Bryon thalassion | Iris Illyrica | |
| Pteris | Acorus | Meu |
| Thelypteris | Cardamomum | |
| Vinum cedrite | Balsamum | |
| Chalcanthum | Agallochum | |
| Anchusa tertia. | Olcum | |
| TINEAS rotun- | Iuniperus | |
| das generantia. | Halimos | |
| Triticum. | Iuglans | |
| TINEAS necantia. | Ficus | |
| Absynthium seriphion | Fiber | |
| Mentha | Talus suis | |
| Heliotropium minus | Triticum | |
| Cedria | Milium | |
| Aizoon maius. | Panicum | |
| TINEIS contraria. | Eruum | |
| Citria. | Atriplex | |
| TONSILLARVM | | |
| morbi remedia. | | |

INDEX

| | | |
|------------------------|--------|----------------------|
| Sifymbrium | | corum remedia. |
| Piper | Scilla | TORPORIS remedia. |
| Agaricum | | Fagus. |
| Rhaponticum | | TORSIOMIS |
| Centaurium maius | | remedia. |
| Eryngion | | Tragoriganum. |
| Calamintha | | TOXICO contraria. |
| Serpyllum | | Glandes |
| Sampsuchus | Ruta | Sanguis. |
| Panaces heracleon | | TREMOREM |
| Acetum | | excucientia. |
| Cyminum fatium | | Vnguentum cinnamo- |
| Seseli Mafsiliense | | minum. |
| Cyminum syluestre | | TRE MORIS remedia. |
| Elaphoboscon | | Lepus terrestris. |
| Petroselinum | | TVBERCVLO- |
| Daucus | | rum suppuratio. |
| Libanotis | | nis remedia. |
| Ferula | | Strigmēta gymnastorū |
| Peucedanum | | Morus |
| Asclepias | | Cape |
| Melissophyllon | | Asphodelus |
| Phalangion | | Panaces Asclepion |
| Coniza | | Laserpitium |
| Alisma | | Viscum |
| Chamæpitys | | Thapsia |
| Gramen | | Mandragoras |
| Pseudobunion | | Ephemeron |
| Chamædaphne | | Cucumis anguinus |
| Vinum scillite | | Vrtica |
| Vinum cedrite | | Aerugo aurificum |
| Vinum hyssopite | | Lapis Asius |
| Vinum tragoriganite | | Terra cimolia. |
| Vinum panacite | | TVBERA exte- |
| Aphronitrum | | nuantia. |
| Et in verbo, Dyfenteri | | Triticum |
| | | Leontopodium |

Scam

CURATIVVS.

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------|----------|
| cammonia | | Sesamoides | |
| Vinum nigrum & labru | | Ephemeron | |
| fca. | | Phlomidis | |
| TVMORVM | | Cucumis anguinus | |
| remedia. | | Thapsia | |
| anagyris | | Chamaefyce | |
| platanus | | Pygnoconomum | |
| agrus | | Aqua maris | |
| alex | Adeps | Indicus lapis | |
| hordeum | Faba | Fax vini | Spongia. |
| brassica fatiua & sylue- | | TVSSIS | remedia. |
| stris | | Amygdala amara | |
| Cucurbita | | Asphodelus | |
| Nasturtium | | Apium satium | |
| Hydropiper | | Edellium | |
| Bulbus esculentus | | Bromos | |
| fatis | | Cinnamomum | |
| Chamaeleon | | Calamus odoratus | |
| Tragoriganum | | Cupressus | |
| Samoluchum | | Cedrides | |
| Ligusticum | | Cistos | Cacalia |
| Daucus | | Chamaedrys | |
| Libanotis | | Tragacantha | |
| Melanthion | | Dracunculus | |
| Orchis serapias | | Faba | Helenium |
| Orminum | | Hippuris | |
| Buphthalmus | | Hyoscyamus | |
| Cannabis syluatica | | Iris Illyrica | |
| Polygonon mas | | Lycium | |
| Lagopus | Xyris | Laserpitium | Mel |
| Helxine | | Melicratum | |
| Pentaphyllum | | Origanum | Pix |
| Peristereon supinus | | Paliurus | Piper |
| Hyoscyamus | | Peucedanum | |
| Psyllium | | Prasium | |
| Xanthium | | Papauer satium | |

INDEX

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|--------|
| Ruta | Styrax | Myrrha | |
| Struthion | | Lacerta | Linum |
| Smyrnion | | Porrum | Cape |
| Sulphur | | Bulbus esculentus | |
| Triticum | | Pulegium | |
| Tragoriganum | | Balanus myrepica | |
| Terebithina | | Cici | Sory. |
| Vua passa. | | Ampelos leuce. | |
| TVSSIS veteris | | VARICES sanantia. | |
| remedia. | | Cirsion. | |
| Asarum | | VENEFICIIS | |
| Myrrha | | medetur | |
| Nuclei pini | | Scilla. | |
| Mastiche | | VENEREM cum ve | |
| Naphtha | | luptate expedientia. | |
| Cerasia | | Laurus Alexandrina. | |
| Amygdala amara | | VENEREM co- | |
| Auellana | | hibentia. | |
| Allium | | Portulaca | |
| Ficus | Propolis | Lactuca | |
| Rhaphanus | | Lactuca sylvestris. | |
| Scilla | Hyssopus | VENEREM sti- | |
| Centaurium maius | | mulantia. | |
| Baccharis | | Costum | Crocum |
| Seseli Malsiliense | | Mastiche | |
| Daucus | | Linum | |
| Sagapenon | Galbanū | Rapa sativa | |
| Scordion | | Sifer | Eruca |
| Bechion | | Porrum | Cape |
| Helxine | | Nasturtium | |
| Phlomides | | Dracunculus maior | |
| Acetum | | Dracunculus minor | |
| Vinum hyssopite | | Bulbus esculentus | |
| Sandaracha. | | Mentha | |
| VAROS purgantia. | | Staphylinus | |
| Oleum balaninum. | | Anisum | Orchis |
| | | | Orc |

CURATIVVS.

| | | |
|------------------------|----------------------|----------|
| Orchis ferapias | Oleum | Pix |
| Satyrion | Paliurus | Lycium |
| Satyrion alterum | Olea Aethiopica | |
| Orminum | Iuglans | |
| Xiphium | Lixiuia ex ficu | |
| Vrtica | Lepus terrestris | |
| Galiopsis. | Fiber | Butyrum |
| VENENATA | Sanguis | Vrina |
| fugantia. | Rapa sativa | |
| Vitex | Malua | |
| Dictamnus. | Erysimon | |
| VENAS excitantia. | Agaricum | |
| Vinum Phalernum. | Aristolochia secunda | |
| VENTRIS anima- | Abrotonum | |
| lia expellentia. | Ruta | Apium |
| Vide, Tineas latas. | Laserpitium | |
| VENTREM soluentia. | Leucas | |
| Vide, Aluum soluentia. | Polium | Cestron |
| VENENATORVM | Pentaphyllum | |
| ictus remedia. | Colchicon | |
| Cardamomum | Epipactis | |
| Nardum gallicum | Passum | |
| Helenium | Linum gypsatum | |
| Cinnamomum | Rubrica lemnia | |
| Bdellium | Terra samia. | |
| Ficus | VERMIBVS | |
| Propolis | contraria. | |
| Rhaphanus | Cedria. | |
| Triticum | VERRVCAS | |
| Eryngium | tollentia. | |
| Cuminum sylvestre | Batrachion | |
| Althæa | Clinopodion | |
| Tribulus | Characias | |
| Praſium | Chamaesyce | Dipsacos |
| Smilax aspera | Ficus | Groſſi |
| Aqua maris | Cicer | Lacerta |
| Acetum. | | |
| VENENORVM | | |
| remedia. | | |
| Cinnamomum | | |

INDEX

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|-----------|
| Heliotropium | | Ceruinum cornu | |
| Finum | | Saccharum | |
| Staphis agria | | Gramen | Malua |
| Scilla | Thymus. | Hippuris | |
| VERTIGINIS mor | | Portulaca | |
| bi remedia. | | Lotus syluestris | |
| Balsamum | | Plantago | Vua passa |
| Lac humanum | | Cucumis | |
| Peucedanum | | Scandyx | Passum |
| Galbanum | | Ochra | Porrum |
| Ampelos leuce | | Bulbus vomitiuus | |
| Ampelos melæna | | Rhaponticum | |
| Acetum scilliticum | | Glycyrrhiza | |
| Vinum scilliticum. | | Tragacantha | |
| VERTIGINEM | | Panaces heracleon | |
| adgenerantia. | | Petrofelinum | |
| Cardamonum | | Smyrnion | |
| Balsamum | | Peucedanum | |
| Hyoscyamus | | Fœniculus | |
| Mandragoras | | Nymphæa | |
| Falernum | | Anthemis | Pæonia |
| Vinum rhetinte | | Phalaris | |
| Mandragorite | | Cape | |
| Aconitum | Cicuta. | Halcyonium | |
| VESICAE morbi | | Cestron | |
| remedia. | | Vinum terebinthinum | |
| Meu | | Vinum scilliticum | |
| Nardum Gallicum | | Vinum aromatite | |
| Nuclei pini | | Vinum halosanthite | |
| Cupressus | | Lapis morochthus. | |
| Laurus | Palma | VESPARVM ictus | |
| Palma etate | | remedia. | |
| Myrtus | Lac | Laurus | Malua |
| Ficus | Ouum | Sisymbrium. | |
| Cochleæ terrestres | | VESTIBVS ne ani- | |
| Cicada | Napum | malia noceant. | |
| | | Abfyn | |

C V R A T I V V S.

Abfynthium

Heliocaryfos.

VIBICES plagarum
emendantia.

Sufinum.

VIPERAE morfus
remedia.

Cafia

Costum

Iuniperus

Macer

Fraxinus

Vrina

Caries lignorum

Triticum

Eruum

Ferula

Anchufa

Onocheles

Ocimoides

Diofc.lib.6.cap.63.

Herm.Cor.cap.721.

VIRIVM infirmi-
tates roborantia.

Nuclei pini.

VISCO contraria.

Vinum in comuni

Acetum

Vinum abfynthite

Diofc.lib.6.cap.21.

VISCERVVM mor-
bi remedia.

Thus.

VITILIGINIS
remedia.

Daphnoides

Myrtus

Ficus

Groffi

Cochleæ terrestres

Lepus terrestris

Sepiæ

Faba

Beta

Lupinum fatium

Chondrylla

Capa

Allium

Piper

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis

Argemone

Gentiana

Telephion

Ruta

Chamaeleon niger

Libanotis

Lilium

Nymphæa

Cicuta

Erythrodanum

Helleborum nigrum

Cucumis anguinus

Balanus myrepfica

Narciffus

Sulphur

Halcyonium

Terra melia.

VITRA fracta con-
glutinantia.

Herm.Cor.cap.254.

VMBILICI re-
media.

Lapis magnes.

VNGVIBVS vtilia.

Pix

Cupreffus

Daphnoides

Olca

Oryza

Linum

Lapathum

Bulbus efculentus

Batrachion

X 5

INDEX

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Chelidonium minus | Aes ystum |
| Viscum | Chrysocolia |
| Sandaracha | Rubrica leninia. |
| Alumen | VOMITIONES co |
| Sulphur | hibentia. |
| Fax vini. | Atriplex |
| VOC EM claram red- | Apium |
| dentia. | Mentha |
| Myrrha | Eupatorium. |
| Styrax | VOMICA E morbi |
| Silurus. | remedia. |
| VOLVPTATES | Paliurus |
| animi augeſcentia. | Thlaſpi |
| Bugloſſum. | Struthion |
| VOLVCRVM mor | Eryngion |
| ſus remedia. | Bechion |
| Iecur aprinum. | Pſyllion |
| VOMITIONES | Mandragora |
| mouentia. | Acetum. |
| Irinum | VRENDI vim ha- |
| Laurus | bentia. |
| Cochleæ terreſtres | Mify |
| Omotarichos | Melanteria. |
| Blattæ | VREDINEM fa- |
| Asphodelus | cientia. |
| Pepo | Trifolium. |
| Capparis | VRINAE difficul- |
| Bulbus vomitorius | tem generantia. |
| Origanum | Dioſc. lib. 6. in præſat. |
| Ceſtrum | VRINAE harenofæ |
| Anagyris ſemen | & aſperæ remedia. |
| Papauer ſpumcum | Papauer ceratitis. |
| Mandragoras | VRINAM cruentam |
| Daphnoides | mouentia. |
| Helleborus albus | Clymenon. |
| Elaterion | VRINAM arceſ- |
| Silybon | ſentia. |
| Balanus myrepſica | Eruum |
| Narciſſus | Galbanum. |
| Cici | VRINAM mo- |
| Melicratum | uentia. |
| | Acor |

CVRATIVVS.

| | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Acorus | Meu | Erinaceus marinus |
| Cyperus | | Cimices lecti |
| Cardamomum | | Oues Buprestis |
| Nardi spica | | Vermes terreni |
| Nardum Gallicum | | Mel Hordeum |
| Asarum | Phu | Zythum |
| Malabathron | | Milium |
| Casia | | Panicum |
| Cinnamomum | | Cicer Eruum |
| Costum | | Rapa fatiua |
| Juncus odoratus | | Rhaphanus |
| Calamus odoratus | | Rhaphanus agria |
| Balsamum | | Sifer Bunion |
| Crocum | | Brassica fatiua |
| Crocomagma | | Asparagus |
| Helenium | | Sisymbrium aquaticū |
| Oleum amygdalinum | | Crithmon |
| Vnguentum melinum | | Cucumis Pepo |
| Susinum | | Lactuca |
| Irinum | | Gingidium |
| Amaracinum | | Caucalis Eruca |
| Bdellium | | Ocymum |
| Picea | Nuclei pini | Smilax hortensis |
| Lentiscus | Resina | Porrum |
| Terebinthus | | Ampeloprason |
| Cupressus | | Capa Allium |
| Juniperus | | Piper |
| Populus alba | | Struthion |
| Paliurus | Tilia | Draunculus |
| Olca Aethiopica | | Asphodelus |
| Glandes | Myrtus | Scilla Capparis |
| Palma elate | | Agaricum |
| Siliqua | Cotonea | Crocodilion |
| Mala Epirotica | | Centaurium maius |
| Cornus | | Chamaeleon albus |
| Amygdala dulces | | Acantha leuce |
| | | Acant |

INDEX

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|---------|
| Acantha | Anonis | Saxifragon | |
| Eryngion | | Xyris | Gramen |
| Absynthium | | Gramen parnasium | |
| Abrotonum | | Phœnix herba | |
| Tragoriganum | | Hippuris | |
| Elelisphacos | | Oxyscœnos | |
| Thymus | | Heliochrysos | |
| Serpyllum | | Astragalus | |
| Baccharis | | Hyacinthus | |
| Ruta | Moly | Papauer rhœas | |
| Ligusticum | | Strychnon hypnoticon | |
| Staphylinus | | Cotyledon prima | |
| Tordylon | | Vrtica | Arction |
| Sisum | Anisum | Vinum Lesbion | |
| Caros | Anethum | Hydromel | |
| Cyminum syluestre | | Melicratum | |
| Opium | | Vinum rhetinite | |
| Oreoselinum | | Vinum catorchite | |
| Petroselinum | | Vinum è cedro | |
| Daucus | Libanotis | Vinum è lauro | |
| Melanthion | | Vinum absynthite | |
| Ammoniacum | | Vinum calaminthite | |
| Chamædrys | | Vinum aromatite | |
| Trifolium | Scordion | Vinum nectarite | |
| Androsaces | | Vinum nardite | |
| Anthyllis | | Vinum asarite | |
| Anthemis | | Vinum syluestris nardi | |
| Lithosperma | | Vinum daucite | |
| Erythrodanum | | Vinum acorite | |
| Lonchitis | Althæa | Halcyonium | |
| Hypericon | | Lapis hamatites | |
| Choris | | Lapis Iudaicus | |
| Chamæpitys | | Corallium | |
| Cestron | | Vinum chamæpyteos. | |
| Polygonon mas | | VRTICAE herbæ | |
| Polemonia | | pruritus remedia. | |
| | | Herma | |

C V R A T I V V S.

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| Herm. Cor. cap. 707 | | Oenanthe |
| VSTIS vtilia. | | Ficus Aegyptia |
| Vrtica siue acalyphe. | | Fimum |
| V V AE faucium | | Gentiana |
| remedia. | | Glycyrrhiza |
| Pix | Galla | Glutinum |
| Pruna | | Hippuris |
| Hirundines | | Ifatis |
| Vrtica | | Lana succida |
| Omphacium | | Ligusticum |
| Acetum | | Lilium |
| Flos æris | | Lyfimachion |
| Alumen | Sal. | Minium sinopicum |
| VVL P E S necantia. | | Myriophyllon |
| Apocynon. | | Picca |
| VVL N E R V M re- | | Palma |
| media. | | Portulaca |
| Amurca | | Porrum |
| Allium | | Polycnemom |
| Argemone | | Polium |
| Aristolochia | | Polygonon mas |
| Aloe | Anthyllis | Polygonatum |
| Althæa | | Pentaphyllum |
| Androsamon | | Phœnix herba |
| Lycopsis | Acetum | Pteris |
| Butyrum | | Peristereon |
| Brassica | | Papauer |
| Coccus | | Plumbum clotum |
| Chamæpitys | | Scordion |
| Centaunion | | Symphyton |
| Cyclaminos | | Sideritis |
| Cytinus | | Stratiotes aquaticus |
| Cupressus | | Spongia |
| Dracunculus | | Cochleæ terrestres |
| Dictamnus | | Thus |
| Aerugo aurificum | | Terra cretria |

Vin

INDEX

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vinum | Iuniperus |
| Vinum œnanthe | Laurus |
| Vnguentum citrinum | Myrica |
| Vlmus | Cistos |
| Vitex. | Rosa |
| VVLVAE mulie- | Lycium |
| ris remedia. | Acacia |
| Men | Amurca |
| Cyperus | Vitex |
| Nardi spica | Galla |
| Casia | Palma clate |
| Costum | Myrtus |
| Iuncus odoratus | Cotonea |
| Balsamum | Iuglans |
| Bryon | Cimices le&il |
| Narcaphthum | Lac schiston |
| Oleum amygdalinum | Butyrum |
| Maitichinum | Oesypum |
| Vnguentum rosaceum | Coagulum |
| Melinum | Adeps |
| Sampfuchinum | Fœnograecum |
| Abrotoninum | Pinum |
| Susinum | Malua |
| Narcissinum | Portulaca |
| Crocinum | Plantago |
| Irinum | Sonchos |
| Gleucinum | Porrum |
| Amaracinum | Sinapi |
| Metopium | Piper |
| Cinnamomum | Agaricum |
| Myrrha | Rhaponticum |
| Styrax | Pulegium |
| Bdellium | Centaurium maius |
| Lentiscus | Melilotus |
| Pix | Ruta |
| Naphtha | Panaces heracleon |

Am

CVRATIVVS.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ammi | Ageraton |
| Sphondylion | Vinum terebinthinum |
| Peucedanum | Vinum cedrite |
| Sagapenum | Vinum picatum, siue |
| Galbanum | pissite |
| Asclepias | Vinum chaniædryte |
| Lilium | Vinum daucite |
| Circea | Vinum helleborite |
| Artemisia | Lapis gagates |
| Geranion | Peristercon rectus |
| Anthyllis | Hyoscyamus |
| Parthenion | Mandragoras |
| Pæonia | Ebulus |
| Cestron | Ampelos leuce |
| Clematis daphnoides | Acetum |
| Chrysocome | Acetum scilliticum. |

INDICIS CVRATIVI
FINIS.

*Lugduni,
Excudebat Ioannes
Frellonius,

1547.*

